行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第104號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

害蟲天敵名錄
上冊
A List of Natural Enemies of Insect Pests
Vol. I

林珪瑞編著
Compiled by Kwei-shui Lin

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
Published by
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwan, R.O.C
September, 2003

行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 104 號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

害蟲天敵名錄
上冊
A List of Natural Enemies of Insect Pests
Vol. I

林 珪 瑞 編 著
Compiled by **Kwei-shui Lin**

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
Published by
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwn. R.O.C
August, 2003

序

目前對害蟲的管理，首選就是以化學防治來解決問題，因化學藥劑防治雖可全面性、不論害蟲或天敵幾可全部殺滅，但有因施藥量不足可能有少部分害蟲未能致死。其後遑就有諸多問題，諸如害蟲抗藥性產生，環境受藥劑污染問題及害蟲天敵被殺害，繼而害蟲因缺乏有利天敵可抑制其發生猖獗，而成爲害蟲防不勝防的局面。

害蟲的天敵在自然界中爲一非常重要份子，經常抑制害蟲的發生爲害，所以值得特別加以保護，俾天敵能在自然界中與害蟲保持平衡，則可節省許多害蟲防治資源。

害蟲種類繁多，其天敵包括寄生性及捕食性種類亦不少，故須先有充分瞭解害蟲天敵種類或近緣種及分布，以便加以研究及利用，供爲害蟲生物防治。

林珪瑞先生於本所屆齡退休後(1986)，即著手儘量搜集有關文獻，藉著昆蟲分類基礎，依昆蟲分類系統，花了十多年時間編輯 [害蟲天敵名錄]，供爲害蟲生物防治最基本資料。現已初稿完成付梓，想必在害蟲生物防治工作上有所依據，特爲其多年來編輯辛勞的結果付梓之際作序。

所 長

林俊義 謹識

2002 年 6 月

前 言

害蟲的猖獗是因害蟲內在的生殖潛能，及外在的生境條件配合，使得害蟲在很短期間內就能大量發生爲害。各種害蟲的生殖潛能頗有定型，在大量發生則視其所受到生境條件的限制是否適應其猖獗發生。

就以稻飛蝨的發生猖獗爲例(主要爲褐飛蝨 *Nilaparvata lugens*)，其在水稻田中自然環境的高低溫度都能適應而生育繁殖。由於水稻爲著提高單位面積產量，耕作制度已有明顯改變，諸如稻株的密植度，以及實施節水輪流灌溉、晒田等工作，將稻田的自然環境改變。以目前水稻的栽培制度，稻飛蝨的發生就可由稻田的圍燒現象，就可瞭解稻田密植而變成通風不良所引起。稻飛蝨的卵寄生蜂(*Anagrus* spp.)至少有四種，其在通風良好的稻株上稻飛蝨卵的寄生率幾可達100%，可以使稻飛蝨與卵寄生蜂保持自然界平衡，而抑制稻飛蝨不能發生成災爲害。如在通風不良悶熱稻田，寄生蜂則無法維持其甚高的寄生率, 稻飛蝨隨即猖獗成災。亦即稻飛蝨能適應較高溫多濕不通風的環境繁殖(且一隻稻褐蝨短翅型雌蟲產卵量可達 500 粒)，假如其卵全數孵化後吸食稻株很快就乾死，所以稻飛蝨猖獗成災極爲迅速。

臺灣早年曾經由國外引進澳洲瓢蟲 (*Rodolia cardinalis* (Mulsant) 防治吹綿蚧，蒙氏瓢蟲 (*Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant) 防治球粉蚧 (*Nilaecoccus filamentosus* (Cockerell)，近年則引進紅胸葉蟲嚙小蜂 (*Tetrastichus brontispae* Ferriére) 防治椰子紅胸葉蟲，亮腹嚙小蜂 (*Tamatrixia radiata* Waterston) 防治柑橘木蝨及哥恩矮小蜂 (*Encarsia guadelopae* Viggiani) 防治螺旋粉蝨頗爲成功的實例。在中國大陸亦有從國引進害蟲天敵，供爲害蟲防治之用，在本名錄中都有詳細記載。

由於自然天敵對害蟲的猖獗具有極強的抑制效果，可以保持自然界的生物平衡，可見其在生物界的重要性。吾人有必要加以較詳細瞭解。故於編輯 [臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄] 同時編輯 [害蟲天敵名錄] 供同道參考，並可供害蟲生物防治之依據。

本名錄範圍較廣，除農、林業害蟲外，尚包括若干衛生害蟲，因此亦可供衛生害蟲生物防治參考。因有關文獻繁多，手頭資料又有限，可能遺漏許多，且因個人體力有限，遺漏之處在所難免，尚祈諸位先進賢達、同道不吝指教，則無任企盼之至！

在編輯目錄工作時，承蒙應用動物系羅主任幹成給予諸多方便，並協助爭取出版事宜，林所長准予刊印；陶家駒先生及周樑鎰博士允許借用他們私人搜集中國大陸的有關圖書及期刊，姚美吉先生及古琇芷小姐在電腦處理方面給予很多幫助，在此一併誌謝。又內人謝雲梅女士在我進行編輯目錄的十多年間，全部負起家計內外，使我無後之憂，始能將全部時間投入編輯工作、在此表示衷心感激。

編者

中華昆蟲學會榮譽會員

2002 年 6 月

目 次

上 冊 Vol. I
INSECTA 昆蟲綱 1
COLLEMBOLA 彈尾目 1
Entomobryidae 長角跳蟲科 1
ODONATA 蜻蜓目 1
Calopterygidae 珈蟌科 1
Euphaeidae 幽蟌科 5
Euphacidae 溪蟌科 6
Libellaginidae 隼蟌科 7
Chlorocyphidae 鼓蟌科 8
Lestidae 絲蟌科 9
Amphipterygidae 麗蟌科 11
Chlorolestidae 綜蟌科 11
Megapodagrionidae 山蟌科 12
Pseudolestidae 擬絲蟌科 12
Platycenemididae 扇蟌科 13
Platystictidae 纖蟌科 15
Protoneuridae 樸蟌科 16
Coenagrionidae 細蟌科 16
Cordulegasteridae 勾蜓科 22
Gomphidae 春蜓科 24
Aeschnidae 晏蜓科 52
Corduliidae 弓蜓科 56
Libellulidae 蜻科 59
Corduliidae 僞蜻科 59
BLATTOPTERA 73
Corydiidae 鱉蠊科 73
MANTODEA 螳螂目 73
Amorphoscelidae 怪螳螂科 73
Hymenopodidae 花螳科 73
Mantidae 螳螂科 76
Eremiaphilidae 埃螳科 81
Vatidae 長頸螳科 82
ORTHOPTERA 直翅目 85
Gryilidae 蟋蟀科 85
Tettigoniidae 螽蟴科 86
DERMAPTERA 革翅目 88
Pygidicranidae 筒螋科 89
Diplatyidae 細腰螋科 89
Psalididae 肥螋科 89
Labiduridae 蠼螋科 91
Labiidae 姬螋科 93
Nesogastridae 錘角螋科 93
Chelisochidae 墊跗螋科 93
Pygidicranidae 大尾螋科 94
Anechuridae 張鋏螋科 94
Forficulidae 球螋科 95
Opisthocosmlidae 長鋏螋科 101
HEMIPTERA 半翅目 102
Pentatomidae 蝽科 102
Asopinae 益蝽亞科 102
Pentatominae 蝽亞科 113
Coreidae 緣蝽科 113
Lygaeidae 長蝽科 113
Geocorinae 大眼長蝽亞科 113
Pyrrhocoridae 紅蝽科 116
Phymatidae 瘤蝽科 116
Enicocephalidae 奇蝽科 121
Reduviidae 獵蝽科 121
Emesinae 蚊獵蝽亞科 122
Saicinae 盲獵蝽亞科 123
Tribelocephalinae 絨獵蝽亞科 124
Holoptilinae 毛獵蝽亞科 125
Ectinoderinae 粘獵蝽亞科 125
Centrocneminae 新獵蝽亞科 128
Salyavatinae 颯獵蝽亞科 129
Ectrichodinae 光獵蝽亞科 130
Piratinae 盜獵蝽亞科 133
Reduviinae 獵蝽亞科 136
Stenopodinae 細足獵蝽亞科 142
Rhaphidosominae 桿獵蝽亞科 146
Harpactorinae 真獵蝽亞科 147
Nabidae 姬蝽科 164
Anthocoridae 花蝽科 175
Miridae 盲蝽科 183
Dipsocoridae 鞭蝽科 187
Saldidae 跳蝽科 187
Leptopodidae 細腳蝽科 193
Isometopidae 樹蝽科 193
Enicocephalidae 奇蝽科 195
Mesoveliidae 水蝽科 195
Hydrometridae 尺蝽科 195
Vellidae 寬黽蝽科 195
Gerridae 黽蝽科 186
Nepidae 蠍蝽科 197
Belostomatidae 負子蝽科 197
Corixidae 划蝽科 198
Notonectidae 仰蝽科 199
CORRODENTIA 嚙蟲目 200
Caeciliidae 毛嚙蟲科 200
ANOPLULA 蝨目 200
Hoplopleuridae 甲脇蝨科 200
Polyplacidae 多板蝨科 201
THYSANOPTERA 纓翅目 201
Aeolothripidae 紋薊馬科 201
Thripidae 薊馬科 202
Phlaeothripidae 管薊馬科 203
COLEOPTERA 鞘翅目 204
Cicindelidae 虎甲科 205
Carabidae 步甲科 212
Dytiscidae 龍虱科 268
Haliplidae 沼梭科 272
Gyrinidae 豉甲科 273
Paussidae 棒角甲科 273

Hydrophilidae 牙甲科 274
Silphidae 葬甲科 282
Staphylinidae 隱翅蟲科 284
Histeridae 閻甲科 299
Lycidae 紅螢科 300
Lampyridae 螢科 311
Drilidae 稚螢科 317
Cantharidae 花螢科 318
Cleridae 郭公蟲科 319
Corynetidae 隱跗郭公甲科 321
Dermestidae 皮蠹科 321
Cucujidae 扁甲科 321
Ostomatidae 穀盜科 322
Colydiidae 堅甲科 322
Cybocephalidae 方頭甲科 322
Endomychidae 僞瓢蟲科 324
Coccinellidae 瓢蟲科 324
Meloidae 芫菁科 414
Pyrochroidae 赤翅蟲科 425
Anthicidae 蟻形甲科 425
Cetoniidae 花金龜科 426
Cerambycidae 天牛科 426
Chrysomelidae 葉甲科 426
Curculionidae 象甲科 428
Anthribidae 長角象科 429
Scolytidae 小蠹科 429
STREPSIPTERA 捻翅目 429
Xenidae 大蜂蝙科 429
Stylopidae 蜂蝙科 429
Elenchidae 跗蝙科 430
Halictophagidae 櫛蝙科 430
MECOPTERA 長翅目 431
Bittacidae 蚊蛉科 431
Panorpidae 蝎蛉科 431
MEGALOPTERA 廣翅目 437
Corydalidae 齒蛉科 438
Sialidae 泥蛉科 442
NEUNOPTERA 脈翅目 442
Raphidiidae 蛇蛉科 442
Inocelliidae 盲蛇蛉科 442
Coniopterygidae 粉蛉科 442
Mantispidae 螳蛉科 446
Osmylidae 溪蛉科 446
Dilaridae 櫛角蛉科 449
Berothidae 鱗蛉科 450
Hemerobiidae 褐蛉科 451
Psychopsidae 蝶蛉科 461
Ascalaphidae 蝶角蛉科 462
Nemopteridae 旌蛉科 463
Myrmeleontidae 蟻蛉科 463
Chrysopidae 草蛉科 469
LEPIDOPTERA 鱗翅目 503
Psychidae 袋蛾科 503
Blastobasidae 膠蛾科 504
Heliodinidae 舉肢蛾科 504
Sessidae 透翅蛾科 504
Pyralidae 螟蛾科 504
Epipyropidae 蟬蛾科 506
Momphidae 尖蛾科 506
Tortricidae 捲蛾科 506
Sphingidae 天蛾科 507
Noctuidae 夜蛾科 507
Lycaenidae 灰蝶科 507
Nymphalidae 蛺蝶科 507
DIPTERA 雙翅目 508
Psychodidae 毛蠓科 508
Culicidae 蚊科 508
Toxorhynchitinae 巨蚊亞科 508
Chironomidae 搖蚊科 508
Ceratopogonidae 蠓科 509
Cecidomyiidae 癭蚊科 509
Tabanidae 虻科 510
Stratiomyiidae 水虻科 511
Acroceridae 小頭蠅科 511
Solvidae 木虻科 512
Rachiceridae 腐木虻科 512
Rhagionidae 鷸虻科 512
Vermileonidae 穴虻科 515
Bombyliidae 蜂虻科 515
Asilidae 食蟲虻科 518
Dolichopodidae 長足虻科 533
Empididae 舞虻科 534
Phoridae 蚤蠅科 541
Conopidae 眼蠅科 543
Pipunculidae 頭蠅科 554
Syrphidae 食蚜蠅科 564
Pyrgotidae 蜣蠅科 600
Drosophilidae 果蠅科 604
Megamerinidae 刺股蠅科 605
Chloropidae 黃潛蠅科 606
Chamaemyiidae 斑腹蠅科 606
Trypetidae 實蠅科 608
Scathophagidae 糞蠅科 608
Anthomylidae 花蠅科 612
Calliphoridae 麗蠅科 613
Muscidae 家蠅科 623
Sarcophagidae 麻蠅科 644
Tachinidae 寄蠅科 707
Prosenidae 長足寄蠅科 901
Hypodermatidae 皮蠅科 904

中 冊 Vol. II

HYMENOPTERA 膜翅目 905
Oryssidae 寄樹蜂科 905
Trigonalide 鈎腹蜂科 905
Evaniidae 旗腹蜂科 905
Megalyridae 巨蜂科 905
Stephanidae 冠蜂科 905
Ichneumonidae 姬蜂科 907

Braconidae 繭蜂科 1104
Aphidiidae 蚜繭蜂科 1259
Iballidae 枝跗癭蜂 1276
Liopteridae 光翅癭蜂科 1277
Mesocynipinae 中癭蜂科 1277
Figitidae 環腹癭蜂科 1277
Aspicerinae 狹背癭蜂亞科 1278
Figitinae 環腹癭蜂亞科 1278
Anacharitinae 柄腹癭蜂亞科 1278
Eucoilidae 盾癭蜂科 1278
Cynipidae 癭蜂科 1282
Alloxystinae 蚜癭蜂亞科 1282
Charipinae 克癭蜂亞科 1282
Leucospidae 褶翅小蜂科 1283
Chalcididae 闊小蜂科 1283
Torymidae 突小蜂科 1298
Eurytomidae 肩小蜂科 1302
Ormyridae 刻腹小蜂科 1308
Eucharitidae 蟻小蜂科 1308
Perilampidae 巨胸小蜂科 1309
Pteromalidae 金小蜂科 1309
Spalanginae 黑金小蜂亞科 1309
Pteromalinae 金小蜂亞科 1314
Encyrtidae 跳小蜂科 1357
Eupelmidae 旋小蜂科 1379
Tanaostigmatidae 長痣小蜂科 1386
Signophoridae 橫盾小蜂科 1386
Tetracampidae 四節小蜂科 1387
Aphelinidae 矮小蜂科 1387
Elasmidae 躍小蜂科 1435
Eulophidae 釉小蜂科 1438
Trichogrammatidae 毛小蜂科 1465
Mymaridae 魅小蜂科(纓小蜂科) 1496
Mymarommatidae 柄腹纓小蜂科 1502
Roproniidae 窄腹細蜂科 1503
Heloridae 柄腹細蜂科 1504
Serphidae 細蜂科 1504
Scelionidae 棱腹細蜂科 1507
Telenominae 黑卵蜂亞科 1507
Platygasteridae 扁腹細蜂科 1518
Diapriidae 臺細蜂科 1519
Ceraphronidae 圓細蜂科 1519
Megaspilidae 痣細蜂科 1521
Bethylidae 腫腿蜂科 1521
Dryinidae 螯蜂科 1522
Sclerogibbidae 蛛蜂科 1529
Chrysididae 青蜂科 1529
Cleptidae 尖胸青蜂科 1529
Scoliidae 土蜂科 1529
Tiphiidae 黑土蜂科 1532
Sapygidae 寡毛土蜂 1533
Formicidae 蟻科 1533
Vespidae 胡蜂科 1538
Eumeniinae 蜾蠃亞科 1538
Stenogastrinae 狹腹胡蜂亞科 1550
Polybiinae 異腹胡蜂科 1552
Ropalidiinae 鈴腹胡蜂亞科 1552
Polistinae 馬蜂亞科 1553
Vespinae 胡蜂亞科 1558
Sphecidae 細腰蜂科 1564
Apidae 蜜蜂科 1578
Megachilidae 切葉蜂科 1579
ARACHNEIDA 蛛形綱 1581
ARANEIDA (Araneae) 蜘蛛目 1581
Heptathelidae 七紡器蛛科 1581
Liphistiidae 八紡蛛科 1581
Ctenizidae 螲蟷科 1582
Dipluridae 長尾蛛科 1583
Atypidae 地蛛科 1584
Theraphosidae 捕鳥蛛科 1585
Filistatidae 管網蛛科 1585
Titanoecidae 隱石蛛科 1587
Oecobiidae 埃蛛科 1587
Eresidae 隆頭蛛科 1588
Amaurobiidae 暗蛛科 1589
Psechridae 褸網蛛科 1589
Dictynidae 捲葉蛛科 1590
Uloboridae 武蛛科 1593
Zoropsidae 擬暗蛛科 1596
Dysderidae 石蛛科 1596
Segestriidae 類石蛛科 1596
Leptonetidae 弱蛛科 1597
Oonopidae 卵形蛛科 1598
Sicariidae 花皮蛛科 1600
TRIONYCHA 三爪類 1601
Pholcidae 幽靈蛛科 1601
Zodariidae 擬平腹蛛科 1603
Hersiliidae 長紡器蛛科 1604
Urocteidae 壁錢科 1604
Araneidae 圓蛛科 1605
Tetragnathidae 肖蛸科 1632
Metidae 眉蛛科 1641
Theridiidae 球腹蛛科 1642
Nesticidae 類球腹蛛科 1654
Linyphiidae 皿網蛛科 1655
Erigonidae 微蛛科 1663
Mimetidae 擬態蛛科 1669
Agelenidae 漏斗蛛科 1670
Hahniidae 柵蛛科 1675
Liocranidae 光盔蛛科 1677
Argyronetidae 水蛛科 1677
Lycosidae 狼蛛科 1677
Dolomedidae 狡蛛科 1708
Pisauridae 盜蛛科 1710
Oxyopidae 貓蛛科 1713
DIONYCHA 二爪類 1716
Gnaphosidae 平腹蛛科 1716
Philodromidae 逍遙蛛科 1726

Platoridae 扁蛛科 1727
Clubionidae 管蛛科 1727
Ctenidae 櫛足蛛科 1738
Eusparassidae 巨蟹蛛科 1738
Selenopidae 擬扁蛛科 1740
Thomisidae 蟹蛛科 1741
Salticidae 跳蛛科 1762

下冊 Vol. III

ACARINA 蜱蟎目 1785
Parasitidae 寄蟎科 1785
Digamasellidae 雙革蟎科 1788
Veigaidae 維蟎科 1789
Rhodacaridae 胭蟎科 1789
Blattisocidae 蠊蟎科 1789
Ascaidae 囊蟎科 1791
Phytoseiidae 植綏蟎科 1793
Otopheidomenidae 蛾蟎科 1836
Ameroseiidae 美綏蟎科 1837
Podocinidae 足角蟎科 1837
Eviphididae 真伊蟎科 1838
Macrochelidae 巨螯蟎科 1840
Parholaspidae 派盾蟎科 1842
Laelapidae 厲蟎科 1842
Hirstionyssidae 赫刺蟎科 1856
Haemogamasidae 血革蟎科 1858
Spinturnicidae 蝠蟎科 1863
Dermanyssidae 皮刺蟎科 1865
Liponyssidae 棘刺蟎科 1871
Macronyssidae 巨刺蟎科 1872
Varroidae 瓦蟎科 1873
Diplogynidae 雙雌蟎科 1873
Celaenopsidae 黑面蟎科 1873
Euzerconidae 真穴蟎科 1873
Schizogyniidae 縫雌蟎科 1873
Megisthanidae 巨寄蟎科 1874
Fedrizziidae 費蟎科 1874
Klinokowstroemiidae 克林蟎科 1874
Paramegistidae 副巨蟎科 1874
Promegistidae 原巨蟎科 1874
Ixodidae 硬蜱科 1874
Argasidae 軟蜱科 1894
Penthaleidae 葉爪蟎科 1895
Iolinidae 蠊寄蟎科 1895
Paratydeidae 副蠊螯蟎科 1895
Ereynetidae 蝓蟎科 1896
Tydeidae 蠊螯蟎科 1896
Cunaxidae 巨須蟎科 1897
Pyemotidae 蒲蟎科 1897
Dolichocybidae 長頭蟎科 1898
Acarophenacaridae 小首蟎科 1898
Scutacaridae 盾蟎科 1898
Tarsonemidae 跗線蟎科 1898
Podapolipidae 蚴蟎科 1900
Stigmaeidae 長鬚蟎科 1900
Eupalopsellidae 小真石蟎科 1903
Camerobiidae 拱蟎科 1904
Cheyletidae 肉食蟎科 1904
Myobiidae 肉蟎科 1907
Anystidae 大赤蟎科 1907
Erythraeidae 赤蟎科 1908
Neotrombidiidae 新絨蟎科 1909
Trombidiidae 絨蟎科 1909
Trombiculidae 恙蟎科 1910
Leeuwenhoekiidae 里紋恙蟎科 1945
Johnstonianidae 約絨蟎科 1946
Hydryphantidae 盾水蟎科 1946
Lebertiidae 腺水蟎科 1946
Limnesiidae 沼蟎科 1946
Pionidae 軟滑水蟎科 1947
Hygrobatidae 濕蟎科 1947
Arrenuridae 雄尾蟎科 1947
Acaridae 粉蟎科 1947
Canestriniidae 寄甲蟎科 1948
Hemisarcoptidae 半疥蟎科 1948
Syringophilidae 羽管蟎科 1949
PSEUDOSCORPIONIDA 偽蠍目 1949
Chelonthidae 偽蠍科 1949
MYRIAPODA 多腳綱 1950
Scolopendridae 蜈蚣科 1950
CNIDARIA 腔腸動物 1950
PLATYHELMINTHES 扁形動物 1950
VERTEBRATES 脊椎動物 1950
FRESHWATER FISHES 淡水魚類 1950
Homalopteridae 平鰭鰍科 1950
Cyprinidae 鯉科 1951
Cobitididae 鰍科 1958
Clariidae 塘蝨魚科 1958
Siluridae 鯰科 1958
Amblycepidae 鮰科 1959
Bagridae 鮠科 1959
Saimonidae 鮭科 1960
Plecoglossidae 鰈科 1960
Exocoetidae 文鰩魚科 1960
Oryziatidae 米鱂科 1961
Poeciliidae 花鱂魚科 1961
Synbranchidae 鱔科 1961
Kuhiliidae 湯鯉科 1961
Cichlidae 慈鯛科 1962
Apogonidae 天竺鯛科 1962
Rhyacichthyidae 溪鱧科 1963
Eleotridae 塘鱧科 1964
Gobiidae 鰕虎科 1964
Channidae 鱧科 1964
Anabantidae 鬥魚科 1965
AMPHIBIA 兩棲綱 1965
ANURA 無尾目 1965
Discoglossidae 盤舌蟾科 1965
Bufonidae 蟾蜍科 1965

Pelobatidae 鋤足蟾科 1967
Hylidae 雨蟾科 1969
Raniidae 蛙科 1971
Rhacophoridae 樹蛙科 1977
Microhylidae 狹口蛙科 1979
CAUDATA 有尾目 1980
SALAMANDRIFORMES 蠑螈目 1980
Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 1980
Hynobiidae 小鯢科 1981
Salamandridae 蠑螈科 1982
SALIENTIA 無尾目 1982
LACERTILIA 蜥蜴目 1982
Gekkonidae 壁虎科 1982
Agamidae 飛蜥科 1986
Lacertidae 蜥蜴科 1987
Scincidae 石龍子科 1990
Anguidae 蛇蜥科 1994
REPTILIA 爬行綱 1994
CHELONIA 龜鱉目 1994
Trionychidae 鱉科 1994
Emydidae 澤鱉科 1994
AVES 鳥綱 1994
PODICIPEDIFORMES 鸊鷉目 1995
Podicipedidae 鸊鷉科 1995
CICONIIFORMES 鸛形目 1995
Threskiornithidae 朱鷺科 1995
Ardeidae 鷺科 1995
Ciconiidae 鸛科 1999
Threskiornithidae 䴉科 2000
ANSERIFORMES 雁形目 2000
Anatidae 雁鴨科 2000
FALCONIFORMES 鷹形目 2007
Accipitridae 鷲鷹科 2007
Falconidae 隼科 2014
GALLIFORMES 雞形目 2016
Phasianidae 雉科 2016
GRUIFORMES 鶴形目 2023
Turnicidae 三趾鶉科 2023
Gruidae 鶴科 2023
Rallidae 秧雞科 2025
CHARADRIIFORMES 鷸形目 2028
Otididae 鴇科 2028
Jacanidae 雉鴴科(水雉科) 2028
Phalaropodidae 瓣蹼鷸科 2028
Rostratulidae 彩鷸科 2028
Haematopodidae 蠣鷸科 2029
Recurvirostridae 反嘴鷸科 2029
Burhinidae 石鴴科 2029
Ibidorhynchidae 䴉嘴鴴科 2029
Glareolidae 燕鴴科 2030
Charadriidae 鴴科 2030
Scolopacidae 鷸科 2033
LARIFORMES 鷗形目 2041
Laridae 鷗科 2041
COLUMBIFORMES 鴿形目 2044
Pteroclididae 沙雞科 2044
Columbidae 鳩鴿科 2044
CUCULIFORMES 鵑形目 2045
Cuculidae 杜鵑科 2045
STRIGIFORMES 鴞形目 2049
Tytonidae 草鴞科 2049
Strigidae 鴟鴞科 2049
Podargidae 蟆口鴟科 2055
Caprimulgidae 夜鷹科 2055
APODIFORMES 雨燕目 2056
Apodidae 雨燕科 2057
Hemiprocnidae 鳳頭雨燕科 2058
Trogonidae 咬鵑科 2058
CARACIFORMES 佛法僧目 2059
Alcedinidae 翠鳥科 2059
Meropidae 蜂虎科 2060
Coraciidae 佛法僧科 2060
Upupidae 戴勝科 2061
Bucerotidae 犀鳥科 2062
PICIFORMS 鴷形目 2062
Capitonidae 五色鳥科 2062
Eurylaimidae 闊嘴鳥科 2063
Picidae 啄木鳥科 2063
PASSERIFORMES 雀形目 2069
Pittidae 八色鳥科 2069
Alaudidae 伯靈科 2070
Hirundinidae 燕科 2072
Motacillidae 鶺鴒科 2074
Campephagidae 山椒鳥科 2079
Pycnonotidae 鵯科 2081
Irenidae 和平鳥科 2085
Laniidae 伯勞科 2085
Bombycillidae 太平鳥科 2088
Cinclidae 河鳥科 2089
Troglodytidae 鷦鷯科 2089
Prunellidae 岩鷚科 2089
Turdidae 鶇科 2090
Timaliidae 畫眉科 2104
Panuridae 鴉雀科 2120
Sylviidae 鶯科 2122
Muscicapidae 鶲科 2137
Monarchidae 王鶲科 2142
Remizidae 攀雀科 2144
Aegithalidae 長尾山雀科 2144
Paridae 山雀科 2145
Sittidae 鳾科 2148
Zosteropidae 繡眼科 2148
Fringillidae 雀科 2149
Ploceidae 文鳥科 2153
Dicruridae 捲尾科 2155
Sturnidae 椋鳥科 2156
Oriolidae 黃鸝科 2158
Corvidae 鴉科 2159

MAMMALIA 哺乳綱 2162
INSECTIVORA 食蟲目 2162
Erubaceidae 刺猬科 2162
Talpidae 鼴鼠科 2162
Soricidae 鼩鼱科 2163
CHIROPTERA 翼手目 2164
Megadermatidae 假吸血蝠科 2164
Hipposideridae 蹄蝠科 2164
Vespertilionidae 蝙蝠科 2165
Rhinolophidae 菊頭蝠科 2171
Molossidae 皺鼻蝠科 2173
PHOLIDOTA 鱗甲目 2174
Manidae 鯪鯉科 2174
RODENTIA 嚙齒目 2174
Petauristidae 鼯鼠科 2174
Muridae 鼠科 2174
CARNIVORA 食肉目 2175
Canidae 犬科(狗) 2175
Mustelidae 貂科 2175
Viverridae 靈貓科 2175
Felidae 貓科 2176
MOLLUSCA 軟體動物門 2176
GASTROPODA 腹足綱 2176
PULMONATA 肺螺目 2176
Oleacina 肉食蝸牛科 2176
Strelaxidae 肉食小蝸牛科 2177
Bradybaenidae 扁蝸科 2177
Helicarionidae 鱉甲蝸科 2177
BACTERIOPHYTA 細菌門(Bacteria 細菌) 2177
EUBACTERIALES 真細菌目 2177
Pseudomonadaceae 假單孢菌科 2177
Entrobacteriaceae 腸桿菌科 2178
Bacillaceae 芽孢桿菌科 2180
Streptomycetaceae 鏈黴菌科 2188
Virus 病毒 2190
Baculoviridae 桿狀病毒科 2190
Nuclear polyhedrosis virus, NPV 核型多角體病毒 2190
Granulosis virus, GV 顆粒體病毒 2209
Reoviridae 呼腸孤病毒科 2226
Cytoplasmic Polyhedrosis Viruses, CPV 質型多角體病毒 2216
Iridoviridae 虹彩病毒科 2220
Poxviridae 痘病毒科 2220
Parvoviridae 細小病毒科 2220
Densonucleosis viruses 濃核病毒 DNV 2220
Acute bee parlysis virus 蜂急性麻痺病毒 APV 2221
Picornaviridae 微核糖核酸科 2221
未定昆蟲病毒 2222
EUMYCOTA 真菌門(Fungi) 2223
MASTIGOMYCOTINA 鞭毛菌亞門 2223
BLASTOCLADIALES 芽枝菌目 2223
Coelomomycetaceae 雕蝕菌科(蚊菌科) 2223
OOMYCETES 卵菌綱 2223
Lagenidiaceae 葫蘆菌科 2223
ZYGOMYCETES 接合菌亞門 2223
MUCORALES 毛霉目(酵黴目) 2223
Mucoraceae 毛霉科(酵黴科) 2223
Mortierellaceae 被孢霉科(腐植菌科) 2224
ENTOMOPHTHORALES 蟲霉目 2225
Aucylistaceae 新月霉科 2225
Entomophthoraceae 蟲霉科 2225
CLAVICIPITALES 麥角菌目 2232
Clavicipitaceae 麥角菌科 2232
LABOULBENIOMYCETALES 蟲生菌目 2238
Laboulbeniaceae 蟲生菌科 2238
BASIDIOMYCOTINA 擔子菌亞門 2243
UREDINALES 銹菌目 2243
Melampsoraceae 黑腫病科 2243
SEPTOBASIDIALES 紋羽病菌目 2244
Septobasidiaceae 紋羽病菌科 2244
HERICIALES 猴頭菌目 2244
Lentinaceae 香菇科 2244
DEUTEROMYCOTINA 半知菌亞門 2245
MONILIALES 叢梗孢目 2245
Moniliaceae 叢梗孢科 2245
Dematiaceae 暗梗孢科 2269
Stilbellaceae 櫛束孢科 2270
Tuberculariaceae 瘤座孢科 2271
Nectrioidaceae (=Zythiaceae) 鮮殼孢科 2281
捕捉線蟲真菌 2286
MELANCONIALES 黑盤孢目 2290
Melanconiaceae 黑分子孢子菌科 2290
未定位真菌 2291
PROTOZOA 原生動物 2291
KINETOPLASTIDA 動基體目 2291
TRYPANOSOMATINA 錐蟲亞目 2291
Trypanosomatidae 錐蟲科 2291
MICROSPORA 微孢子綱 2292
Nosomatidae 微孢子科 2292
NEMATODA 線蟲 2295
Mermithidae 索科 2295
Heterorhabditidae 異小桿線蟲科 2302
Steiernematidae 斯氏線蟲科 2305
ENOPLIDA 埃諾甫目 2314
Mononchidae 食線蟲科 2314
Meloidogynidae 根結線蟲科 2314
Aphelenchinae 真滑刃亞科 2314
未定位簇蟲 2314
Flora 植物 2315
Azollaceae 滿江紅科 2315
Papilionaceae 蝶形花科 2315
參考文獻
天敵學名索引
天敵中名索引
天敵寄主索引

害 蟲 天 敵 名 錄

A List of Natural Enemies of Insect Pests

林 珪 瑞 編著

Compiled by **K. S. Lin**

(ASZI et Zhejing, Univ., 1978:1-300; Chao, 1982[ed.]:1-354; Fujian AC, 1980: ;
He et Pang, 1986:ii+1-291; He, 1991[ed.], viii + 1-244; He et al., 1979[ed.] iii+1-210;
Heilongjing, Mudingjiang FS., 1988[ed.]:123-127; Kuang, 1990:; Liang, 1989:176-198; Lu, 1985:1-471;
Lu, 1996, 22(6):44-45; Piao, 1998{ed.}, ix + 1-193; Shaanxi Hunan FSRI, 1990[ed.]:1-206; Wu et al., 1990:187-207;
Yan et al., 1995, vi+1-328; Yen et al., 1996:1-521; Yue, 1991[ed.]:1-268(127-140))

INSECTA 昆蟲綱

COLLEMBOLA 彈尾目

Entomobryidae 長角跳蟲科

部分種類能捕食線蟲

ODONATA 蜻蜓目

Calopterygidae (Agrionidae) 珈螅科(色螅科)

Agrion atratum Selys 黑色螅 (Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:82; Zhou et al., 1995:44)

Agrion atratum Selys, 1853:

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、北京、東北。

Agrion grahami Needham 透頂色蟌 (Yunn., 1987:29)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Agrion guabrigerum Seirs 豆娘 (Gao et Zhang, 1994, 10(1):47)

捕 食：*Oulema oryzae* Kuwayama 負泥蟲

分 佈：吉林。

Archineura incarmata (Karscl) 赤基麗色蟌 (Hun., 1992:13; Sui et al., 1992:35; Zhou et al., 1995:44)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、浙江。

Caliphaea confusa Selys (Chao, 1994:65)

Caliphaea confusa Selys

=*Caliphaea consimilis* McLachlan

捕 食 性。

分 佈：雲南(大理)。

Calopteryx atrata Selys

捕 食 性。

分 佈：

Calopteryx atrocyana Fraser

捕 食 性。

分 佈：

Calopteryx coomani Fraser

捕 食 性。

分 佈：

Calopteryx cornelia Selys 深山艷娘 (He, et al., 1991:79)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：河南。

Calopteryx grandaeva Hagen 金綠艷娘 (He, et al., 1991:79; Lieftinck et al., 1984:64)

Agrion grandaeva (Selys)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、四川、浙江。

Calopteryx laosica Fraser 寮國河蟌 (Zhou, 1987:248)

Calopteryx laosica Fraser, 1933:

捕 食 性。

分 佈：雲南；寮國。

Calopteryx melli Ris. 寬翅色蟌 (Zhou et al., 1995:44)

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、浙江。

Calopteryx virgo Linnaeus

捕 食 性。

分 佈：

Calopteryx virgo japonica Selys 青肌艷娘 (He, et al., 1991:79)

別 名：*日本黃條色蟌*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：湖南、河南、河北、東北。

Echo margarita margarita Selys 雙帶麗色蟌 (Sui et Sun, 1988:26)

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Matrona basilaris basilaris Selys 透頂單脈色蟌 (Hun.,1992:13; Lieftinck et al., 1984:11; Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:82; Yunn., 1987:29; Zhou et al., 1995:44; Chao, 1994: 66)

Matrona basilaris Selys, 1853:17.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、山西、河北、北京；日本、琉球群島、越南、印度。

Matrona basilaris ssp. **nigripectus** Oguma 白痣珈蟌 (Chen, 1996, 18(1):20; Lieftinck et al., 1984:11; Sui et al., 1992:35; Zhou et al., 1995:44)

Matrona basilaris ssp. *nigripectus* Oguma, 1912:312.

=*Matrona fascialis,* Kato, 1933: pl. 4(2). (err. for *basilaris*)

=*Matrona formosana* Matsumura, 1907:10. nom. nud.

=*Matrona coerulea* Matsumua, 1907:10. nom. nud.

別 名：*褐單脈色蟌*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、浙江、湖北。

Mnais andersoni andersoni McLachlan (Chao, 1994:66; Lieftinck et al., 1984:12)

Mnais andersoni McLachlan, 1873:472.

捕 食 性。

分 佈：雲南；泰國、緬甸。

Mnais andersoni tenuis Oguma 細胸珈蟌 (Lieftinck et al., 1984:12)

=*Mnais pruinosa,* Matsumura, 1907:10. (*nec* Selys 1853)

=*Mnais earnshawi,* Ris, 1916:8, 10. (*nec* Williamson, 1904)

=*Mnais costlis,* Needham, 1930:205, 207. (*nec* Selys, 1869)

Mnais tenuis Oguma, 1931:315.

=*Mnais mneme,* Navás, 1934:2.
=*Mnais strigata,* Kato, 1938:28.
Mnais andersoni tenuis: Asahina, 1975:260-262.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、華東、華北。

Mnais auripennis Needham 燦綠色蟌 (Zhou et al., 1995:44)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、雲南、四川、浙江、安徽。

Mnais earnshawi Williamson 綠蟌 (Sui et al., 1992:35; Zhang, 1987[ed.] :34)
別 名：*紅痣綠色蟌*。
捕 食 性。
分 佈：湖南、江西、海南、雲南、浙江、湖北。

Mnais gregoryi Fraser 中華綠蟌 (Yunn., 1987:28)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Mnais icteroptera Fraser 紅痣綠色蟌 (Sun, 1997:83)
Mnais icteroptera Fraser, 1929:
捕 食 性。
分 佈：江西、廣東、雲南、湖北。

Mnais mneme Ris 煙翅綠色蟌 (Sui et Sun, 1992:51; Sui et al., 1992:36)
Mnais mneme Ris, 1916:
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖北。

Mnais pruinosa Selys 艷娘 (He, et al., 1991:79)
Mnais strigata Selys
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：河南、陝西。

Mnais strigata Selys (Lieftinck et al., 1984:64)
Mnais strigata Selys, 1853:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Neurobasis chinensis Linnaeus 華艷色蟌 (Chao, 1994:66; Yunn., 1987:29)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南；印度。

Psolodesmus mandarinus mandarinus McLachlan 中華珈蟌(廈門亞種) (Lieftinck et al., 1984:13)

Psolodesmus mandarinus McLachlan, 1870:170.
Psolodesmus mandarinus mandarinus, Chen, 1950:28.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Psolodesmus mandarinus dorothea Williamson 中華珈蟌(南臺亞種) (Lieftinck et al., 1984: 13)

Psolodesmus dorothea Williamson, 1904:249.
Psolodesmus mandarinus dorethea, Chen, 1950:29.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Psolodesmus sp. 褐頂色蟌 (Zhou et al., 1995:44)

捕 食 性。
分 佈：浙江。

Vestalis gracilis Rambur 多橫細色蟌 (Chao, 1994:66; Yunn., 1987:29)

捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Vestalis smaragdina Selys (Lieftinck et al., 1984:64; Zhang, 1987[ed.]:34)

Vestalis smaragdina Selys, 1879:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、中國大陸、西藏；印度。

Vestalis smaragdina velata Ris 黑角細色蟌 (Zhou et al., 1995:45)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江。

Vestalis virens Needham 褐翅細色蟌 (Zhou et al., 1995:45)

捕 食 性。
分 佈：福建、廣西、浙江。

Euphaeidae 幽蟌科

Bayadera brevicauda brevicauda Frase 短尾幽蟌 (Lieftinck et al., 1984:14)

=*Bayadera hyalina* Ris, 1912:49, 51.
Bayadera brevicauda Fraser, 1928:51. new name for *hyalina* Ris, 1912.
Bayadera brevicauda brevicauda, Ishida, 1968:18.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Bayadera bravicauda continentalis Asahina 短尾溪蟌 (Lieftinck et al., 1984:15; Zhou et al., 1995:45)

Bayadera bravicauda continentalis Ashina, 1973:455.

捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Bayadera melanopterus Ris 巨齒尾溪蟌 (Zhou et al., 1995:45)
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東、貴州、四川、浙江、安徽、湖北。

Euphaea formosa Hagen 短腹幽蟌 (Lieftinck et al., 1984:14)
Euphaea formosa Hagen *in* Selys, 1869:660.
Euphoea (sic) *formosana* Matsumura, 1907:10. nom. nud.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Euphaea opaca Selys 褐翅黑溪蟌 (Zhou et al., 1995:45)
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江、安徽。

Philoganga rubusta Navas 粗壯溪蟌 (Zhou et al., 1995:45)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、貴州、浙江。

Philoganga vetusta Ris 大溪蟌 (Zhou et al., 1995:45)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、貴州、浙江。

Euphacidae (Epallagidae) 溪蟌科

Allophaea ochracea (Selys) 黃翅溪蟌 (Chao, 1994:66; Yunn., 1987:29)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南；印度。

Anisophaea decorata Selys (Chao, 1994:66)
Anisophaea decorata Selys
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南。

Anisopleura furcata Selys 藍斑溪蟌 (Sui et al., 1992:36)
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、四川；印度。

Anisopleura qingyuanensis Zhou 慶元異翅溪蟌 (Zhou, 1982:65; Zhou et al., 1995:45)
Anisopleura qingyuanensis Zhou, 1982:65.
捕 食 性。

分 佈：浙江。

Bayadera bidentata Needham 二齒尾溪蟌 (Sui et al., 1992:36)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、浙江。

Bayadera melanopteryx Ris 巨齒尾溪蟌 (Sui et al., 1992:36; Sun, 1997:83)

Bayadera melanopteryx Rris, 1912:

捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州、浙江、湖北。

Caliphaea confusa Selys 綠閃溪蟌 (Yunn., 1987:29)

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Caliphaea consimilis McLachlan 紫閃溪蟌 (Sui et Sun, 1992:51; Sui et al., 1992:36; Sun, 1997:84)

Caliphaea consimilis McLachlan, 1894:

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北。

Euphaea masoni Selys (Chao, 1994:66)

Euphaea masoni Selys

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Euphaea opaca Selys (Chao, 1994:66)

Euphaea opaca Selys

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Pseudophaea deecorata Selys 方帶暗溪蟌 (Chen, 1996, 18(1):20)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Pseudophaea masoni (Selys) 透頂暗溪蟌 (Yunn., 1987:29)

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Libellaginidae (Rhycrocyphidae) 隼蟌科

Rhinocypha cuneata Selys (Chao, 1981:54; Wu, 1988:571)

捕 食 性。

分 佈：廣西、西藏(墨脫)；印度、孟加拉。

Rhinocypha drusilla Needham 細紋鼻蟌 (Zhou et al. 1995:45)

別 名：*線紋鼻蟌*。
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Rhinocypha fenestrella Rambur 黃脊鼻蟌 (Yunn., 1987:30)

捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Rhinocypha iridea Selys 黃條鼻蟌 (Yunn., 1987:30)

捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Rhinocypha sp. 鼻蟌 (Sui et al., 1992:36)

捕 食 性。
分 佈：四川。

Chlorocyphidae (Libellaginidae) 鼓蟌科(隼蟌科)

Aristocypha fenestrella Rambur (Chao, 1994:66)

Aristocypha fenestrella Rambur
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Heliocypha biforata delimbata Selys (Chao, 1994:66)

Heliocypha biforata delimbata Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Heliocypha perforata Percheron (Chao, 1994:66)

Heliocypha perforata Percheron
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Libellago lineata lineata (Burmeister) 脊紋鼓蟌 (Lieftinck et al., 1984:15)

Calopteryx lineata Byrneusterm 1839:826.
Libellago lineata lineata, Fraser, 1934:60.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；越南、緬甸、爪哇、婆羅洲。

Rhinocypha fenestrella baibarana Matsumura 簾格鼓蟌 (Lieftinck et al., 1984:15)

Rhinocypha baibarana Matsumura, 1931:1458.
Rhinocypha fenestrella baiharana, Asahina, 1972:2.

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhinocypha perforata perforata (Percheron) 棋紋鼓蟌 (Chen, 1996, 18(1):20; Lieftinck et al., 1984:16)
Agrion perforatus Percheron, 1835: pl. 2.
=*Rhynocypha* (sic) *14-maculata* Oguma, 1913:319.
Rhinocypha perforata, Ris, 1916:4.
=*Rhynocypha* (sic) *albistigma* Matsumura, 1931:1458.
=*Rhinocypha maculata* Matsumura, 1931:1458.
=*Rhynocypha* (sic) *katharina* Oguma, 1932:1945.
Heliocypha perforata perforata: Laidlaw, 1950:277, 278.
別 名：*三斑鼻蟌*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、中國大陸；越南。

Lestidae 絲蟌科

Ceylonolestes gracilis (Hagen) 斑脊藍絲蟌 (Sun, 1997:90)
Ceylonolestes gracilis (Hagen, 1859:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖北；印度。

Indolestes assamicus Fraser (Chao, 1994:66)
Indolestes assamicus Fraser
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Indolestes birmanus Selys (Chao, 1994:66)
Indolestes birmanus Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Indolestes extraneus Needham (Chao, 1994:66; Zhang, 1987[ed.] :34)
Indolestes extraneus Needham
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南。

Indolestes peregnnus (Ris) (Zhang, 1987[ed.] :34)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Lestes (s. str.) **concinnus** Hagen 鑲紋絲蟌 (Lieftinck et al.,1984:16)
Lestes concinna Hagen *in* Selys, 1862:321.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓、馬來西亞、泰國、新喀多尼亞、澳洲。

Lestes (Indolestes) cyaneus Selys 青紋絲蟌 (Lieftinck et al.,1984:16)

Lestes cyanea Selys, 1862:335.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；尼泊爾，高海拔。

Lestes dorothea Fraser 黑頂絲蟌 (Sui et Sun, 1988:27)

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Lestes nodalis Selys (Chao, 1994:67)

Lestes nodalis Selys

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Lestes praemorsus Selys (Chao, 1994:67)

Lestes praemorsus Selys

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Lestes (Platylestes) praemorsus praemorsus Hagen 隱紋絲蟌 (Lieftinck et al.,1984:17)

Lestes praemorsa Hagen *in* Selys, 1862:320.

Lestes praemorsa praemorsa, Fraser, 1933:30.

Lestes (*Platylestes*) *praemorsus*, Lieftinck, 1960:132.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓、Celebes, Lesser Sunda Is., Molucca Is., 新幾內亞。

Lestes sponsa Hansemann 絲蟌 (He et al., 1991:78)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：湖南、東北。

Lestes sp. 絲蟌 (Chen, 1996, 18(1):20)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Orolestes selysi McLachlan 長痣絲蟌 (Chao, 1994:67; Lieftinck et al.,1984:17)

Orolestes selysi McLachlan, 1895:21-23.

=*Megalestes mirabilis* Matsumura, 1913:50.

=*Megalestes major,* Matsumura, 1931:1462. (*nec* Selys, 1862)

=*Orolestes* sp. cf. *wallacei* (Kirby), Lieftinck, 1939:39.

=*Orolestes koxingai* Chen, 1950:25.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南；越南、寮國、印度。

Sympycna paedisma annulata Selys 三葉黃絲蟌 (Chao, 1981:53; Sui et Sun, 1996:38)

Sympycna paedisma annulata Selys, 1887:

捕 食 性。

分 佈：西藏、新疆；印度。

Amphipterygidae 麗蟌科

Philoganga robusta Navas 壯麗蟌 (Chao, 1953:138; Zhang, 1987[ed.] :34)

Philoganga robusta Navas, 1936:43-44.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、貴州。

Philoganga robusta infantua Yang et Li 瑛鳳麗蟌 (Yang et Li, 1994:460)

Philoganga robusta ssp. *infantua* Yang et Li, 1994:460.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Philoganga vetusta Ris 大溪蟌 (Chao, 1953:140; Sui et al., 11992:36)

Philoganga vetusta Ris, 1912:47.

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)、湖南、廣東、海南、浙江。

Pseudophaea decorata Selys 方帶暗溪蟌 (Sui et al., 1992:36)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南。

Chlorolestidae (Synlestidae) 綜蟌科(洵蟌科)

Indolestes extranea Needham 奇異赭絲蟌 (Zhou et al., 1995:46)

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇、湖北。

Megalestes chengi Chao 褐腹綠綜蟌 (Zhou et al., 1995:46)

捕 食 性。

分 佈：福建、浙江。

Megalestes distans Needham 褐尾綠綜蟌 (Chao, 1994:66; Sui et Sun, 1992:51; Sui et al., 1992:38; Sun, 1997:91)

Megalestes distans Needham, 1930:

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川(峨嵋)。

Megalestes heros Needham 黃腹綠綜蟌 (Zhou et al., 1995:46)

捕 食 性。

分 佈：福建、四川、浙江。

Megalestes maai Chen 黃腹洵蟌 (Lieftinck et al., 1984:18)

=*Megalestes major,* Ris, 1916:11.
Megalestes maai Chen, 1947:27.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Megalestes micans Needham 細腹綠綜蟌 (Chao, 1994:66; Sui et Sun, 1992:52; Sui et al., 1992:38)

Megalestes micans Needham, 1930:
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、四川。

Megalestes riccii Navás (Zhang, 1987[ed.] :35)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Megalestes sp. 紅蟌 (He et al., 1991:79)

捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：四川。

Sinolestes ornata Needham 白條綠山蟌 (Zhou et al., 1995:45)

捕 食 性。
分 佈：福建、廣西、浙江。

Megapodagrionidae 山蟌科(蹣蟌科)

Mesopodagrion tibetanum MacLachlan 藏山蟌 (Chao, 1987:112; Chao, 1994:67; He et al., 1991:79; Sui et Sun, 1992:51; Sui et al., 1992:38; :Sun, 1997:89)

Mesopodagrion tibetanum MacLachlan, 1896:327.
=*Mesopodagrion yachownsis* Chao, 1953:330-334.
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西；緬甸、印度。

Pseudolestidae 擬絲蟌科

Rhipidolestes aculeatus aculeatus Ris 芽痣蹣蟌 (Lieftinck et al., 1984:18)

=*Argia apicalis* Matsumura, 1907:10. nomen nudum.
Rhipidolestes aculeata Ris, 1912:59.
Rhipidolestes aculeata aculeata, Asahina, 1966:106.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球(Ishigaki, Iriomote)。

Rhipidolestes jucunda Lieftinck 紅面大絲蟌 (Zhou et al., 1995:46)

捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Rhipidolestes nectans Needham 黑大絲蟌 (Zhou et al., 1995:46)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Rhipidolestes (Taolestes) rubripes (Navás) (Zhang, 1987[ed.] :35)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Rhipidolestes sp. (Chao, 1994:67)
Rhipidolestes sp., Chao, 1994:67.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Rhipidolestes sp. 棘腹蟌 (Chen, 1996, 18(1):20)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Platycenemididae (Platictidae) 扇蟌科(琵蟌科)

Calicnemis erythromelas Selys 赭腹麗扇蟌 (Chao, 1994:68; Yunn.1987:30)
Calicnemis erythromelas Selys.
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Calicnemis eximia (Selys) 美姿琵蟌 (Chao, 1981:53; 1994:68; Lieftinck et al., 1984:20; Sui et Sun, 1992:51)
Calicnemis eximia Selys, 1863:160.
別 名：*朱腹麗扇蟌*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、西藏(墨脫)、四川；印度(北部)、錫金、尼泊爾、阿富汗。

Calicnemis miniata Selys 紅腹麗扇蟌 (Sun, 1997:87)
Calicnemis miniata Selys, 1886:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖北；印度。

Calicnemis sinensis Lieftinck 華麗扇蟌 (Zhou et al., 1995:46)
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、浙江。

Coeliccia chromothorax Selys (Chao, 1994:68)

Coeliccia chromothorax Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Coeliccia cyanomelas Ris 青黑琵蟌 (He et al., 1991:80; Zhou et al., 1995:46)
Coeliccia cyanomelas Ris, 1912:62, 64.
別 名：*長蟌*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、四川、浙江；亞洲東部。

Coeliccia didyma (Selys) 長蟌 (Chen, 1996, 18(1):20; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:87; Zhang, 1987[ed.] :35)
Coeliccia didyma (Selys, 1836:)
別 名：*四斑長腹扇蟌*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、湖北、北京。

Coeliccia sexmaculatus Wang 六斑腹蟌 (Wang, 1994:82)
Coeliccia sexmaculatus Wang, 1994:82.
捕 食 性。
分 佈：河南。

Coeliccia sp. (Chao, 1994:68)
Coeliccia sp., Chao, 1994:68.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Copera annulata (Selys) 白狹扇蟌 (Chao, 1994;68; He et al., 1991:80; Hun., 1992:15; Lieftinck et al.,1984:19; Sui et al., 1992:371 Sun, 1997:87)
Platycnemis annulata Selys, 1863:172.
Copera annulata: Ris, 1916:17.
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、湖北、河南、北京；日本、馬來西亞、印度、爪哇。

Copera marginipes (Rambur) 脛蹼琵蟌 (Chao, 1994:68; Lieftinck et al., 1984:20; Zhang, 1987[ed.] :35)
Platycnemis marginipes Rambur, 1842:240.
Copera marginipes, Ris, 1916:18.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、雲南；Lesser Sunda Is.

Copera vittata Selys 褐狹扇蟌 (Chao, 1994:68; Sun, 1997:88)
Copera vittata Selys, 1886:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；印度。

Eanllagma ambiguum Navás (Zhang, 1987[ed.] :35)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Platycnemis foliacea Selys 白葉足蟌 (He et al., 1991:80; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:88)
Platycnemis foliacea Selys, 1886:
別 名：*白扇蟌*。
捕 食：稻田昆蟲。
柑橘園害蟲
分 佈：江西、湖南、浙江、湖北、河北、北京。

Platycnemis foliacea sasakii Asahina 軍配絲豆娘 (He et al., 1991:80)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：河南。

Platycnemis sp. 扇蟌 (He et al., 1991:80)
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬
分 佈：湖南。

Pyrrhosoma tinctipennis Maclachlan (Chao, 1981:53; Wu, 1988:571)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)、四川；印度、錫金。

Platystictidae 纖蟌科

Drepanosticta brownelli (Timkham) 包氏扇蟌 (Zhou, 1986:208)
捕 食 性。
分 佈：海南(興峰嶺)。

Drepanosticta nr. **hilaris** Selys (Chao, 1994:68)
Drepanosticta nr. *hilaris* Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Platysticta sp. (Chao, 1994:68)
Platysticta sp., Chao, 1994:68.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Prodasineura autumnalis Fraser (Chao, 1994:68)
Prodasineura autumnalis Fraser

捕 食 性。
分 佈：雲南。

Prodasineura verticalis Selys (Chao, 1994:68)
Prodasineura verticalis Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Protosticta sp. (Chao, 1994:68)
Protosticta sp., Chao, 1994:68.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Protoneuridae 樸蟌科(原蟌科)

Caconeura autumnalis Fraser 鳥微橋蟌 (Chen, 1996, 18(1):20)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Caconeura longjingensis Zhou 龍井凱原蟌 (Zhou, 1981:61-62)
Caconeura longjingensis Zhou, 1981:61.
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州、龍井)。

Prodaineura croconota (Ris) 朱背樸蟌 (Lieftinck et al., 1984:20)
Diparoneura croconota Ris, 1916:18.
(?) *Caconeura longiingensis* Zhou, 1981:61-62.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

Coenagrionidae 細蟌科(蟌科)

Aciagrion hisopa Selys 沼狹翅蟌 (Zhou et al., 1995:46)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Aciagrion hyposa Selys (Chao, 1994:67; Ren et al., 1993(3):28)
Aciagrion hyposa Selys
寄 主：柑橘園害蟲
分 佈：雲南、浙江。

Aciagrion migratum (Selys) 針尾細蟌 (Lieftinck et al., 1984:24)
Pseudagrion microcephalum race? *migratum* Selys, 1876:507.
=*Aciagrion hisopa,* Ris, 1916:39.

Aciagrion migratum, Matsuki et Lien, 1979:20.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本。

Aciagrion olympicum Laidlaw 藍尾狹翅蟌 (Sui et Sun, 1988:26; Sui et al., 1992:36)
捕 食 性。
分 佈：湖南、西藏；印度。

Aciagrion pallidum Selys (Chao, 1994:67)
Aciagrion pallidum Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Aciagrion sp. 藍尾豆娘 (He et al., 1991:78)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：浙江。

Agriocnemis femina (Brauer) 橙紅小蟌 (Chao, 1994:67; He et al., 1991:78; Hun., 1992:14; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:36)
別 名：*橙紅蟌，杯斑小蟌*。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬
柑橘園害蟲
分 佈：湖南、雲南、浙江；緬甸、孟加拉。

Agriocnemis femina oryzae Lieftinck 白粉細蟌 (Lieftinck et al., 1984:26)
Agriocnemis femina forma *b,* Ris, 1916:25.
=*Agriocnemis femina,* Chujo, 1931:32, 36-40. (*nec* Brauer, 1868, s.s.)
Agriocnemis femina oryzae Lieftinck, 1962:44.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、中國大陸；琉球群島、Borodino Is., 日本。

Agriocnemis lacteola Selys 乳白小豆娘 (Chao, 1994:67; Chen, 1996, 18(1):29; He et al., 1991:78; Sui et al., 1992:37)
Agriocnemis lacteola Selys
別 名：*白腹小蟌*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：湖南、廣東、雲南、浙江。

Agriocnemis nana Laidlaw (Chao, 1994:67)
Agriocnemis nana Laidlaw
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Agriocnemis pygmaea (Rambur) 橙尾細蟌 (Lieftinck et al., 1984:26)

Agrion pygmaeum Rambur, 1842:278.
=*Agriocnemis pygmaea,* Ris, 1916:20.
=*Agrion* (*Ischnura*) *kagiensis* Matsumura, 1910:42, 72.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度、Seychelle Is. 至波利尼西亞、澳洲。

Agriocnemis rubescens Selys (Chao, 1994:67)
Agriocnemis rubescens Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Agriocnemis sp. (Chao, 1994:67)
Agriocnemis sp., Chao, 1994:67.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Cercion nr. **barbatum** Kirby (Chao, 1994:67)
Cercion nr. *barbatum* Kirby
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Cercion calamorum calamorum (Ris) 黑蟌 (He et al., 1991:78; Hun., 1992:15; Lieftinck et al., 1984:23)
Agrion calamorum Ris, 1916:29, 31.
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬
分 佈：湖南、上海、華北、東北；日本。

Cercion calamorum dyeri (Fraser) 葦笛細蟌 (Lieftinck et al., 1984:23)
Argiocnemis dyeri Fraser, 1919:451-452.
=*Argiocnemis gravelyi* Fraser, 1919:451.
Cercion dyeri, Ishida, et al., 1973:14.
=*Cercion calamorum calamorum,* Matsuki, 1979:4-11. (*nec* Ris, 1916, s.s.)
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度、蘇門答臘。

Cercion sexlineatum (Selys) 蔚藍細蟌 (Lieftinck et al., 1984:23)
Agrion sexlineatum Selys, 1883:135.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江蘇、山東；琉球群島、日本。

Cercion sieboldis Selys 錢博細蟌 (He et al., 1991:78; Lieftinck et al., 1984:24)
=*Agrion quadrigerum* Selys, 1876:1281.
=*Agrion sauteri* Ris, 1916:30, 34.
別 名：*豆娘*。
捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟

多種小蟲
分 佈：臺灣、安徽、陝西、山東；日本。

Ceriagrion coromandeliamum (Fabricius) 圓尾黃蟌 (Hun., 1992:14)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Ceriagrion erubeseens Selys 截尾黃蟌 (Hun., 1992:14; Sui et al., 1992:37)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、貴州、浙江。

Ceriagrion fallax fallax Ris 長尾黃蟌 (Chao, 1981:53; 1994:67; He et al., 1991:78; Hun., 1992:14; Lieftinck et al., 1984:21; Sui et Sun, 1992:51; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:84)
=*Ceriagrion erubescens,* Ris, 1913:520. (*nec* Selys, 1891) (in pt.)
Ceriagrion fallax Ris, 1914:47.
Ceriagrion fallax fallax; Asahina, 1967:282-284, 321, 324.
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；印度。

Ceriagrion latericium ryukyuanum Asahina 紅腹細蟌 (Lieftinck et al.,1984:21)
=*Ceriagrion erubescnes,* Ris, 1916:44.
=*Ceriagrion rubrum* Kato, 1938:27. nome nudum.
Ceriagrion latericium, Ishida, 1969:40. (*nec* Lieftinck, 1951, s.s.)
Ceriagrion latericium ryukyuanum Asahina, 1967:293-296, 323, 324.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南；琉球群島、日本(九州南部)。

Ceriagrion melanurum Selya 短尾黃蟌 (Chao, 1994:67; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:78; Li, et al. :2; Lieftinck et al., 1984:22; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:85; Yunn., 1987:31; Zhou et al., 1995:46)
Ceriagrion coromandelianum race? *melanurum* Selys, 1876:529.
Ceriagrion melanurum; Matsumura, 1907:15.
Coenagrion melanurum; Okumura, 1935:1.
別 名：*黃腹細蟌，黃蟌蜻蜓*。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬
空中飛蟲
柑橘園害蟲
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河南；朝鮮、日本。

Ceriagrion olivaceum Laidlaw 尾黃蟌 (Yunn., 1987:31)
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Ceriagrion rubiae Laidlaw 褐尾黃蟌 (Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:85)

Ceriagrion rubiae Laidlaw, 1916:

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川、浙江、湖北。

Ceriagrion sp. (Chao, 1994:67)

Ceriagrion sp., Chao, 1994:67.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Coenagrion impar Needham 奇數蟌 (Chao, 1994:67; Zhou et al., 1995:46)

Coenagrion nr. *impar* Needham

Coenagrion impar Needham; Zhou et al., 1995:46.

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、雲南、四川、浙江。

Coenagrion lanceolatum (Selys) 蝦夷豆娘 (He et al., 1991:78)

Agrion lanceolatum Selys

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

葉蟬

分 佈：湖南、東北。

Coenagrion quadrigerum Selys (Zhang, 1987[ed.] :35)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Coenagrion sp. (Chao, 1994:67)

Coenagrion sp., Chao, 1994:67.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Enallagma cyathigerum Charpentier 心斑綠蟌 (Chao, 1981:53; Sui et Sun, 1996:38; Wu, 1988:571)

Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840:

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、新疆；全北區。

Enallagma deserti circulatum Selys 硫璃絲蟌 (He et al., 1991:79)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：河南。

Ischnura annandalei Laidlaw 黑尾瘦蟌 (Hun., 1992:15; Yunn., 1987:30)

別 名：*黑尾異痣蟌*。

捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南；印度。

Ischnura asialica Brauer 亞細亞豆娘 (He et al., 1991:79; Lieftinck et al., 1984:25; Zhang, 1987:[ed.] :35)

Agrion (*Ischnura*) *asiaticum* Brauer, 1865:509.
Ischnura asiatica, Ris, 1916:19.
=*Ischnura orientalis* Selys
=*Ischnura lobata* Needham
=*Ischnura formosana* Chujo, 1931:24, 28, 47.
捕 食：蚜蟲
葉蟎
葉蟬
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、江蘇、河南、陝西、河北、北京；琉球群島、日本。

Ischnura aurora aurora (Brauer) 朝雲細蟌 (Lieftinck et al., 1984:25)

Agrion (*Ischnura*) *aurorum* Brauer, 1865:510.
Ischnura aurora, Ris, 1916:19.
Ischnura aurora aurora, Ishida, 1969:210.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度至波利尼西亞、新西蘭。

Ischnura lobata Needham 二色異痣蟌 (Sui et Sun, 1996:38; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:85)

Ischnura lobata Needham, 1930:
捕 食 性。
分 佈：貴州、四川、湖北、山西、河北、北京、新疆。

Ischnura mildredae Fraser 赤斑異痣蟌 (Chao, 1994:68; Sui et al., 1992:37; Sun, 1997:86; Yunn., 1987:30)

Ischnura mildredae Fraser, 1927:
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州、雲南、四川、湖北；日本、印度。

Ischnura senegalensis (Rambur) 青紋細蟌 (Chao, 1981:53; 1994:68; He et al., 1991:79; Hun., 1992:15; Jing, 1994: 368-369; Lieftinck et al., 1984:25; Sun, 1997:86; Yunn., 1987:30; Zhang, 1987[ed.] :35)

Agrion senegalense Rambur, 1842:176.
Ischnura senegalensis, Ris, 1916:20.
別 名：*塞內加爾瘦蟌*，*褐斑異痣蟌*。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏(吉隆)、四川、湖北；朝鮮、日本、菲律賓、新幾內亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲。

Mortonagrion selenion Ris 月斑細蟌 (He et al., 1991:79; Lieftinck et al., 1984:26)

Agriocnemis selenion Ris, 1916:26.
Mortonagrion selenion, Ishida, 1969:36.
別 名：*摩頓蟌*。
捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、浙江、華中；朝鮮、日本。

Onychargia atrocyana Selys (Chao, 1994:68)

Onychargia atrocyana Selys

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Pseudagrion microcephalum (Rambur) 瘦面細蟌 (Lieftinck et al., 1984:22; Zhang, 1987[ed.] :35)

Agrion microcephalum Rambur, 1842:259.

Pseudagrion microcephalum, Chujo, 1931:40-44.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西；琉球群島、馬來西亞、泰國、印度、所羅門群島、新赫布里底群島。

Pseudagrion pilidorsum pilidorsum (Brauer) 弓背細蟌 (Lieftinck et al.,1984:23)

Agrion pilidorsum Brauer, 1868:553.

Pseudagrion pilidorsum, Ris, 1916:43.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓、琉球群島。

Pseudagrion spencei Fraser (Chao, 1994:68)

Pseudagrion spencei Fraser

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Sinolestes edita Needham 赤條綠山蟌 (Sun, 1997:89; Zhang, 1987[ed.] :35)

Sinolestes edita Needham, 1930:

捕 食 性。

分 佈：江西、四川、浙江。

Sinolestes ornata Needham (Zhang, 1987[ed.] :36)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Sinolestes sp. 綠山蟌 (Chen, 1996, 18(1):20)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Cordulegasteridae (Macromiidae) 勾蜓科(大蜓科)

Anotogaster kuchenbeiseri Förster 雙斑圓臀大蜓 (ASZI,1986, 1:1; Chao, 1994:69; Sui et Sun, 1988:25; 1992:48; Sui et al., 1992:31; Yunn., 1987:24; Zhang, 1987[ed.] :30)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、雲南、西藏、四川、湖北、北京。

Anotogaster sakaii Zhou 清六圓臀大蜓 (Zhou et al., 1995:48))
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Anotogaster sieboldii sieboldii (Selys) 大蜻蜓 (Chen, 1996, 18(1):20; Lieftinck et al., 1984:27; Zhang, 1987[ed.] :30; Zhou et al., 1995:49)
Cordulegaster sieboldii Selys, 1854:107.
別 名：*巨圓臀大蜓*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、浙江；琉球群島、日本、朝鮮、庫頁島。

Anotogaster sieboldii subsp. 無霸勾蜓 (He et al., 1991:77; Hun., 1992:3; Lieftinck et al., 1984:27)
Anotogaster sieboldii, Matsumura, 1903:pl. 8(1)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chlorogomphus brevistigma brevistigma Oguma 短尾勾蜓 (Chao, 1981:54; Lieftinck et al., 1984:27)
Chlorogomphus brevistigma Oguma, 1926:87, 88.
Chlorogomphus brevistigma brevistigma, Kuwahara, 1976:18.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chlorogomphus infuscatus Needham (Zhang, 1987[ed.] :30)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Chlorogomphus nasutus Needham 光額緣大蜓 (Zhou et al., 1995:49)
捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江。

Chlorogomphus papilio Ris 黃斑寬套大蜓 (Sui et al., 1992:31)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Chlorogomphus risi Chen 褐翼勾蜓 (Lieftinck et al., 1984:28)
=*Orogomphus splendidus* Ris, 1912:77. (*nec* Selys, 1878)
Chlorogomphus brunneus Oguma, 1926:87. (in pt.)
Chlorogomphus risi Chen, 1950:138, 141. new name for *splendidus* Ris.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chlorogomphus splendidus (Selys) 闊翼勾蜓 (Lieftinck et al., 1984:28)
Orogomphus splendidus Selys, 1878:681.

Chlorogomphus splendidus, Fraser, 1929:156.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓。

Chlorogomphus suzukii (Oguma) 斑翼勺蜓 (Lieftinck et al., 1984:28; Zhou et al., 1995:48)))
Orogomphus suzukii Oguma, 1926:88.
Chlorogomphus suzukii, Chen, 1950:138, 143-144.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江。

Chlorogomphus tunti Needham 透翅寬套大蜓 (Sui et al., 1992:31; Yunn., 1987:24)
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南。

Cordulegaster brevistigma Selys
捕 食 性。
分 佈：西藏；印度。

Cordulegaster jinensis Zhu et Han 晉大蜓 (Zhu et Han, 1992:18)
Cordulegaster jinensis Zhu et Han, 1992:18.
捕 食 性。
分 佈：山西。

Cordulegaster lunifera Selys
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Cordulegaster lunifera ssp. **pekinensis** Selys
捕 食 性。
分 佈：北京。

Epophthalmia elegans Brauer (Chao, 1994:69)
Epophthalmia elegans Brauer
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Neallogaster choui Yang et Li 周氏角臀蜓 (Yang et Li, 1994:458)
Neallogaster choui Yang et Li, 1994:458.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Gomphidae 春蜓科(箭蜓科)

(Chao, 1991:9-13)

Amphigomphus hansoni Chao 漢森安春蜓 (Chao,1954:403; 1990:346)

Amphigomphus hansoni Chao, 1954:403.
別 名：*漢森兼箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建(大竹嵐、挂墩)。

Anisogomphus anderi Lieftinck 安氏異春蜓 (Chao, 1954:215; 1982:288; 1983:100; 1990:186; Zhou et al., 1995:47)

Anisogomphus anderi Lieftinck, 1948:59-61.
別 名：*安異箭蜓，Z 紋異箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、雲南、浙江。

Anisogomphus bivittatus flavifacies (Klots) 雙條異春蜓(黃臉亞種) (Chao, 1990:188; Sui et Sun, 1992:48)

Anisogomphus flavifacies Klots, 1947:7-8.
Anisogomphus bivittatus flavifacies, Chao, 1990:188.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anisogomphus chaoi Liu 趙氏異春蜓 (Liu, 1991:129)

Anisogomphus chaoi Liu, 1991:129.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Anisogomphus flavifacies Klots 黃臉異春蜓 (Chao, 1981:100)

Anisogomphus flavifacies Klots
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anisogomphus forresti (Morton) 福氏異春蜓 (Chao, 1954:221; 1983:100; 1990:190; Zhou, 1987:128)

Temnogomphus forresti Morton, 1928:113-114.
別 名：*福氏異箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anisogomphus jinggangshanus Liu 井崗山異春蜓 (Liu, 1991:131)

Anisogomphus jinggangshanus Liu, 1991:131.
捕 食 性。
分 佈：江西(井崗山)。

Anisogomphus koxingai Chao 國姓異春蜓 (Chao, 1954:217; 1983:100; 1990:191; 1994:69; Lieftinck et al., 1984:33)

Anisgomphus koxingi Chao, 1954:214, 217.
別 名：*國姓異棍腹春蜓*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南、雲南。

Anisogomphus maacki (Selys) 馬奇異春蜓 (ASZI, 1986, 1:7; Chao, 1983:100; 1990:194; Sui et Sun, 1992:48; Sui et al., 1992:32)

Gomphus maacki Selys, *in* Selys et McLachlan, 1872:33.
=*Gomphus m-flavum* Selys, 1878:451.
=*Temnogomphus amurensis* Bartenef, 1930:116.
=*Gomphus emarginatus* Okumura, 1937:124.
別 名：*7紋異箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、四川、湖北、河南、陝西、山西、河北、寧夏、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本。

Anisogomphus wuzhishanus Chao 五指異春蜓 (Chao, 1982:288; 1983:100; 1990:197)

Anisogomphus wuzhishanus Chao, 1982:288.
捕 食 性。
分 佈：海南(五指山)。

Anisogomphus sp. 長唇春蜓 (Chao, 1983:100; Lieftinck et al., 1984:33)

Anisogomphus sp. Matsuki, 1978:139.
別 名：*臺灣異棍春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Asiagomphus cuneatus (Needham) 長角亞春蜓 (ASZI, 1986, 1:4; Chao, 1953:399; 1990:86; Zhou et al., 1995:47)

Gomphus cuneatus Needham, 1930:50.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、浙江。

Asiagomphus hainanensis (Chao) 海南亞春蜓 (Chao, 1953:404; 1990:87)

=*Gomphus septimus,* Needham, 1931:231. (*nec* Needham, 1930)
=*Gomphus personatus,* Needham, 1942:251. (*nec* Selys, 1873)
Gomphus hainanensis Chao, 1953:404.
Asiagomphus hainanensis, Asahina, 1985:7.
別 名：*鈎紋箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、海南。

Asiagomphus hesperius (Chao) 西南亞春蜓 (Chao, 1953:415; 1990:93)

Gomphus hesperius Chao, 1953:413.
Asiagomphus hesperius, Asahina, 1985:7.
捕 食 性。
分 佈：四川、陝西。

Asiagomphus motuoensis Liu et Chao 墨脫亞春蜓 (Chao, 1990:94)

Asiagomphus motuoensis Liu et Chao, 1990:94.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Asiagomphus pacatus (Chao) 安定亞春蜓 (Chao, 1953:414; 1990:94)
Gomphus pacatus Chao, 1953:414.
Asiagomphus pacatus, Asahina, 1985:7.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Asiagomphus pacificus (Chao) 和平亞春蜓 (ASZI, 1986, 1:4; Chao, 1953:410; 1990:97)
Gomphus pacificus Chao, 1953:410.
Asiagomphus pacificus, Asahina, 1985:7.
別 名：*雙角春蜓，黑唇春蜓，黑唇箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、浙江。

Asiagomphus perlaetus (Chao) 三角亞春蜓 (Chao, 1953:407; 1990:98; Xu, 1987:22)
Gomphus perlaetus Chao, 1953:407.
Asiagomphus perlaetus, Asahina, 1985:7.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Asiagomphus septimus (Needham) 凹緣亞春蜓 (Chao, 1953:401; 1990:101; Zhou et al., 1995:47)
Gomphus septimus Needham, 1930:61.
=*Gomphus pryeri,* Asahina, 1940:23. (*nec* Selys, 1883)
Asiagomphus septimus, Asahina, 1985:7.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江。

Asiagomphus somnolens Needham 臥佛春蜓 (Chao, 1953:429; 1983:102; 1990:106)
Gomphus somnolens Needham, 1929:2.
捕 食 性。
分 佈：河北(北京)。

Asiagomphus sp. 亞春蜓 (Sui et al., 1992:33)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Burmagomphus agricola (Ris) (Zhang, 1987[ed.] :31)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Burmagomphus arboreus Lieftinck 林間緬春蜓 (Chao,1990:161)

=*Burmagomphus vermiculatus* Williamson, 1907:298-303. (*nec* Martin, 1904)
=*Burmagomphus williamsoni* Fraser, 1926:410, 411. (nom. nov. for *vermiculatus* Williamson, 1907)
Burmagomphus arboreus Lieftinck, 1940:112. (nom. nov. for *vermiculatus* Williamson, 1926 *nec* Fperster, 1914)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸。

Burmagomphus arvalis (Needham) 雙紋緬春蜓 (Chao,1954:70; 1983:100; 1990:162)
Gomphus arvalis Needham, 1930:58.
Burmagomphus arvalis, Chao, 1954:69, 70.
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Burmagomphus bashanensis Yang et Li 巴山緬春蜓 (Yang et Li, 1994:84)
Burmagomphus bashanensis Yang et Li, 1994:84.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Burmagomphus collaris (Needham) 領紋緬春蜓 (Chao,1954:76; 1983:100; 1990:163; He et al., 1991:74; Zhou et al., 1995:47)
Gomphus collaris Needham, 1929:2.
=*Gomphus campestris* Needham, 1929:2.
Burmagomphus collaris, Chao, 1954:70, 76.
別 名：*黃脊緬箭蜓*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：浙江、江蘇、河北、北京。

Burmagomphus corniger (Morton) 雲南緬春蜓 (Chao,1953:426; 1990:16)
Gomphus corniger Morton, 1928:115-117.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Burmagomphus gratiosus Chao 歡樂春蜓 (Chao,1954:79; 1983:100; 1990:165)
Burmagomphus gratiosus Chao, 1954:69, 79.
別 名：*美麗緬箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Burmagomphus intinctus (Needham) 溪居緬春蜓 (ASZI,1986, 1:7; Chao,1954:73; 1983:100; 1990:166; Xu, 1987:22; Zhou et al., 1995:47)
Gomphus intinctus Needham, 1930:65.
Brumagomphus intinctus, Chao, 1954:69, 73.
別 名：*完紋緬箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Burmagomphus krcyenbergi (Ris) 克氏緬箭蜓 (Chao, 1983:100; Zhang, 1987[ed.] :31)

Burmagomphus krcyenbergi (Ris)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西、浙江、山東。

Burmagomphus sowerbyi (Needham) 索氏緬春蜓 (Chao,1954:71; 1983:100; 1990:169; Sui et al., 1992:32)

Gomphus sowerbyi Needham, 1930:59.

Burmagomphus sowerbyi, Chao, 1954:70, 71.

別 名：*斷紋緬箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、浙江、江蘇、河南。

Burmagomphus vermicularis (Martin) 聯紋緬春蜓 (Chao,1954:77; 1983:100; 1990:173; Lieftinck et al., 1984:35)

Gomphus vermicularis Martin, 1904:214.

Burmagomphus vermicularis, Asahina, 1940:23.

Burmagomphus vermicularis vermicularis, Matsuki, 1978:139, 142.

別 名：*蟲莖春蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建；越南、泰國。

Burmagomphus williamsoni Fraser 威氏緬箭蜓 (Zhou, 1987:128)

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸。

Davidius bicornutus Selys 雙角戴春蜓 (Chao, 1954:242; 1983:100; 1990:269)

Davidiuis bicornutus Selys, 1878:670.

捕 食 性。

分 佈：河南、陝西、河北；日本(北海道)?

Davidius chaoi Cao et Zheng 趙氏戴春蜓 (Cao et Zheng, 1988:407; Chao, 1990:270)

Davidius chaoi Cao et Zheng, 1988:407.

=*Davidius miaetaiziensis* Zhu, Yan et Li, 1988:429.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Davidius davidi davidi Selys 戴氏戴春蜓(指名亞種) (Chao, 1954:241; 1983:100; 1990:272)

Davidius davidi Selys, 1878:671.

Davidius davidi davidi, Fraser, 1923: 61, 329.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Davidius davidi shaanxiensis Zhu, Yan et Li 戴氏戴春蜓(陝西亞種) (Chao, 1990:273)

Davidius davidi shaansiensis Zhu, Yan et Li, 1988:432.

=*Davidius qinlingensis* Cao et Zheng, 1989:1-3.

捕 食 性。
分 佈：陝西。

Davidius fruhstorferi guizhouensis Chao et Liu 弗魯戴春蜓(貴州亞種) (Sui et al., 1992:32)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Davidius fruhstorferi junior (Navás) 弗魯戴春蜓(幼小亞種) (Chao, 1954:244; 1983:100; 1990:274; Hun., 1992:3; Sui et al., 1992:32; Sun, 1997:73; Zhang, 1987[ed.] :31; Zhou et al., 1995:47)
Gomphus junior Navás, 1936:38-39.
=*Davidius serenus* Needham, 1941:154.
Davidius fruhstorferi junior, Chao, 1954:244.
別 名：*連紋臺箭蜓*，*新臺箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北。

Davidius fruhstorferi guizhouensis Chao et Liu 弗魯戴春蜓(貴州亞種) (Chao, 1990:278)
Davidius fruhstorferi guizhouensis Chao et Liu, *in* Chao, 1990:278.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Davidius fruhstorferi ssp. (Chao, 1994:69)
Davidius fruhstorferi ssp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Davidius lunatus (Bartenef) 新月戴春蜓 (Chao, 1954:242; 1983:101; 1990:278)
Hologomphus lunatus Bartenef, 1914:24.
別 名：*獨紋臺箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：遼寧、吉林；朝鮮。

Davidius qinlingensis Cao et Zheng 秦嶺臺箭蜓 (Cao et Zheng, 1989:1)
Davidius qinlingensis Cao et Zheng, 1989:1.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Davidius squarrosus Zho 方鈎戴箭蜓 (Zho, 1991:175)
Davidius squarrosus Zho, 1991:175.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Davidius trox Needham 鐮刀戴春蜓 (Chao, 1954:243; 1983:101; 1990:280)
Davidius trox Needham, 1931:4-5.

別 名：*黑唇戴箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Davidius unicornis Needham 獨角戴春蜓 (Chao, 1983:10; Zhang, 1987[ed.] :31)
Davidius unicornis Needham
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西。

Davidius yuanbaensis Zhu, Yan et Li 元壩戴春蜓 (Chao, 1990:281)
Davidius yuanbaensis Zhu, Yan et Li, 1988:431.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Davidius zallorensis delineatus Fraser 扎洛戴春蜓(細紋亞種) (Chao, 1990:283; Zhou, 1987:128)
Davidius zallorensis delineatus Fraser, 1926:166.
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度(大吉嶺)。

Eogomphus neglectus (Needham) 忽視曙春蜓 (Chao, 1954:234; 1983:101; 1990:303)
Gomphus neglectus Needham, 1930:64-65.
Eogomphus neglectus, Needham, 1941:146-152.
別 名：*忽視新箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川。

Fukienogomphus prometheus (Lieftinck) 火神春蜓 (Chao, 1954:39; 1983:101; 1982:288; Lieftinck et al., 1984:34; Zhang, 1987[ed.]:31; Zhou et al., 1995:47)
Gomphus prometheus Lieftinck, 1939:278.
=*Fukienogomphus prometheus,* Chao, 1954:39, 40 .
別 名：*深山閩春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江。

Fukienogomphus promineus Chao 顯著閩春蜓 (ASZI, 1986, 1:6; Chao,1954:41; 1983:101; 1990:214)
Fukienogomphus promineus Chao, 1954:41.
=*Fukienogomphus margarita* Chao, 1954:43.
別 名：*圓點閩箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Gastrogomphus abdominalis (McLachlan) 長腹春蜓 (ASZI, 1986, 1:8; Chao, 1954:235; 1983:101; 1990:142)
Gomphus abdominalis McLachlan, 1884:8.
Gastrogomphus abdominalis, Needham, 1941:145-146, 152.

別 名：*長腹箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、浙江、江蘇、湖北、河南、河北。

Gomphidia confluens Selys 聯紋小葉春蜓 (ASZI, 1986, 1:10; Chao, 1955:89; 1983:107; 1990:421; He et al., 1991:74; Hun., 1992:3; Lieftinck et al., 1984:29; Zhang, 1987[ed.]:31; Zhou et al., 1995:48)
Gomphidia confluens Selys, 1878:675-676.
別 名：*聯紋春蜓，聳尾箭蜓，棒腹小葉箭蜓，大陸棍尾春蜓*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、湖北、河南、山西、河北；朝鮮、日本、越南。

Gomphidia kelloggi Needham 克氏小葉春蜓 (Chao, 1955:95; 1983:107; 1990:424)
Gomphidia kelloggi Needham, 1930:28-29.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Gomphidia krügeri fukienensis Chao 并紋小葉春蜓(福建亞種) (Chao, 1955:92; 1983:107; 1990:425; Lieftinck et al., 1984:30; Xu, 1987:22)
Gomphidia krügeri fukienensis Chao, 1955:89, 92-95.
別 名：*福建棍春蜓，異紋春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Gomphidia krügeri krügeri Martin 并紋小葉春蜓(指名亞種) (Chao, 1955:91; 1983:107; 1990:424; Lieftinck et al., 1984:30)
Gomphidia krügeri Martin, 1904:216.
捕 食 性。
分 佈：福建、海南、雲南；越南。

Gomphidia krügeri ssp. (Chao, 1994:69)
Gomphidia krügeri ssp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Gomphus campestris Needham 三斑箭蜓 (He et al., 1991:74)
=*Gomphus clathratus* Needham
別 名：*黑面棍腹蜓*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江、江蘇、湖北、山西、河北、北京。

Gomphus cuneatus Needham (Zhang, 1987[ed.] :31)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Gomphus dolus Needham (Zhang, 1987[ed.] :31)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Gomphus endicotti Needham 恩迪春蜓 (Chao, 1983:101)

Gomphus endicotti Needham

捕 食 性。

分 佈：四川。

Gomphus flavicornis Needham 黃角春蜓 (Chao, 1983:101)

Gomphus flavicornis Needham

捕 食 性。

分 佈：福建。

Gomphus gaudens Chao 愉快春蜓 (Chao, 1983:101)

Gomphus gaudens Chao

捕 食 性。

分 佈：四川。

Gomphus hainanensis Chao 海南春蜓 (Chao, 1983:101; Lieftinck et al., 1984:33)

(?) *Platygomphus* sp. Kato, 1933:pl. 14(2).

Gomphus hainanensis Chao, 1953:398, 404.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、海南。

Gomphus hesperius Chao 西南春蜓 (Chao, 1983:101)

Gomphus hesperius Chao

捕 食 性。

分 佈：四川。

Gomphus junior Navás (Zhang, 1987[ed.] :31)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Gomphus kregenbergi Ris (Zhang, 1987[ed:] 31)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Gomphus occultus (Selys) 奇特春蜓 (Chao, 1983:105; Lieftinck et al., 1984:64)

Gomphus occultus (Selys), 1878:

捕 食 性。

分 佈：江西、江蘇、湖北、河北、甘肅、內蒙古、東北；日本。

Gomphus pacificus Chao 雙角春蜓 (Chao, 1953:410; 1983:101; Hun., 1992:4; Lieftinck et al., 1984:33)

Gomphus pacificus Chao, 1953:398, 410-413.

別 名：*黑唇箭蜓，和平箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南。

Gomphus perlaetus Chao 圓痣春蜓 (Chao, 1983:101; Lieftinck et al., 1984:33)

Gomphus perlaetus Chao, 1953:399, 407-410.

別 名：*歡樂箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建。

Gomphus septimus Needham 釣紋春蜓 (Lieftinck et al., 1984:33)

Gomphus septimus Needham, 1930:48, 61.

=(?) *Platygomphus* sp. Kato, 1933:pl. 15(1).

=*Gomphus pryeri,* Asahina, 1940:23.

=*Gomphus* sp. Asahina, 1965:242.

=*Gomphus hainanensis,* Asahina, 1966:111. (in pt.) (*nec* Chao, 1953)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建。

Gomphus szechuanicus Chao 四川春蜓 (Chao, 1953:418; 1983:102)

Gomphus szechuanicus Chao, 1953:418.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Gomphus takashii Asahina 南山春蜓 (Chao, 1983:102; Lieftinck et al., 1984:34)

Gomphus takashii Asahina, 1966:113.

別 名：*深山箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Gomphus trinus Navás (Zhang, 1987[ed.] :31)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Heliogomphus retroflexus (Ris) 曲尾春蜓 (Chao, 1954:230; 1983:102; 1990:177; Lieftinck et al., 1984:31; Xu, 1987:22; Zhou et al., 1995:47)

Leptogomphus retroflexus Ris, 1912:69-72.

Heliogomphus retroflexus, Laidlaw, 1930:181.

別 名：*扭尾曦春蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、浙江；越南。

Heliogomphus scorpio (Ris) 獨角曦春蜓 (Chao, 1954:227; 1983:102; 1990:181; Chen, 1996, 18(1):20; Zhou et al., 1995:47)

Leptogomphus scorpio Ris, 1912:72, 73.
Heliogomphus scorpio, Laidlaw, 1925:560.
=*Davidius unicornis* Needham, 1930:32-33.
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江。

Ictinogomphus claratus (Fabricius) 細鈎春蜓 (Hun., 1992:4; Lieftinck et al., 1984:29)

Aeshna clavata Fabricius, 1775:425.
Ictinogomphus clavatus, Asahina, 1966:107.
別 名：*黃新葉箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、江蘇、北京；朝鮮、日本、越南。

Ictinogomphus pertinax (Hagen) 粗鈎春蜓 (He et al., 1991:74; Hun., 1992:4; Lieftinck et al., 1984:29)

Ictinus pertinax Hagen *in* Selys, 1854:88-89.
=*Ictinus fallax* Selyx, 1854:91.
=*Ictinus rapax,* Needham, 1930:21, 22.
=*Ictinogomphus rapax* var. *fallax,* Kobayashi, 1941:428.
=*Ictinogomphus rapax* var. *pertinax*: Kobayashi, 1941:428.
Ictinogomphus pertinax, Asahina, 1966:107.
別 名：*黃小葉箭蜓，黑印葉箭*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、華南、浙江、湖北、華中；印度、琉球群島、日本(九州)。

Ictinogomphus rapax (Rambur) 小團扇春蜓 (ASZI, 1986, 1:9; Chao,1955:81; 1983:107; 1990:411; 1994:69; Sui et al., 1992:33; Zhang, 1987[ed.] :32; Zhou et al., 1995:48))

=*? Libellula clavata,* Donovan, 1798:45.
Diastatomma rapax Rambur, 1842:169.
=*Ictinus fallax,* Selys, 1854:91.
=*Ictinus pertinax,* Selys, 1854:88.
=*Ictinogomphus rapax* var. *partinax,* Kobayashi, 1941:248.
Indictinogomphus rapae, Chao, 1955:81.
Ictinogomphus rapax, Chao, 1983:107.
別 名：*臺灣扇尾春蜓，環紋印葉箭蜓，粗鈎春蜓，黑印葉箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西；日本、琉球群島、越南、馬來西亞、緬甸、印度、孟加拉、斯里蘭卡。

Labrogomphus torvus Needham 凶猛春蜓 (Chao,1954:237; 1985:12; 1990:151)

Labrogomphus torvus Needham, 1931:225-227, 231.
捕 食 性。
分 佈：福建、海南。

Lamelligomphus camelus (Martin) 駝峰環尾春蜓 (Chao,1954:262; 1983:105; 1990:353)

Onychogomphus camelus Martin, 1904:212.
Lamelligomphus camelus, Laidlaw, 1930:193.
=*Lamelligomphus ardens,* Fraser, 1942:340. (*nec* Needham)
捕 食 性。
分 佈：福建；越南、寮國、柬埔寨。

Lamelligomphus choui Chao et Liu 周氏環尾春蜓 (Chao,1990:354; Chao et Liu, 1989:177)

Lamelligomphus choui Chao et Liu, 1989:177.
捕 食 性。
分 佈：安徽(黃山)。

Lamelligomphus formosanus (Matsumura) 臺灣環尾春蜓 (Chao,1954:274; 1990:356; Zhou et al., 1995:48))

Lindenia formosana Matsumura, *in* Oguma, 1926:97.
Lamelligomphus formosanus, Laidlaw, 1930:194.
=*Onychogomphus micans* Needham, 1930:41.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣西、浙江、安徽。

Lamelligomphus hainanensis (Chao) 海南環尾春蜓 (Chao,1954:269; 1983:106; 1990:360)

=*Onychogomphus micans,* Needham, 1931:229, 231. [Misident.]
Onychogomphus hainanensis Chao, 1954:257, 269.
Lamelligomphus hainanensis, Chao, 1990:360.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Lamelligomphus jiuquensis Liu 九曲環尾春蜓 (Liu, 1993:21)

Lamelligomphus jiuquensis Liu, 1993:21-23.
捕 食 性。
分 佈：福建(崇安星村)。

Lamelligomphus micans Needham 臺灣環尾春蜓 (Sui et al., 1992:32)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣西、貴州。

Lamelligomphus motuoensis (Chao) 墨脫環尾春蜓 (Chao, 1983:106; 1990:361)

Onychogomphus motuoensis Chao, 1983:270.
Lamelligomphus motuoensis Chao, 1990:361.
別 名：*墨脫鈎尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Lamelligomphus ringens (Needham) 環紋環尾春蜓 (ASZI, 1986, 1:9; Chao,1954:270; 1983:106; 1990:363; Sui et al., 1992:32)

Onychogomphus ringens Needham, 1930:40.

=*Onychogomphus ridens* Needham, 1930:40-41.
Lamelligomphus ringens, Fraser, 1942:340.
別 名：*環紋鈎尾箭蜓，環斑鈎尾箭蜓，環鈎尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、山東、山西、河北、北京、吉林；朝鮮、日本。

Lamelligomphus trinus (Navas) 脊紋環尾春蜓 (Chao, 1983::106; 1990:367)
Gomphus trinus Navas, 1936:38.
Lamelligomphus trinus, Chao, 1990:367.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、海南。

Lamelligomphus tutulus Liu et Chao 雙髻環尾春蜓 (Chao,1990:368; Sui et al., 1992:32)
Lamelligomphus tutulus Liu et Chao, *in* Chao, 1990:368-369.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Leptogomphus celebratus Chao 歡慶纖春蜓 (Chao, 1982:289; 1983:102; 1990:288)
Leptogomphus celebratus Chao, 1982:289.
=*Leptogomphus hainanensis* Chao, 1984:277.
別 名：*歡慶纖箭蜓，海南纖箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：海南。

Leptogomphus divaricatus Chao 歧角纖春蜓 (Chao, 1983:101; 1990:290)
Leptogomphus divaricatus Chao, 1984:152.
捕 食 性。
分 佈：福建(建寧)。

Leptogomphus elegans elegans Lieftinck 優美纖春蜓(指名亞種) (ASZI, 1986, 1:8; Chao, 1954:254; 1983:102; 1990:291; Zhou et al., 1995:48)
Leptogomphus elegans Lieftinck, 1948:254-258.
Leptogomphus elegans elegans, Chao, 1990:291.
別 名：*銳突纖箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西、浙江。

Leptogomphus elegans hongkongensis Asahina 優美纖春蜓(香港亞種)(Chao, 1990:293)
=*Leptogomphus perforatus* (subsp.?) Asahina, 1965:500.
Leptogomphus elegans hongkongensis Asahina, 1988:691.
捕 食 性。
分 佈：香港。

Leptogomphus intermedius Chao 居間纖春蜓 (Chao, 1982:290; 1983:102; 1990:293)
=*Leptogomphus perforatus,* Chao, 1954:250. (*nec* Ris)

Leptogomphus intermedius Chao, 1982:290.
捕 食 性。
分 佈：廣東(羅浮山)。

Leptogomphus perforatus Ris 圓腔纖春蜓 (Chao, 1954:250; 1982:292; 1983:102; 1990:295)
Leptogomphus perforatus Ris, 1912:73.
捕 食 性。
分 佈：廣東、香港。

Leptogomphus sauteri Ris 蘇氏纖箭蜓 (Chao, 1982:291)
Leptogomphus sauteri Ris, 1912:75.
Leptogomphus s. sauteri, Asahina, 1965:240.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Leptogomphus sauteri formosanus Matsumura 紹德春蜓(嘉義亞種) (Chao, 1983:102; 1990:299; Lieftinck et al., 1984:31)
=*Leptogomphus formosanus* Matsumura *in* Oguma, 1926:91.
Leptogomphus sauteri formosanus, Asahina, 1965:125.
Leptogomphus sauteri, Chao, 1954:249, 251. (*nec* Ris, 1912, s.s.)
Leptogomphus sauteri formosanus, Matsuki et Lien, 1988:23.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Leptogomphus sauteri sauteri Ris 紹德春蜓(恒春亞種) (Chao, 1983:103; 1990:297; Lieftinck et al., 1984:30)
Leptogomphus sauteri Ris, 1912:69, 75.
Leptogomphus sauteri sauteri, Asahina, 1965:240.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Macrogomphus guilinensis Chao 桂林大春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:156)
Macrogomphus guilinensis Chao, 1982:11.
別 名：*桂林大箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：廣西(桂林)。

Macrogomphus montanus Selys 山地大春蜓 (Chao, 1983:103)
Macrogomphus montanus Selys
別 名：*山地大箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：東北。

Macrogomphus robustus (Selys) 粗壯大春蜓 (Chao, 1954:224; 1983:103; 1990:157)
Heaterogomphus robustus Selys, 1854:27.
Macrogomphus rubustus, Selys, 1857:88.

捕 食 性。
分 佈：西藏。

Megalogomphus smithii (Selys) 史氏硬春蜓 (Chao, 1983:105)
Megalogomphus smithii (Selys)
捕 食 性。
分 佈：東北。

Megalogomphus sommeri (Selys) 薩默碩春蜓 (Chao,1954:420; 1983:105; 1990:349)
Heterogomphus sommeri Selys, 1854:29.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西。

Melligomphus ardens (Needham) 雙峰彎尾春蜓 (ASZI, 1986, 1:9; Chao,1954:257; 1983:105; 1990:370; Sui et al., 1992:32; Xu, 1987:22; Zhou et al., 1995:48))
Onychogomphus ardens Needham, 1930:39.
Melligomphus ardens, Chao, 1990:370.
別 名：*雙峰鈎尾箭蜓，光鈎尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西、貴州、浙江。

Melligomphus cataractus Liu et Chao 瀑布彎尾春蜓 (Sui et al., 1992:33)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Melligomphus dolus (Needham) 羅城彎尾春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:376)
Gomphus dolus Needham, 47, 58-59.
Melligomphus dolus: Chao, 1990:376.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Melligomphus ludens (Needham) 無峰鈎尾春蜓 (Chao, 1954:266, 424; 1983:106; 1990:377; Zhou et al., 1995:48)
Onychogomphus ludens Needham, 1930:42-43.
Melligomphus ludens, Chao, 1990:377.
別 名：*無峰鈎尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西、浙江。

Melligomphus sp. 彎尾春蜓 (Sui et al., 1992:32)
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州。

Merogomphus linyinensis Zhu et Wu 靈隱狹胸箭蜓 (Zhu et Wu, 1985:229)
Merogomphus linyinensis Zhu et Wu, 1985:229.

捕 食 性。
分 佈：浙江(靈隱寺)。

Merogomphus martini (Fraser) 馬丁長足春蜓 (Chao,1990:201; Zhou, 1987:128)
Platygomphus martini Fraser, 1922:68, 69.
Merogomphus martini, Laidlaw, 1930:185.
別 名：*瑪氏狹胸箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度、孟加拉。

Merogomphus paviei Martin 窄胸春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:202; Lieftinck et al., 1984:32)
Merogomphus paviei Martin, 1904:214.
=*Merogomphus chui* Asahina, 1968:90.
=*Merogomphus linyinensis* Zhu et Wu, 1985:229-231.
別 名：*帕維長足春蜓*，*朱氏狹胸箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江；越南。

Merogomphus torpens (Needham) 小長足春蜓 (Chao,1953:431; 1983:102; 1990:206)
Gomphus torpens Needham, 1930:55-56.
Merogomphus torpens, Needham, 1941:148, 152.
別 名：*遲鈍箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川。

Merogomphus vandykei Needham 江浙長足春蜓 (Chao, 1954:233; 1983:103; 1990:207)
Merogomphus vandykei Needham, 1930:68.
=*Anisogomphus pieli* Navaás, 1932:39.
Merogomphus paviei, Chao, 1962:26. (*nec* Martin, 1904). [Misident.]
別 名：*佩氏狹胸箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：浙江、江蘇、安徽。

Nepogomphus modestus (Selys) 優雅內春蜓 (Chao, 1981:54; 1983:105; 1990:379; Wu, 1988:572)
Onychogomphus modestus Selys, 1878:423.
=*Onychogomphus diminutivus* Fraser, 1924:109, 110.
Nepogomphus modestus, Fraser, 1934:285.
別 名：*優雅簡脈箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)；泰國、緬甸、印度、孟加拉、蘇門答臘。

Nepogomphus walli (Fraser) 沃爾內春蜓 (Chao, 1990:381)
Onychogomphus walli Fraser, 1924:109.
Nepogomphus walli, Fraser, 1934:286.
別 名：*威氏鈎尾箭蜓*。

捕 食 性。
分 佈：雲南；馬來西亞、緬甸。

Nihonogomphus bequaerti Chao 貝氏日春蜓 (Chao, 1954:409; 1983:105; 1990:322)
Nihonogomphus bequaerti Chao, 1954:407, 409.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Nihonogomphus brevipennis (Needham) 短翅日春蜓 (Chao, 1954:413; 1983:105; 1990:324)
Gomphus brevipennis Needham, 1930:48.
=*Gomphus hummeli* Sjostedt, 1932:12-14.
Nihonogomphus brevipennis, Chao, 1954:407, 412.
捕 食 性。
分 佈：四川、江蘇、湖北、山東。

Nihonogomphus cultratus Chao et Wang 刀日春蜓 (Chao, 1990:326)
Nihonogomphus cultratus Chao et Wang, *in* Chao, 1990:326-328.
捕 食 性。
分 佈：河南。

Nihonogomphus gilvus Chao 淺黃日春蜓 (Chao, 1954:416; 1983:105; 1990:328)
Nihonogomphus gilvus Chao, 1954:407, 416.
捕 食 性。
分 佈：福建(邵武)。

Nihonogomphus lieftincki Chao 黎氏日春蜓 (Chao, 1954:407; 1983:105; 1990:329; Xu, 1987:22)
Nihonogomphus lieftincki Chao, 1954:407.
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南。

Nihonogomphus luteolatus Chao et Liu 黃側日春蜓 (Chao, 1990:332; Chao et Liu, 1987:19)
Nihonogomphus luteolatus Chao et Liu, 1989:19.
捕 食 性。
分 佈：福建(光澤)。

Nihonogomphus ruptus (Selys) 臼齒日春蜓 (Chao, 1983:106; 1990:334)
Onychogomphus ruptus Selys, *in* Selys et Hagen, 1858:653-655.
=*Altaigomphus heterostylus* Bartenef, 1930:329-331.
Nihonogomphus ruptus, Lieftinck, 1964:104-106.
別 名：*斷紋鈎尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：東北；西伯利亞東部。

Nihonogomphus semanticus Chao 長鈎日春蜓 (Chao, 1954:411; 1982:294; 1983:105; 1990:334; Zhou et al., 1995:48)

Nihonogomphus semanticus Chao, 1954:407, 411.
別 名：*長鈎日箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、浙江。

Nihonogomphus shaowuensis Chao 邵武日春蜓 (Chao, 1954:414; 1983:105; 1990:337)
Nihonogomphus shaowuensis Chao, 1954:407, 414.
捕 食 性。
分 佈：福建(邵武)、浙江。

Nihonogomphus simillimus Chao 相似日箭蜓 (Chao, 1982:115; 1983:105)
Nihonogomphus similliimus Chao, 1982:115-117.
捕 食 性。
分 佈：福建(光澤)。

Nihonogomphus thomassoni (Kirby) 湯氏日箭蜓 (Chao, 1954:417; 1983:105; Zhou, 1987:128)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西；越南。

Nihonogomphus viridis Oguma 斑蜻蜓 (He et al., 1991:74)
Nihonogomphus viridis Oguma
捕 食：蛾類
葉蟬
分 佈：河北。

Nihonogomphus zhejiangensis Chao et Zhou 浙江日春蜓 (Chao, 1990:340; Zhou et al., 1995:48)
Nihonogomphus shaowuensis, Zhou, 1982:162. [Misident.] (*nec* Chao, 1979)
Nihonogomphus zhejiangensis Chao, et Zhou, *in* Chao, 1990::340-341.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Nychogomphus duaricus (Fraser) 基齒奈春蜓 (Chao, 1990:311)
Onychogomphus duaricus Fraser, 1924:1001-1003.
捕 食 性。
分 佈：雲南；馬來西亞、泰國、孟加拉。

Nychogomphus flavicaudus (Chao) 黃尾奈春蜓 (Chao, 1990:313)
Onychogomphus flavicaudus Chao, 1982:293.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Nychogomphus striatus Fraser (Chao, 1994:69)
Nychogomphus striatus Fraser
捕 食 性。

分 佈：雲南。

Onychogomphus dingavani Fraser 戴氏鈎尾箭蜓 (Zhou, 1987:128)

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸。

Onychogomphus formosanus (Matsumura) 鈎尾春蜓 (Chao, 1983:105; Hun., 1992:4; Lieftinck et al., 1984:35; Zhang, 1987[ed.] :32)

Lindenia formosana Matsumura *in* Oguma, 1926:97.

Onychogomphus formosanus, Needham, 1930:43.

=*Onychogomphus micans* Needham, 1930:41.

別 名：*閃鈎尾箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、海南。

Onychogomphus walli Fraser 威氏鈎尾箭蜓 (Zhou, 1987:132)

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸。

Ophiogomphus (Ophinurus) guangdongensis Chao 廣東蛇紋春蜓 (Chao, 1994:73)

Ophiogomphus (*Ophinurus*) *guangdongensis* Chao, 1994:73-75.

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Ophiogomphus (s. str.) **obscurus** Bartenef 暗色蛇紋春蜓 (Chao, 1954:399; 1983:106; 1990:384)

Ophiogomphus cecilia var.*obscurus* Bartenef, 1909:34.

Ophiogomphus obscurus, Asahina, 1942:77.

別 名：*暗色北箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：河北、吉林、黑龍江；北韓、庫頁島、東西伯利亞。

Ophiogomphus (Ophionurus) sinicus (Chao) 中華長鈎春蜓 (Chao, 1954:264; 1983:106; 1990: 390; Zhou et al., 1995:48)

Onychogomphus sinicus Chao, 1954:257, 264.

Ophiogomphus (*Ophionurus*) *sinicus,* Chao, 1990:390.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、香港、浙江。

Ophiogomphus (s. str.) **spinicornis** Selys 棘角蛇紋春蜓 (Chao, 1954:399; 1990:384)

Ophiogomphus spinicornis Selys, 1878:437.

別 名：*刺角北箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：河北、山西、甘肅、青海、內蒙古。

Orientogomphus armatus Chao et Xu 具突東方春蜓 (Chao, 1990:342)

Orientogomphus armatus Chao et Xu, 1987:260.

捕 食 性。

分 佈：福建(沙縣)。

Paragomphus hoffmanni (Needham) 賀副春蜓 (Chao, 1954:418; 1983:106; 1990:315; 1994:69)

Gomphus hoffmanni Needham, 1931:227-229.

Paragomphus hoffmanni, Chao, 1954:418.

捕 食 性。

分 佈：海南、雲南。

Paragomphus pardalinus Needham 豹紋副春蜓 (Chao, 1954:419; 1982:294; 1983:106; 1990:316; 1994:69; Yunn., 1987:25)

Paragomphus pardalinus Needham, 1942:251-252.

別 名：*永平副箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

Paragomphus wuzhishanensis Liu 五指山副春蜓 (Chao, 1990:318; Liu, 1988:167)

Paragomhus wuzhishanensis Liu, 1988:167-169.

捕 食 性。

分 佈：海南(五指山)。

Phaenandrogomphus aureus (Laidlaw) 金黃顯春蜓 (Chao, 1990:392)

Onychogomphus aureus Laidlaw, 1922:405, 406.

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度(阿薩姆)。

Phaenandrogomphus dingavani (Fraser) 丁格顯春蜓 (Chao, 1990:393)

Onychogomphus dingavani Fraser, 1924:1005-1006.

Phaenandrogomphus dingavani, Chao, 1990:393.

別 名：*戴氏鈎尾箭蜓*。

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸、印度。

Scalmogomphus falcatus Chao 鐮狀刀春蜓 (Chao, 1990:394)

Scalmogomphus falcatus Chao, 1990:394-395.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Shaogomphus lieftincki Chao 黎氏邵春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:145; Xu, 1987:22)

Shaogomphus lieftincki Chao, 1984:73.

捕 食 性。

分 佈：福建(邵武)。

Shaogomphus postocularis epophthalmus (Selys) 寒冷邵春蜓 (Chao, 1990:147)

Gomphus epophthalmus Selys, 1872:31.
Gomphus postocularis epophthalmus, Asahina, 1985:7.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；西伯利亞。

Shaogomphus schmidti (Asahina) 施氏邵春蜓 (Chao, 1983:102; 1990:148)

Gomphus schmidti Asahina, 1956:155.
Shaogomphus schmidti, Chao, 1990:148.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Sieboldius (s. str.) **albardae** Selys 艾氏施春蜓 (Chao, 1955:73; 1990:403)

Sieboldius albardae Selys, 1886:181.
=*Hagenius japonicus,* Matsumura, 1903:8(f. 3). (*nec* Selys)
Hagenius (*Sieboldius*) *albardae,* Chao, 1955:73.
別 名：*艾哈箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：河北(北京)、東北；朝鮮、日本。

Sieboldius (s. str.) **alexanderi** (Chao) 亞力施春蜓 (Chao, 1955:74; 1983:106; 1990:404)

Hagenius (*Sieboldius*) *alexanderi* Chao, 1955:74.
Sieboldius alexanderi, Davies et Tobin, 1985:53.
別 名：*亞力哈箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Sieboldius (Pseudohagenius) deflexus (Chao) 闊腹春蜓 (Chao, 1955:76; 1983:106; 1990:399; Lieftinck et al., 1984:30; Xu, 1987:22)

Hagenius (s. str.) *deflexus* Chao, 1955:73, 76.
Sieboldius deflexus, Asahina, 1972:2.
別 名：*折尾哈箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、浙江。

Sieboldius (subgen. ?) **herculeus** Needham 環紋施春蜓 (Chao, 1955:77; 1983:106; 1990:407)

Sieboldius herculeus Needham, 1930:30.
Hagenius herculeus, Chao, 1955:77.
別 名：*横紋哈箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Sieboldius (s. str.) **maai** Chao 馬氏施春蜓 (Chao, 1990:405)

Sieboldius (s. str.) *maai* Chao, 1990:405-407.

捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Sinictinogomphus clavatus (Fabricius) 大團扇春蜓 (ASZI, 1986, 1:10; Chao,1955:85; 1983:107; 1990:416; 1994:69; He et al., 1991:74; Sui et al., 1992:33; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.] :32)
Aeshna clavata Fabricius, 1775:425.
=*Ictinus phaleratus,* Selys, 1854:94.
=*Ictinus rapax,* Takahashi, 1930:148.
Sinictinogomphus clavatus, Fraser, 1939:22.
=*Ictinus pertinax,* Ishida, et al., 1973:17.
別 名：*團扇蜻蜓，團扇箭蜓，箭尾蜓，黃新葉箭蜓，柄腹新葉箭蜓，細鉤春蜓，大春蜓*。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、越南。

Sinogomphus asahinai Chao 朝比奈華春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:235)
Siinogomphus asahinai Chao, 1984:233.
別 名：*友好華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Sinogomphus formosanus Asahina 鋏剪春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:237; Lieftinck et al., 1984:34)
=*Sinogomphus flavilimbatus* (sic) subsp. Asahina, 1940:23.
=*Gomphus flavolimbatus,* Kobayashi, 1941:424. (*nec* Oguma, 1926) (in pt.)
Sinogomphus formosanus Asahina, 1951:18.
=*Sinogomphus pylades,* Chao, 1954:46, 50. (*nec* Lieftinck, 1939) (in pt.)
別 名：*臺灣華春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Sinogomphus leptocercus Chao 細尾華春蜓 (Chao, 1983:103; 1990:240)
Sinogomphus leptocercus Chao, 1983:269.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Sinogomphus orestes (Lieftinck) 三尖華春蜓 (ASZI, 1986, 1:6; Chao, 1954:52; 1983:103; 1990:241)
Gomphus orestes Lieftinck, 1939:285, 287.
Sinogomphus orestes, Chao, 1954:52.
別 名：*峰頂華箭蜓，山居華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Sinogomphus peleus (Lieftinck) 黃側華春蜓 (Chao, 1954:48; 1983:103; 1990:242)

Gomphus peleus Lieftinck, 1939:285, 391.
Sinogomphus peleus, Chao, 1954:48.
別 名：*無點華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Sinogomphus pylades (Lieftinck) 無裂華春蜓 (Chao, 1954:50; 1983:103; 1990:243)
Gomphus pylades Lieftinck, 1939:285.
Sinogomphus pylades, Chao, 1954:50.
別 名：*無裂華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Sinogomphus scissus (McLachlan) 長角華春蜓 (ASZI, 1986, 1:6; Chao, 1954:46; 1983:103; 1990:246)
Gomphus scissus McLachlan, 1896:367.
=*Gomphus edax* Needham, 1930:47, 51-52.
=*Sinogomphus nigrofasciatus* May, 1935:90-94.
Sinogomphus scissus, Chao, 1954:46.
=*Sinogomphus shennongianus,* Liu, 1989:459-461.
別 名：*岐尾華箭蜓，裂口華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北。

Sinogomphus shennongjianus Liu 神農架華春蜓 (Liu, 1989:459)
Sinogomphus shennongjianus Liu, 1989:459.
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Sinogomphus suensoni (Lieftinck) 修氏華春蜓 (Chao, 1954:55; 1983:103; 1990:248; Sui et al., 1992:32)
Gomphus suensoni Lieftinck, 1939:285, 294.
Sinogomphus suensoni, Chao, 1954:55.
別 名：*健尾華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：湖南、陝西、山西。

Sinogomphus telemon (Lieftinck) 雙紋華春蜓 (Chao, 1954:53; 1983:103; 1990:250)
Gomphus telemon Lieftinck, 1939:285, 290.
Sinogomphus telemon, Chao, 1954:53.
別 名：*雙斑華箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Stylogomphus changi Asahina 球角春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:255; Lieftinck et al., 1984:32)
Stylogomphus changi Asahina, 1968:92.
別 名：*張氏尖尾箭蜓*。

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Stylogomphus chunliuae Chao 純鎏尖尾春蜓 (Chao, 1954:58; 1983:104; 1990:257)
Stylogomphus chuliuae Chao, 1954:58.
別 名：*純鎏尖尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Stylogomphus lutantus Chao 肖小尖尾春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:259)
Stylogomphus lutantus Chao, 1983:271.
別 名：*肖小尖尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Stylogomphus shirozui Asahina 錘角春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:260)
=*Stylogomphus suzukii,* Chao, 1954:61. (*nec* Oguma, 1927)
Stylogomphus shirozui Asahina, 1966:108.
別 名：*臺灣尖尾箭蜓*，*臺灣尖尾春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Stylogomphus tantulus Chao 小尖尾春蜓 (Chao, 1954:62; 1983:104; 1990:264; Xu, 1987:22; Zhou et al., 1995:48)
Stylogomphus tantulus Chao, 1954:58, 62.
別 名：*小尖尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Stylogomphus shirozui Asahina 錘角春蜓 (Lieftinck et al., 1984:32)
=*Stylogomphus suzukii* Chao, 1954:58, 61. (*nec* Oguma, 1926)
Stylogomphus shirozui Asahina, 1966:108.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Stylurus amicus (Needham) 長節擴腹春蜓 (Chao, 1953:420; 1983:104; 1986:35; 1990:111; Xu, 1987:22)
Gomphus amicus Needham, 1930:63.
=*Gomphus szechuanicus* Chao, 1953:418.
Stylurus amicus, Asahina, 1978:6.
別 名：*橫紋闊腹箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、四川。

Stylurus clathratus (Needham) 黑面擴腹春蜓 (Chao, 1953:422; 1982:287; 1983:104; 1986:38; 1990:116)
Gomphus clathratus Needham, 1930:64.

=*Gomphus amicus* Needham, 1930:63. [Misident.]
Stylurus clathratus, Needham, 1948:336.
別 名：*黑面棍腹箭蜓，黑面擴腹箭蜓，黑面闊腹箭蜓，三斑箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、四川、湖北。

Stylurus endicotti (Needham) 恩迪擴腹春蜓 (ASZI, 1986, 1:5; Chao, 1953:430; 1990:120; Sui et Sun, 1988:147)
Gomphus endicotti Needham, 1930:61.
Stylurus endicotti Sui et Sun, 1988:147-149.
別 名：*恩迪箭蜓，棒腹箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川。

Stylurus erectocornis Liu et Chao 豎角擴腹春蜓 (Chao, 1990:121)
Stylurus erectocornis Liu et Chao, 1990:121-122.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Stylurus flavicornis (Needham) 黃角擴腹春蜓 (Chao, 1953:427; 1986:39; 1990:122)
Gomphus flavicornis Needham, 1931:3.
Stylurus flavicornis; Chao et Xu, 1986:39.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Stylurus flavipes (Charpentier) 黃足擴腹春蜓 (Chao, 1990:125)
Aeschna flavipes Charpentier, 1825:
Stylurus flavipes flavipes, Asahina, 1973:24.
捕 食 性。
分 佈：陝西、東北；西伯利亞東部、歐洲。

Stylurus gaudens (Chao) 愉快擴腹春蜓 (Chao, 1953:417, 424; 1990:127)
Gomphus gaudens Chao, 1953:417.
別 名：*愉快春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川(灌縣)。

Stylurus gideon (Needham) 雙斑擴腹春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:129)
Gomphurus gideon Needham, 1941:152, 153.
Stylurus gideon, Needham, 1948:336.
捕 食 性。
分 佈：四川(成都)、湖北。

Stylurus kreyenbergi (Ris) 克雷擴腹春蜓 (Chao, 1990:131)
Gomphus kreyenbergi Ris, 1928:273.
Stylurus kreyenberigi (Ris); Chao, 1990:131

捕 食 性。
分 佈：江西、四川、浙江、山東。

Stylurus nanningensis Liu 南寧擴腹春蜓 (Chao, 1990:133; Liu, 1985:210)
Stylurus nanningensis Liu, 1985:210-211.
捕 食 性。
分 佈：廣西(南寧)。

Stylurus nobilis Liu et Chao 高尙擴腹春蜓 (Chao, 1990:136)
Stylurus nobilis Liu et Chao, 1990:136.
捕 食 性。
分 佈：寧夏。

Stylurus occultus (Selys) 奇特擴腹春蜓 (Chao, 1954:422; 1990:137)
Platygomphus? occultus Selys, 1878:440-441.
別 名：*奇特箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、河北，天津、甘肅(阿爾多 Ordos)、東北。

Stylurus placidus Liu et Chao 文雅擴腹春蜓 (Chao, 1990:139)
Stylurus placidus Liu et Chao, 1990:139-140.
捕 食 性。
分 佈：四川(樂山市)。

Stylurus takashii (Asahina) 深山擴腹春蜓 (Chao, 1990:140)
Gomphus takashii Asahina, 1966:113.
別 名：*深山棍尾春蜓*，*深山箭蜓*，*南山春蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Stylurus tongrenensis Liu 銅仁擴腹春蜓 (Liu, 1991:135)
Stylurus tongrenensis Liu, 1991:135.
捕 食 性。
分 佈：貴州(銅仁)。

Stylurus sp. 擴腹春蜓 (Sui et al., 1992:32)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Trigomphus agricola (Ris) 野居棘尾春蜓 (ASZI, 1986, 1:5; Chao, 1954:29; 1983:104; 1990:219; Sun, 1997:72; Zhang, 1987[ed.] :32)
Gomphus agricola Ris, 1916:53-55.
Trigomphus agricola, Chao, 1954:29.
別 名：*褐胸棘尾蜓*。

捕 食 性。
分 佈：福建、浙江、江蘇、湖北。

Trigomphus beatus Chao 黃唇棘尾春蜓 (Chao, 1954:26; 1982:287; 1983:104; 1990:221; Hun., 1992:5)
Trigomphus beatus Chao, 1954:26.
別 名：*黃唇棘尾箭蜓，黃唇棘尾蜓，扇翅棘尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣西、湖北。

Trigomphus carus Chao 親棘尾春蜓 (Chao, 1954:34; 1983:104; 1990:225; Zhou et al., 1995:47)
Trigomphus carus Chao, 1954:34.
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Trigomphus citimus (Needham) 吉林棘尾春蜓 (Chao, 1954:30; 1983:104; 1990:225)
Gomphus citimus Needham, 1931:2.
=*Gomphus nigripes* Asahina, 1942:
Trigomphus citimus, Chao, 1954:30.
別 名：*吉林棘尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：吉林；朝鮮。

Trigomphus lautus (Needham) 淨棘尾春蜓 (Chao, 1954:32; 1983:104; 1990:228)
Gomphus lautus Needham, 1931:2-3.
Trigomphus lautus, Chao, 1954:32.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Trigomphus nigripes (Selys) 黑足棘尾春蜓 (Chao, 1983:104; 1990:229)
Gomphus nigripes Selys, 1887:59.
Trigomphus nigripes, Davies et Tobin, 1985:14.
捕 食 性。
分 佈：遼寧、吉林。

Trigomphus succumbens (Needham) 斜紋棘尾春蜓 (Chao, 1954:31; 1983:104; 1990:229)
Gomphus succumbens Needham, 1931:2:
Trigomphus succumbens, Chao, 1954:31.
別 名：*斜紋棘尾箭蜓*。
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Trigomphus sven-hedini (Sjoestedt) 斯氏棘尾春蜓 (Chao, 1954:33; 1983:104; 1990:230)
Gomphus sven-hedini Sjoestedt, 1933:11-12.
Trigomphus sven-hedini Chao, 1990:230.

別 名：*圓斑棘尾蜓*。
捕 食 性。
分 佈：四川。

Trigomphus sp. 棘尾春蜓 (Lieftinck et al., 1984:64)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Aeschnidae 晏蜓科(蜓科)

Aeshna juncea (Linnaeus) (Chao, 1981:54)
捕 食 性。
分 佈：西藏；全北區廣布。

Aeshna ornithocephala MacLachlan 黃面蜓 (Hun., 1992:1)
捕 食 性。
分 佈：湖南、西藏、四川。

Aeshna taiyal Asahina 泰雅晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:37)
Aeshna taiyal Asahina, 1938:541.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Aeshna sp. (Chao, 1994:69)
Aeshna sp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Aeschnophlebia anisoptera Selys 長痣綠蜓 (ASZI, 1986, 1:2; Jiang, 2000:65)
Aeshnophlebia anisoptera Selys, 1883:123.
捕 食 性。
分 佈：山東、北京；日本。

Aeschnophlebia longistigma Selys (Jiang, 2000:64)
Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883:123.
=*Aeschnophlebia kolthoffi* Sjostedt, 1925:131-135.
捕 食 性。
分 佈：江蘇、南京、河北；朝鮮、日本。

Anaciaeschna jaspidea (Burmeister) 碧翠晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:38)
Aeschna jaspidea Burmeister, 1839:840.
Anaciaeschna jaspidea, Martin, 1908:30-31.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度、印尼、東至太平洋。

Anaciaeschna martini Selys 烏基晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:39)

Anaciaeschna martini Selys, 1897:431.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本。

Anax goliathus Fraser 黃額偉蜓 (ASZI, 1986, 1:2; Chao, 1994:69)

Anax goliathus Fraser

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南。

Anax guttatus (Burmeister) 烏點晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:39)

Aeschna guttata Burmeister, 1839:840.

Anax guttatus, Oguma, 1915:122, 123.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；琉球群島、日本、印度、Seychelle Is., 澳洲北部、太平洋。

Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma 黑紋偉蜓 (Chao, 1994:69; Lieftinck et al., 1984:39; Sui et Sun, 1988:25; Sui et al., 1992:31; Sun, 1997;71; Yunn., 1987:24; Zhou et al., 1995:47)

Anax nigrofasciatus Oguma, 1915:121.

Anax nigrofasciatus nigrofasciatus, Asahina, 1962:249. (in pt.)

Anax nigrofasciatus nigrolineatus Asahina, 1977:37. (*nec* Fraser, 1935)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、貴州、雲南、西藏、四川、山西、北京；朝鮮、日本。

Anax panybeus Hagen 麻斑晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:40)

Anax panybeus Hagen, 1867:42.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；Celebes, 菲律賓、琉球群島。

Anax parthenope Selys 碧偉蜓 (Chao, 1994:69; Ren et al., 1993(3):28; Wu, 1988:572; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.] :30; Zhou et al., 1995:46)

Anax parthenope Selys

捕 食：柑橘園害蟲

分 佈：江西、貴州、雲南、西藏(林芝、拉薩、曲水)、四川、浙江、江蘇、華中、河北、北京、新疆；印度、中東、北非、歐洲。

Anax parthenope julius Brauer 綠胸晏蜓 (ASZI, 1986, 1:3; Chen et al., 1993:125; He et al., 1991:74; Hun., 1992:1; Lieftinck et al., 1984:40; Sui et Sun, 1996:38; Sui et al., 1992:31; Yunn., 1987:24; Zhou et al., 1995:47)

Anax julius Brauer, 1865:508.

Anax parthenope julius, Martin, 1908:21-22.

=*Anax parthenope,* Oguma, 1932:1898. (*nec* Selys, 1839, s.s.)

別 名：*碧偉蜓，馬大頭，銀蜻蜓*。

捕 食：葉蟬

蛾類

分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、北京、新疆、東北；朝鮮、日本、Bonin Is., Borodino Is. 琉球群島、印度。

Anax sp. 蜻蜓 (Zhang et Li, 1982:228)

捕 食：*Odontoterms formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻

分 佈：浙江。

Cephalaeschna acutifrons Martin 寬痣頭蜓 (Hun., 1992:1)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、四川；緬甸。

Cephalaeschna magdalena Martin 狹痣頭蜓 (Sui et al., 1992:31; Zhang, 1987[ed.] :30)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、四川、湖北。

Cephalaeschna masoni (Martin) 黑額頭蜓 (Hun., 1992:2)

捕 食 性。

分 佈：湖南；印度。

Cephalaeschna risi Asahina 微刺晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:36)

=*Cephalaeschna biguttata* (?) Asahina, 1940:23. (*nec* Fraser, 1935)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東。

Cephalaeschna spp. (Chao, 1994:69)

Cephalaeschna spp., Chao, 1994:69.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川(峨嵋山)。

Gynacantha bayadera Selys 涍鋏晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:40; Sun, 1997:71; Zhang, 1987[ed.] :30)

Gynacantha bayadera Selys, 1892:483.

別 名：*工紋長尾蜓*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西、四川、江蘇；菲律賓、印度、印尼、新幾內亞。

Gynacantha hyalina Selys 長鋏晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:41)

Gynacantha hyalina Selys, 1882:

=*Gynacantha subinterrupta* Needham, 1930:88. (*nec* Rambur. 1842)

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓。

Gynacantha incisura Fraser 缺切長尾蜓 (Sui et al., 1992:31)

捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、浙江。

Gynacantha japonica Bartenef 日本長尾蜓 (Hun., 1992:2; Lieftinck et al., 1984:41)
Gynacantha japonica Bartenef, 1909:7, 14.
=*Gynacantha rosenbergi,* Kato, 1933:pl. 28(2).
別 名：*日本長尾蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南；琉球群島、日本。

Gynacantha saltatrix Martin 舞鋏晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:41)
Gynacantha saltatrix Martin, 1909:194-195.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建；越南、泰國。

Gynacantha subinterrupta Rambur 細腰長尾蜓 (Sun, 1997:72; Yunn., 1987:24; Zhang, 1987[ed.] :30)
Gynacantha subinterrupta Rambur, 1942:
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、雲南。

Gynacantha sp. (Chao, 1994:69)
Gynacantha sp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Oligoaeschna pyanan Asahina 源埡晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:36)
Oligoaeschna pyanan Asahina, 1951:19.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Periaeschna magdalena Martin 柱鋏晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:36)
Periaeschna magdalena Martin, 1909:157.
=*Gynacanthaeschna sikkima* (?), Asahina, 1940:24. (*nec* Karsch, 1891)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣西、浙江、江蘇；越南、泰國、緬甸、印度(阿薩姆)。

Petaliaeschna corrneliae Asahina 科氏葉蜓 (Zhou et al., 1995:47)
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Planaeschna milnei Selys 角斑黑額蜓 (Hun., 1992:2; Zhang, 1987[ed.]:30)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、湖南、北京；日本。

Planaeschna risi risi Asahina 李斯晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:37)

=*Planaeschna milnei,* Ris, 1916:57. (*nec* Selys, 1883)
=*Planaeschna milnei orientalis* Kobayashi, 1941:401. (in pt.)
Planaeschna risi Asahina, 1964:301.
Planaeschna risi risi Asahina, 1964:302.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Planaeschna taiwana Asahina 陽明晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:37)

Planaeschna taiwana Asahina, 1951:19.
=(?) *Planaeschna* sp., Inoue et Takahashi, 1969:30. (in pt.)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Planaeschna sp. 黑頡蜓 (Chen, 1996, 18(1):20)

捕 食 性。
分 佈：廣東。

Planaeschna sp. (Chao, 1994:69)

Planaeschna sp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Polycanthagyna chaoi Yang et Li 趙氏多棘蜓 (Yang et Li, 1994:445)

Polycanthagyna chaoi Yang et Li, 1994:445-447.
捕 食 性。
分 佈：四川(通江縣)。

Polycanthagyna erythromelas paiwan Asahina 朱黛晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:38)

Polycanthagyna erythromelas paiwan Asahina, 1951:20.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Polycanthagyna melanictera (Selys) 描金晏蜓 (Lieftinck et al., 1984:38)

Aeschna melanictera Selys, 1883:119.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本。

Corduliidae 弓蜓科(僞蜻科)

Azuma elegans Brauer (Zhang, 1987[ed.] :34)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Cordulia sp. (Lieftinck et al., 1984:64)

Cordulia sp. Kano, 1930:207.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Epitheca bimaculata Charpentier 大虎斑蜻蜓 (He et al., 1991:77)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：河南。

Epitheca marginata Selys 緣斑毛僞蜻 (ASZI, 1986, 1:11; He et al., 1991:77; Hun., 1992:13; Zhang, 1987[ed.] :34)

別 名：*虎斑蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：江西、湖南、四川、江蘇、湖北、北京；朝鮮、日本。

Epophthalmia elegans (Brauer) 慧眼弓蜓 (ASZI, 1986, 1:11; He et al., 1991:75; Hun., 1992:5; Lieftinck et al., 1984:43; Sui et al., 1992:33; Yunn., 1987:25)

Macromia elegans Brauer, 1865:905.

Epophthalmia elegans, Asahina, 1965:126.

別 名：*大山蜻，閃藍麗大蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、上海、湖北、河南、北京；朝鮮、日本、東南亞。

Epophthalmia kuani Jiang 寬麗大蜻 (Jiang, 1998:231-234)

Epophthalmia kuani Jiang, 1998:231-233.

捕 食 性。

分 佈：江蘇。

Hemicordulia mindana nipponica Asahina 岷峨弓蜓 (Lieftinck et al., 1984:42)

Hemicordulia mindana Asahina, 1947:83.

Hemicordulia mindara nipponica Asahina, 1980:97-98.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；琉球群島、日本。

Idionyx lieftincki Zhou 萊氏異僞蜻 (Zhou et al., 1995:49)

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Idionyx stevensi Fraser 斯氏異尾蜻 (Zhou, 1989:180)

Idionyx stevensi Fraser, 1924:463.

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度(大吉嶺)、不丹。

Idionyx sp. (Chao, 1994:69)

Idionyx sp., Chao, 1994:69.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Macromia berlandi Lieftinck 伯弓蜻 (Zhou, 1989:180)
Macromia berlandi Lieftinck, 1941:94.
捕 食 性。
分 佈：廣西；越南。

Macromia chui Asahina 耀沂弓蜓 (Lieftinck et al.,1984:42)
Macromia chui Asahina, 1968:94.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Macromia clio Ris 海神弓蜓 (Lieftinck et al.,1984:42)
Macromia clio Ris, 1916:66, 67.
=*Macromia amphigena* Chujo, 1931:329. (*nec* Selys, 1871)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建；琉球群島。

Macromia flavocolarata Fraser 黃斑弓蜻 (Zhou, 1989:180)
Macromia flavocolarata Fraser, 1922:702.
捕 食 性。
分 佈：雲南；泰國、緬甸、孟加拉。

Macromia mallifera Lieftinck 錘弓蜻 (Zhou et al., 1995:49)
捕 食 性。
分 佈：福建、浙江。

Macromia moorei Selys 雙峰大蜻 (Chao, 1994:70; Yunn., 1987:25)
Macromia moorei Selys
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Macromia urania Ris 天王弓蜓 (Lieftinck et al., 1984:42)
Macromia urania Ris, 1916:68.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國東南部、海南；越南、琉球群島(Ishigaki)。

Macronidia hangzhouensis Zhou 杭州異偽蜻 (Zhou et al., 1995:49)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Somatochlora sp. 金光僞蜻 (Chen, 1996, 18(1):20; Sui et al., 1992:180)
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東。

Libellulidae 蜻科

Acisoma panorpoides Rambur 錐腹蜻 (Chao, 1981:54; Sui et Sun, 1988:25; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.] :32)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣西、雲南、西藏(墨脫)、浙江、江蘇；菲律賓、印度、斯里蘭卡。

Acisoma panorpoides panorpoides Rambur 粗腰蜻蜓 (Chao, 1994:70; He et al., 1991:75; Hun., 1992:5; Lieftinck et al.,1984:51)
Acisoma panorpoides Rambur, 1842:28.
Acisoma panorpoides panorpoides, Ris, 1911:456, 457.
別 名：*蝎形蜻，鐮狀蜻*。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
葉蟬。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南；菲律賓、印度、斯里蘭卡、Celebes, Lesser Sunda Is., 琉球群島、日本。

Agrionoptera insignis similis Selys 八仙蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:44)
Agrionoptera insignis race? *similis* Selys, 1879:303.
Agrionoptera insignis, Okumura, 1935:14.
=*Agrionoptera insignis insignis,* Chujo, 1930:287.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球群島(Iriomote)、菲律賓至所羅門群島。

Brachydiplax chalybea Brauer (Chao, 1994:70)
Brachydiplax chalybea Brauer
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Brachydiplax chalybea flavovittata Ris 橙斑蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:51)
Brachydiplax chalybea flavovittata Ris, 1911:253.
=*Brachydiplax chalybea*: Chujo, 1930:81. (*nec* Brauer, 1868, s.s.)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；越南、Borodino Is., 琉球群島。

Brachythemis contaminata (Fabricius) 褐斑蜻蜓 (Chao, 1994:70; He et al., 1991:75; Hun., 1992:6; Lieftinck et al., 1984:53; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.]:32)
Libellula contaminata Fabricius, 1793:382.
Brachythemis contaminata, Ris, 1911:582, 587.
別 名：*姬黃蜻，真姬蜻*。

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
葉蟬
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南；琉球(Yonakuni, Ishigaki)、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Cratilla lineata assidua Lieftinck 線紋蜻蜓 (Lieftinck et al.,1984:45)
Cratilla lineata assidua Lieftinck, 1953:202, 205.
=*Cratilla lineata,* Ris, 1919:1070. (*nec* Brauer, 1878, s.s.)
=*Cratilla* (sic) *lineata lineata,* Adachi, 1980:39.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓、Sulu Is., Celebes, Bali, 爪哇。

Crocothemis erythraea Brulle (Zhang, 1987[ed.] :32)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Crocothemis servilia servilia (Drury) 猩紅蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:12; ASZI, et al., 1978:279; Chao, 1994;70; Chen, 1996 18(1):20; He et al., 1991:75; Hun., 1992:6; Lieftinck et al., 1984:52; Sui et Sun, 1988:25; 1992:48; Sui et al., 1992:33; Sun, 1997:74; Yunn., 1987:27; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed,]:32)
Libellula servilia Drury, 1770:112.
Crocothemis servilia, Matsumura, 1907:6.
Crocothemis servilia servilia, Fraser, 1936:345.
別 名：*紅蜻，赤卒*。
捕 食：稻蝨
葉蟬
蛾類
蠅類
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、天津、北京、遼寧；日本、菲律賓、印度、非洲、歐洲、澳洲、所羅門群島。國內南北各地甚為常見；國外分佈亞熱帶、溫帶廣大地區和大洋洲。

Deielia phaon (Selys) 短痣蜻蜓 (Chao, 1994:70; Hun., 1992:6; Lieftinck et al., 1984:54; Zhang, 1987[ed.] :32)
Triithemis phaon Selys, 1883:106.
=*Trichemis phaon dispar* Selyx, 1883:107.
Deielia phaon, Ris, 1911:589.
=*Deiellia phaon brevistigma* Oguma, 1915:10. nom. nud.
=*Deielia phaon phaon,* Chujo, 1931:328.
=*Deielia phaon dispar,* Chujo, 1931:
別 名：*帆白蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、東北；琉球群島、朝鮮、日本。

Diplacodes trivialis (Rambur) 侏儒蜻蜓 (Chao, 1994:79; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:75; Lieftinck et al.,, 1984:52; Yunn., 1987:25; Zhang 1986:205; Zhou et al., 1995:49)

Libellula trivialis Rambur, 1842:115.
Diplacodes trivialis, Ris, 1911:462, 468.
別 名：*紋藍小蜻*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南；印度、Seychelle Is., 亞洲、日本、澳洲、太平洋。

Hydrobasileus croceus (Brauer) 硃紅蜻蜓 (Chao, 1994:70; Lieftinck et al., 1984:60; Sun, 1997:75)
Tramea crocea Brauer, 1867:813-814.
Hydrobasileus croceus, Ris, 1913:966, 969.
別 名：*臀斑楔翅蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川、浙江；菲律賓、Celebes, 印度、斯里蘭卡。

Lathrecista asiatica asiatica (Fabricius) 海神蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:44)
Libellula asiatica Fabricius, 1798:283.
Lathrecista asiatica asiatic, Ris, 1910:129, 130.
Lathrecista asiatica, Ris, 1916:74.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度至薩摩。

Libellula angelina Selys 低斑蜻 (ASZI, 1986, 1:12; He et al., 1991:75)
別 名：*鱉甲蜻蜓*。
捕 食：葉蟬
蛾類
分 佈：浙江、江蘇、河南、北京。

Libellula basidinea McLachlan 高斑蜻. (ASZI, 1986 1:13; Sui et Sun, 1988:25; 1996:38)
Libellula basidinea McLachlan, 1894:
捕 食 性。
分 佈：西藏、新疆。

Libellula depressa Linnaeus 基斑蜻 (ASZI, 1986, 1:13; Hun., 1992:6; Sui et al., 1992:33; Sun, 1997:75; Yunn., 1987:26)
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川、湖北。

Libellula quadrimaculata Linnaeus (Chao, 1981:54; Wu, 1988:572)
捕 食 性。
分 佈：西藏(林芝、拉薩)；全北區。

Lyriothemis elegantissima Selys 廣腹蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:43)
Lyriothemis elegantissima Selys, 1883:142.
捕 食 性。

分 佈：臺灣、中國大陸；琉球群島、日本。

Lyriothemis flava Oguma 樹穴蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:43)

Lyriothemis flava Oguma, 1915:11.
=*Lyriothemis tricolor* Ris, 1916:73.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；緬甸、琉球群島(Iriomote)。

Lyriothemis pachygastra Selys 閃綠寬腹蜻 (Chao, 1994:70; He et al., 1991:75; Hun., 1992:7; Yunn., 1987:27; Zhang, 1987[ed.] :32)

捕 食：葉蟬
蛾類
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、華北。

Macrodiplax cora (Brauer) 高翔蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:62)

Diplax cora Brauer, 1867:292-293.
Macrodiplax cora, Ris, 1913:1036, 1038.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；Sokotra, Seychelle Is., 印度、斯里蘭卡至澳洲、太平洋。

Nannodiplan yutsehongi Navás 斑蜻 (Zhang, 1987[ed.] :32)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Nannophya pygmaea Rambur 小紅蜻蜓 (He et al., 1991:75; Hun., 1992:7; Lieftinck et al., 1984:50)

Nannophya pygmaea Rambur, 1842:27.
=*Nannodiplax clara,* Kato, 1933:pl. 39(4). (*nec* Needham, 1930)
別 名：*紅小蜻*。
捕 食：飛蝨
分 佈：臺灣、湖南、貴州；日本、越南、馬來半島、印度、所羅門群島。

Nannophyopsis clara (Needham) 漆黑蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:50)

Nannodiplax clara Needham, 1930:120.
Nannophyopsis clara, Asahina, 1978:10-11.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、福建、浙江、江蘇；(?)日本。

Neurothemis fulvia (Drury) 淺褐蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:13; Chao, 1994:70; Chen, 1996, 18(1):20; Lieftinck et al., 1984:53; Sun, 1997:75; Yunn., 1987:27)

Libellula fulvia Drury, 1773:84-85.
Libellula sophronia Drury, 1773:86.
Neurothemis fulvia, Ris: 1911:553, 580-581.
別 名：*網脈蜻*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、四川、華東；印度、蘇門答臘。

Neurothemis intermedia Rambur (Chao, 1994:70)

Neurothemis intermedia Rambur

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neurothemis ramburii Brauer ver. **terminata** Ris 善變蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:53)

Neurothemis ramburii (Brauer, 1866)

Neurothemis terminata Ris, 1911

=*Neurothemis palliata* intermed. *terminata,* Ris, 1911:550, 556. (in pt.)

=*Neurothemis fluctuans,* Matsumura, 1913:42.

=*Neurothemis palliata* forma, Ris, 1916:76

=*Neurothemis ramburii ramburii,* Inoue et Takahashi, 1969:30.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Neurothemis tullia feralis Burmeister (Chao, 1994:70)

Neurothemis tullia feralis Burmeister

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neurothemis tullia tullia (Drury) 雙截蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:13: Chao, 1994:70; He et al., 1991:75; Lieftinck et al., 1984:54; Yunn., 1987:27; Zhang, 1986:205; Zhou et al., 1995:49)

Libellula tullia Drury, 1773:85

Neurothemis tullia, Matsumura, 1913:43.

Neurothemis tullia tullia, Ris, 1911:551,561.

別 名：*截斑脈蜻*，*污黑瘤蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南；泰國、印度、斯里蘭卡。

Onychothemis tonkinensis tonkinensis Martin 琥珀蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:58)

Onychotemis tonkinensis Martin, 1904:208.

Onychothemis tonkinensis tonkinensis, Ris, 1912:832, 834.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；越南(東京)。

Orthetrum albistylum Selys 白尾灰蜻 (Chao, 1994:70; Ren et al., 1993(3):28; Sui et Sun, 1992:49; Sui et al., 1992:33; Sun, 1997:76)

Orthetrum albistylum Selys, 1848:

捕 食：柑橘園害蟲

分 佈：福建、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、山西、河北、北京；日本。

Orthetrum albistylum speciosum (Uhler) 白刃蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:14; He et al., 1991:76; Hun., 1992:7; Lieftinck et al., 1984:46; Yunn., 1987:26; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.]:33; Zhou et al., 1995:49)

Libellula speciosa Uhler, 1858:30.
Orthetrum albistylum Matsumura, 1907:5. (*nec* Selys, 1848, s.s.)
Orthetrum albistylum speciosum, Ris, 1910:227, 228.
=*Orthetrum speciosum,* Matsumura, 1931:1436.
別 名：*白尾灰蜻，藍辛灰蜻*。
捕 食：葉蟬
蛾類
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、北京、東北；朝鮮、日本。

Orthetrum chrysis Selys 金灰蜻 (He et al., 1991:76; Zhang, 1986:205)

捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建。

Orthetrum devium Needham 灰蜻 (Chao, 1994:70; He et al., 1991:76; Sui et Sun, 1988:26; 1992:49; Yunn., 1987:26; Zhou e al., 1995:49)

別 名：*齒背灰蜻*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇。

Orthetrum glaucum (Brauer) 黑尾灰蜻 (Lieftinck et al., 1984:46; Sui et Sun, 1988:26; Yunn., 1987:26; Zhang, 1987[ed.] :33)

Libellula glauca Brauer, 1865:1012.
Orthetrum glaucum, Ris, 1910:181, 233.
=*Orthetrum cancellatum* Oguma, 1915:12. (*nec* Linnaeus, 1758)
別 名：*黑尾灰蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、雲南、西藏；印度、新幾內亞、日本。

Orthetrum internum McLachlan 褐肩灰蜻 (Chao, 1994:70; Sui et Sun, 1988:26; 1992:49; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:76; Zhou et al., 1995:49)

Orthetrum internum McLachlan, 1894:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、河北、北京；印度。

Orthetrum japonicum internum MacLachlan 扶桑蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:14; Chao, 1981:54; He et al., 1991:76; Hun., 1992:8; Lieftinck et al., 1984:47; Yunn., 1987:26)

Orthetrum internum McLachlan, 1894:431.
Orthetrum japonicum internum, Ris, 1910:232.
別 名：*褐肩灰蜻*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、北京；朝鮮、日本、越南、印度、孟加拉、尼泊爾、喀什米爾。

Orthetrum lineostigma Selys 線痣灰蜻 (Chao, 1994:71; Sun, 1997:77)

Orthetrum lineostigma Selys, 1887:

捕 食 性。

分 佈：雲南、湖北、山西、河北、甘肅。

Orthetrum luzonicum (Brauer) 呂宋蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:47)

Libella luzonica Brauer, 1868:169-170.

=*Orthetrum chrysostigma luzonicum,* Ris, 1910:203, 210.

Orthetrum luzonicum, Ris, 1919:1074, 1081.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓、馬來西亞亞區、印度、爪哇。

Orthetrum melania (Selys) 灰黑蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:14; Chao, 1994:71; He et al., 1991:76; Lieftinck et al., 1984:47; Sui et Sun, 1988:26; 1992:49; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:77; Yunn., 1987:26; Zhang, 1987[ed.] :33; Zhou et al., 1995:50)

Libella melania Selys, 1883:103.

Orthetrum melania, McLachlan, 1894:432.

=*Orthetrum triangulare melania* Selys, 1910:243, 244.

別 名：*後黑角柱灰蜻，異色灰蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、山東、河北、北京。

Orthetrum neglectum Rambur 赤褐灰蜻 (Chao, 1994:71; Chen, 1996, 18(1):20; Ren et al., 1993(3):28; Sui et Sun, 1988:26; 1992:49; Sui et al., 1992:34; Yunn., 1987:26)

Orthetrum neglectum Rambur

捕 食：柑橘園害蟲。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江。

Orthetrum pruinosum clelia (Selys) 霜白蜻蜓(西里亞種) (Lieftinck et al.,1984:48)

Libella clelia Selys, 1878:294, 313.

Orthetrum pruinosum clelia, Ris, 1910:239, 242.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓、Celebes, Buton I., Sangihe Is., Molucca Is.

Orthetrum pruinosum neglectum (Rambur) 霜白蜻蜓(中印亞種) (Hun., 1992:8; Lieftinck et al., 1984:48)

Libellula neglecta Rambur, 1842:86-87.

Orthetrum neglectum, Needham, 1930:128, 137.

Orthetrum pruinosum neglectum, Ris, 1910:239.

=*Orthetrum pruinosum,* Oguma, 1915:12. (*nec* Burmeister, 1839, s.s.)

別 名：*赤褐灰蜻*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南；越南、印度。

天 敵：Ectoparasite：*Forcipomyia latipes* Macfie (Diptera: Ceratopogonidae)

Orthetrum sabina sabina (Drury) 杜松蜻蜓 (Chao, 1994:71; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:76; Hun., 1992:8; Li et al., :1; Lieftinck et al., 1984:48; Ren et al., 1993(3):28; Sui et Sun, 1992:49; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:78; Yunn., 1987:26; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.]:33; Zhou et al., 1995:49)

Orthetrum sabina Drury, 1770:114.

Orthetrum sabina sabina, Asahina, 1965:126.

別 名：*狹腹灰蜻，灰腹蜻*。

捕 食：空中飛蟲(稻田)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北；日本、印度、中東、澳洲、太平洋。

Orthetrum testaceum testaceum (Burmeister) 赭黃蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:49; Sui et Sun, 1992:49; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:78; Yunn., 1987:26; Zhou et al., 1995:50)

Libellula testacea Burmeister, 1839:859.

Orthetrum testaceum testaceum, Ris, 1910:181, 234.

別 名：*黃翅灰蜻*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、貴州、雲南、四川、湖北；菲律賓、緬甸、印度、Celebes, Bali Timor.

Orthetrum triangulare triangulare Selys 鼎脈蜻蜓 (He et al., 1991:76; Lieftinck et al., 1984:49)

Orthetrum triangulare Selys, 1878:

=*Pseudothemis nigrofrontis* Matsumua, 1907:5. nom. nud.

Orthetrum triangulare triangulare, Ris, 1910:181, 243. (in pt.)

別 名：*青灰蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、四川、河南、甘肅。

天 敵：Ectoparasite：*Forcipomyia aeschnosuga* (de Meijere) (Diptera: Ceratopogonidae)

Orthetrum triangulara melania Selys 異色灰蜻 (Chao, 1981:55; Hun., 1992:8)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、湖北、陜西、山東；日本。

Palpopleura 6-maculata Fabricius 六斑曲緣蜻 (Chao, 1981:55; 1994:71; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:76; Hun., 1992:9; Sui et Sun,.1988:25; 1992:50; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:78; Wu, 1988:572; Yunn., 1987:26; Zhang, 1986:205)

Palpopleura 6-maculata Fabricius, 1787:

捕 食：*Pentalonia nigromervosa* Coq. 香蕉蚜 (稻田)

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北；越南、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

Pantala flavescens (Fabricius) 薄翅蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:15; ASZI et al., 1978:279; Chao, 1981:55; 1994:71; Chen, 1996, 18(1):20; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He et al., 1991:76; Hun., 1992:9; Li et al., 1990:2; Lieftinck et al., 1984:59; Sui et Sun, 1988:26 1992:50; Sui et al., 1992:34; Sun, 1997:79; Yunn., 1987:28; Zhang, 1986:205; Zhang, 1987[ed.]:33)

Libellula flavescenes Fabricius, 1798:285.

Pantala flalvlescens, Matumura, 1910:42, 69.
別 名：*黃蜻，黃衣*。
捕 食：稻飛蝨
葉蟬
蛾類
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲
空中飛蟲
柑橘園害蟲
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東、河北、天津、北京、遼寧、吉林；日本、緬甸、印度、斯里蘭卡。廣布我國南北各地，甚爲常見；國外廣布世界熱帶和溫帶地區各國。

Potamarcha congener congener (Rambur) 溪神蜻蜓 (Chao, 1994:71; Lieftinck et al., 1984:45)
Libellula congener Rambur, 1842:70.
=*Libellula obscura* Rambur, 1842:64.
Potamarcha congener, Kuwahara, 1976:19.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南；馬來亞亞區、印度、新幾內亞、澳洲北部。

Pseudothemis zonata (Burmiester) 黃紉蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:15; He et al., 1991:76; Hun., 1992:9; Lieftinck et al., 1984:56; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:34; Zhang, 1987[ed.]:33)
Libellula zonata Burmiester, 1839:859.
Pseudothemis zonata, Matsumura, 1907:5.
別 名：*玉帶蜻，明腰蜻蜓*。
捕 食：葉蟬
蛾類
柑橘園害蟲
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、北京；朝鮮、日本、越南。

Rhyothemis fuliginosa Selys 黑麗翅蜻 (Chen et al., 1993:125; He et al., 1991:77; Hun., 1992:10; Sun, 1997:79; Zhang, 1987[ed.]:33)
Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883:
別 名：*蝶蜻蜓*。
捕 食：葉蟬
蛾類
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、湖北、河南、東北；朝鮮、日本。

Rhyothemis severini Ris 賽琳蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:61)
Rhyothemis severini Ris, 1913:932, 948.
=*Rhyothemis formosana* Matsumura, 1907:3. nom. nud.
捕 食 性。

分 佈：臺灣；越南、泰國。

Rhyothemis triangularis Kirby 三角蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:61)

Rhyothemis triangularis Kirby, 1889:319.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡、越南、婆羅洲、菲律賓

Rhyothemis variegata (Linnaeus) 琥珀蜻 (Zhang, 1987[ed.]:33; Zhou et al., 1995:50)

別 名：*斑麗翅蜻*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣東、雲南、浙江。

Rhyothemis variegata arria (Drury) 彩裳蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:62)

Libellula arria Drury, 1773:84.

Rhyothemis variegata arria, Ris, 1913:935, 936.

=*Libellula splendida* Rambur, 1842:43.

=*Rhyothemis imperatrix* Selys, 1887:53-54.

Rhyothemis variegata imperatrix, Ris, 1913:935, 937.

=*Rhyothemis variegata,* Oguma, 1932:1915. (*nec* Linnaeus et Johansson, 1764, s.s.)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、中國大陸；琉球群島。

Rhyothemis variegata inperatix Selys 斑麗翅蜻 (Hun., 1992:10; Yunn., 1987:27)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、雲南；日本、印度。

Sympetrum atardens Macachlen 堅眉翅蜻蜓 (He et al., 1991:77; Zhang, 1987[ed.]:33)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：江西、浙江。

Sympetrum baccha (Selys) 赤衣蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:15; Chao, 1994:71; He et al., 1991:77; Lieftinck et al., 1984:55; Sui et al., 1992:34; Zhang, 1987[ed.] :33)

Diplax baccha Selys, 1884:40.

Sympetrum baccha, Ris, 1911:621, 662.

=*Sympetrum baccha baccha,* Asahino, 1965:127.

別 名：*大赤蜻，大赤卒*。

捕 食：稻飛蝨。

分 佈：臺灣、福建、江西、貴州、四川、浙江。

Sympetrum baccha matutimum Ris 黎明赤蜻 (Hun., 1992:10)

捕 食 性。

分 佈：湖南、東北；朝鮮、日本。

Sympetrum commixtum (Selys) (Chao, 1981:55)

捕 食 性。
分 佈：西藏(拉薩)、四川、湖北、華西、華北。

Sympetrum clarwinianum Sellys 夏赤卒 (Zhang, 1987[ed.] :33)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Sympetrum croceolum Selys 半黃赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2; He et al., 1991:77; Hun., 1992:10; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:34)
別 名：*半黃蜻*。
捕 食：(稻田)
柑橘園害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、浙江、江蘇、安徽、山西、北京；朝鮮、日本。

Sympetrum danae Sulzer 細毛赤蜻 (Sui et Sun, 1992:50)
捕 食 性。
分 佈：四川；日本。

Sympetrum darwinianum (Selys) 仲夏蜻蜓 (Hun., 1992:11; Lieftinck et al., 1984:55; Sui et Sun, 1992:50; Sun, 1997:79; Yunn., 1987:27)
Diplax frequens rece *darwiniana* Selys, 1883:94.
Sympetrum darwinianum, Ris, 1911:621, 658.
別 名：*夏赤蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、湖北、山西、東北；朝鮮、日本。

Sympetrum deresiusculum Selys 秋赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2)
捕 食 性。
分 佈：山西。

Sympetrum eroticum ardens (McLachlan) 焰紅蜻蜓 (ASZI, 1986, 1:16; Chao, 1994:71; Han et Zhu, 1997:2; Hun., 1992:11; Lieftinck et al., 1984:55; Ren et al., 1993(3):28; Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:80; Zhou et al., 1995:50)
Thecadiplax ardens McLachlan, 1893:429.
Sympetrum eroticum ardens, Ris, 1911:667, 669.
別 名：*堅眉赤蜻*。
捕 食：柑橘園害蟲。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、山西、河北、北京；日本。

Sympetrum eroticum eroticum (Selys) 眉赤蜻 (Chao, 1994:71; Lieftinck et al., 1984:55; Sui et al., 1992: 35)
Diplax erotica Selys, 1883:90.
Sympetrum eroticm eroticum; Lieftinck et al., 1984:55
捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州、四川、上海、湖北；朝鮮、日本、東西伯利亞。

Sympetrum foscolombei Selys 方氏赤蜻 (Han et Zhu, 1997:3)

Sympetrum foscolombei Selyes

捕 食 性。

分 佈：山西。

Sympetrum frequens Selys 秋赤蜻 (ASZI, 1986, 1:16; Chao, 1994:71; He et al., 1991:77)

Sympetrum frequens Selys

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：雲南、北京。

Sympetrum haematoneura Fraser (Chao, 1981:55; Wu, 1988:572)

Sympetrum haematoneura Fraser

捕 食 性。

分 佈：西藏(米林)；印度。

Sympetrum hypomelus Selys 旭光赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2; Sui et Sun, 1988:26; 1992:50)

Sympetrum hypomelus Selys

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、北京；印度。

Sympetrum ignotum Needham (Zhang, 1987[ed.]:33)

Sympetrum ignotum Needham

捕 食 性。

分 佈：江西。

Sympetrum imitans Selys 黃腿赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2; Sui et Sun, 1996:38; Yunn., 1987:27)

Sympetrum imitans Selys, 1872:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、山西、北京、新疆。

Sympetrum infuscatum Selys 褐頂赤蜻 (Han et Zhu, 1997:3; Hun., 1992:11; Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:80; Zhang, 1987[ed.] :33)

Sympetrum infuscatum Selys, 1883:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、湖北、黑龍江；朝鮮、日本。

Sympetrum kunckeli (Selys) 孔凱蜻蜓 (Han et Zhu, 1997:2; He et al., 1991:77; Lieftinck et al., 1984:56; Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:80; Zhang, 1987[ed.] :34; Zhou et al., 1995:50)

Diplax kunckeli Selys, 1884:39-40.

Sympetrum kunckeli, Ris, 1911:622, 670-671.

別 名：*小黃赤蜻*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、江蘇、上海、湖北、山西、河北、北京、東北；朝鮮、日本。

Sympetrum parvulum Bartenef 小赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2)

Sympetrum parvulum Bartenef.

捕 食 性。

分 佈：山西。

Sympetrum pedemontanum Allioni 褐帶赤蜻 (Han et Zhu, 1997:2)

Sympetrum pedemontanum Allioni

捕 食 性。

分 佈：山西。

Sympetrum ris ris Bartemef 端斑赤蜻 (He et al., 1991:77; Hun., 1992:11)

Sympetrum ris ris Bartemef

別 名：*笑赤卒*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：湖南、東北；朝鮮、日本。

Sympetrum ruptum Needham 雙橫赤蜻 (Chao, 1993:71-72; Han et Zhu, 1997:2; Sui et Sun, 1992:50; Yunn., 1987:27; Zhou et al., 1995:50)

Sympetrum ruptum Needham, 1930:

捕 食 性。

分 佈：福建、雲南、四川、山西。

Sympetrum speciosum taiwanum Asahina 黃基蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:56)

=*Sympetrum speciosum* Asahina, 1940:24. (*nec* Oguma , 1915, s.s.)

Sympetrum speciosum taiwanum Asahina, 1951:21.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Sympetrum uniforme Selys 大黃赤蜻 (ASZI, 1986, 1:17; Han et Zhu, 1997:2; Sun, 1997:81)

Sympetrum uniforme Selys, 1883:

捕 食 性。

分 佈：湖北、山東、山西、河北、北京。

Tholymis tillarga (Fabricius) 夜遊蜻蜓 (Hun., 1992:12; Lieftinck et al., 1984:59; Yunn., 1987:28)

Libellula tillarga Fabricius, 1798:285.

Tholymis tillarga, Ris, 1913:912, 913

別 名：*雲斑圓蜻*，*雲斑蜻*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南；日本、印度、東洋區至澳洲、Polynesia.

Tramea transmarina propinqua Lieftinck 海霸蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:60)

=*Tramea limbata* forma C4, Ris, 1913:983-984.
=*Tramea limbata,* Chujo, 1931:138. (*nec* Desjardins, 1832)
Tramea transmarina propinqua Lieftinck, 1942:521, 524, 539.
=*Tramea trasmarina euryale* (?), Ishida, 1968:19. (*nec* Selys, 1878)
捕 食 性。
分 佈：臺灣；Misool Is. (西新幾內亞)、巴布亞至北澳洲，東 Micronesia, Gilbert Is., Fiji Is.

Tramea virginia (Rambur) 大華蜻蜓 (He et al., 1991:77; Hun., 1992:12; Lieftinck et al., 1984:60; Zhang, 1987 [ed.] :34)
=*Tramea chinensis* Degeer, 1773:556. name preocc., (*nec* Linnaeus, 1758.)
Libellula virginia Rambur, 1842:33.
Tramea virginia, Ris, 1913:972, 978.
別 名：*貞斜痣蜻*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南、海南、四川、浙江；孟加拉至越南、婆羅洲、琉球群島、日本。

Trithemis aurora (Burmeister) 紫紅蜻蜓 (Chen, 1996, 18(1):20; Hun., 1992:12; Lieftinck et al., 1984:57; Sui et Sun, 1992:50; Sui et al., 1992:35; Sun, 1997:81; Yunn., 1987:27)
Libellula aurora Burmeister, 1839:859.
Trithemis aurora, Ris, 1912:760, 775.
別 名：*曉褐蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、湖北；印度、斯里蘭卡、Lesser Sunda Is., 婆羅洲、菲律賓、琉球群島、日本。

Trithemis festiva (Rambur) 樂仙蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:57; Yunn., 1987:27)
Libellula festiva Rambur, 1842:92.
Trithemis festiva, Ris, 1912:761, 796.
別 名：*慶褐蜻*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、四川；菲律賓、婆羅洲、Leser Sunda Is., 新幾內亞、印度、斯里蘭卡、東地中海。

Trithemis pallidinervis (Kirby) 灰脈蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:57)
Sympetrum pallidinervis Kirby, 1889:327-328.
Trithemis pallidinervis, Ris, 1912:761, 789.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓至印度。

Urothemis signata yiei Asahina 褐基蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:63)
Urothemis signata yiei Asahina, 1972:30.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Zygonyx takasago Asahina 高砂蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:58)
=*Zygonyx iris*, Oguma, 1915:7. (*nec* Selys, 1869)
Zygonyx takasago Asahina, 1966:119.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Zyxomma petiolatum Rambur 纖腰蜻蜓 (Lieftinck et al., 1984:58)
Zyxomma petiolatum Rambur, 1842:30.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球群島、Seychelle Is., 印度、Mauritius Is., 新幾內亞、Micronesia.

BLATTOPTERA 蜚蠊目

Corydiidae 鱉蠊科

Eupolyphaga sinensis (Walker) 中華真鱉蠊 (Feng et Wu, 1992:39)
藥 用：
分 佈：江西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧；蒙古、蘇聯。

MANTODEA 螳螂目

(Yang et Wang, 1999, 1:74-106)

Amorphoscelidae 怪螳螂科

Amorphoscelis stellulata Yang 繁星怪螳 (Yang et Wang, 1999, 1:75)
Amorphoscelis stellulata Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:75-76.
捕 食 性。
分 佈：福建(莆田)。

Amorphoscelis phaesoma Yang 暗體怪螳 (Yang et Wang, 1999, 1:76)
捕 食 性。
分 佈：福建(龍巖)

Hymenopodidae 花螳科

Acromantis japonica Westwood (Yang et Wang, 1999, 1:79)
Acromantis japonica Westwood, 1889:
捕 食 性。
分 佈：福建、我國南方各省。

Anaxarcha acuta Beier 尖原螳 (Zheng, 1985:320)
Anaxarcha acuta Beier, 1963:
捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Anaxarcha atrispina Yang 黑刺原螳 (Yang et Wang, 1999, 1:79)

捕 食 性。

分 佈：福建(建甌)、廣西。

Anaxarcha hyalinus Zhang 淡色原螳螂 (Yang et Wang, 1999, 1:79; Zhang, 1988:103)

Anaxarcha hyalinus Zhang, 1988:103.

捕 食 性。

分 佈：福建(上杭)。

Anaxarcha sinensis Beier 中華原螳 (Yang et Wang, 1999, 1:78; Zheng, 1985:319)

Anaxarcha sinensis Beier, 1933.

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、四川。

Anaxarcha tianmushanensis Zheng 天目山原螳 (Zheng, 1985:319-320; Wu et Wu, 1995:54)

Anaxarcha tianmushanensis Zheng, 1985:319-320.

捕 食 性。

分 佈：浙江(天目山)。

Ceratomantis yunnanensis Zhang 雲南角胸螳螂 (Zhang, 1986:235)

Ceratomantis yunnanensis Zhang, 1986:235.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Creobroter apicalis (Sauss.) 明端眼斑螳 (Zheng, 1988:99)

捕 食 性。

分 佈：雲南(景東)。

Creobroter bugula Yang 濃裝眼斑螳 (Yang et Wang, 1999, 1:81)

Creobroter bugula Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:81.

捕 食 性。

分 佈：福建(建甌)、廣西。

Creobroter elegans (Westwood) 華麗弧紋螳 (Yang et Wang, 1999, 1:81)

Creobroter elegans (Westwood, 1832:)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山挂墩)、雲南；越南。

Creobroder gemmatus (Stoll) 麗眼斑螳 (Li et al.,:6; Yang et Wang, 1999, 1:80)

捕 食：多種昆蟲。

分 佈：福建、廣東、廣西。

Creobroter jiangxiensis Zheng 江西眼斑螳 (Zheng, 1988:99)

Creobroter jiangxiensis Zheng, 1988:99.

捕 食 性。

分 佈：江西(石城)。

Creobroter magniventris Yang 大肚眼斑螳 (Yang et Wang, 1999, 1:80)

Creobroter magniventris Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:80.

捕 食 性。

分 佈：福建(建甌)。

Creobroter nebulosus Zheng 雲眼斑螳 (Yang, 1997:99; Yang et Wang, 1999, 1:80; Zheng, 1988:97)

Creobroter nebulosus Zheng, 1988:97.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、雲南(西雙版納)、四川、湖北。

Creobroter urbanus Fabricius 艷眼斑花螳 (Wang, 1988:33; Wang et Zhang, 1992:43)

Creobroter urbanus Fabricius, 1775:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；南亞。

Creobroter sp. 眼斑螳螂 (He et al., 1991:71)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：雲南。

Creobroter sp. 眼斑螳 (Wu et Wu, 1995:54)

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hestiasula major Beier 大巨腿螳 (Yang et Wang, 1999, 1:84)

Hestiasula major Beier, 1929:

捕 食 性。

分 佈：福建；越南。

Hestiasula wuyishana Yang et Wang 武夷巨腿螳 (Yang et Wang, 1999, 1:85)

Hestiasula wuyishana Yang et Wang, 1999, 1:85-86.

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山三港)。

Hestiasula zhejiangensis Zhou et Shen 浙江巨腿螳 (Yang et Wang, 1999, 1:84)

Hestiasula zhejiangensis Zhou et Shen, 1992:

捕 食 性。

分 佈：福建、浙江(龍泉)。

Kishinouyeum cornutum Zhang 角胸屏頂螳 (Yang et Wang, 1999, 1:87)

Kishinouyeum cornutum Zheng, 1988:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山三港)。

Kishinouyeum hepaticum Zhang 棕褐屏頂螳 (Yang et Wang, 1999, 1:87)

Kishinouyeum hepaticum Zhang, 1988:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山三港)。

Kishinouyeum wuyiense Yang et Wang 武夷屏頂螳 (Yang et Wang, 1999, 1:88)

Kishinouyeum wuyiense Yang et Wang, 1999, 1:88.

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山三港)。

Odontomantis fujiana Yang 福建齒螳 (Yang et Wang, 1999, 1:82)

Odontomantis fujiana Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:82-83.

捕 食 性。

分 佈：福建(南平)。

Odontomantis longipennis Zheng 長翅齒螳 (Yang et Wang, 1999, 1:82)

Odontomantis longipennis Zheng, 1989:

捕 食 性。

分 佈：福建(南靖)。

Mantidae 螳螂科

(Zhou, 1994:304)

Amantis indica Giglio-Tos 印度圓螳 (Wang, 1988:34; Wang et Zhang, 1992:43)

捕 食：小昆蟲。

分 佈：湖南、廣東、西藏；南亞。

Hestiasula hoffmanni Tinkham 泉圓腿花螳 (Wang, 1988:33; Wang et Zhang, 1992:43; 1992:57)

Hestiasula hoffmanni Tinkham, 1937:

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、海南、雲南、西藏。

Hierodula (Rhombodera) latipronotum Zhang 寬胸廣腹螳螂 (Zhang, 1990:113)

Hierodula (*Rhombodera*) *latipronotum* Zhang, 1990:113.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Hierodula membranacea (Burmeister) 勇斧螳 (Wang, 1988:34; Wang et Zhang, 1992:42; Zhang, 1987[ed.]:13)

Hierodula membranacea (Burmeister, 1838:)
別 名：*八齒廣腹螳螂，膜翅斧螳*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、湖北、河南；印度、斯里蘭卡。

Hierodula patellifera (Serville) 廣腹螳螂 (ASZI, 1986, 1:26; Cao, 1986:182; Chen, 1996, 18(1):20; Chen et al., 1993; Ge et al., 1986:200; He et al., 1991:71; Hun., 1992:23; Li et al., 1990:4; Liu et al., 1999, 21(3):99; Shi, 1980[ed.]:122; Wang, 1988:34; Wang et Zhang, 1992:42; 1992:58; Wu et Wu, 1995:54; Wu et al., 1989:167-168; Xiao, 1985(2):28; Xie et al., 1999, 21(2):82; Yan et al., 1981(3):25; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yang et Wang, 1999, 1:96; Yunn., 1987:73; Zhang, 1987[ed.] :13; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
Hierodula patellifera (Serville, 1839:)
別 名：*廣斧螳，兩點廣腹螳螂*。
捕 食：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)
松蚜
桃蚜
稻蝨
葉蟬
螟蟲
黃刺蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)
棗尺蠖
楊舟蛾(幼蟲)
柳毒蛾
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Erthesina fullo (Thunberg) 麻皮蝽
Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林；日本、菲律賓、印尼。
天 敵：與中華大刀螳螂雷同。

Hierodula saussurei Kirby 索氏螳螂 (He et al., 1991:71; Zong et al., 1984:249)
別 名：*擬廣腹螳螂*。
捕 食：蛾類
分 佈：湖北、河南。

Hierodula unimaculata (Olivier) 單斑斧螳 (Yang, 1997:101)
Hierodula unimaculata (Olivier, 1792:)

捕 食 性。
分 佈：四川。

Hymenopus coronatoides Wang et al. 擬皇冠花螳 (Wang et al., 1994:79)
Hymenopus coronatoides Wang, et al., 1994:79.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Leptomantella punctifemura Yang 斑腿小絲螳 (Yang, 1997:102)
Leptomantella punctifemura Yang, (MS)
捕 食 性。
分 佈：福建、四川。

Leptomantella tokinae Hebard 虛線小絲螳 (Yang, 1997:102; Yang et Wang, 1999, 1:89)
Leptomantella tokinae Hebard, 1920:
捕 食 性。
分 佈：福建、四川；越南。

Leptomantella punctifemura Yang 斑腿小絲螳 (Yang et Wang, 1999, 1:89)
Leptomantella punctifemura Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:89-90.
捕 食 性。
分 佈：福建(三明)。

Leptomantis albella Burmeister 黑小絲螳 (Wang et Zhang, 1992:43)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、貴州、四川、湖北；印尼(爪哇)。

Mantis religiosa (Linnaeus) 薄翅螳螂 (ASZI, 1986, 1:26; Ge et al., 1986:200; He et al., 1991:71; Hun., 1992:24; Li et al., 1990:6; Shi, 1980[ed.]:122; Wang et Zhang, 1992:42; Xiao, 1985(2):28; Xie et al., 1999, 21(2):82; Yan et al., 1981(3):25; Yang, 1997:100; Yang et Wang, 1999, 1:93; Yunn., 1987:74; Zhang, 1987[ed.] :13)
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758:)
別 名：*歐洲螳螂，薄翅螳*。
捕 食：稻蝗
蚜蟲
稻蝨
葉蟬
螟蟲
粘蟲(幼蟲)
造橋蟲(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
若蟲和成蟲捕食同翅目、鱗翅目、膜翅目等幼齡幼蟲。
分 佈：福建、我國南北各省區；歐洲。

Montamantis meihuashana Yang 梅花山螳 (Yang et Wang, 1999, 1:97)

Montamantis meihuashana Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:97-98.

捕 食 性。

分 佈：福建(上杭梅花山)。

Sceptuchus sinecus Yang 華柔螳 (Yang, 1997:102; Yang et Wang, 1999, 1:91))

Sceptuchus sinecus Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:91-92.

捕 食 性。

分 佈：福建、湖北。

Sinomantis denticulate Beier 齒華螳 (Yang et Wang, 1999, 1:91)

Sinomantis denticulate Beier, 1933:

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東。

Spilomantis occipitalis (Westwood) 頂瑕螳 (Yang et Wang, 1999, 1:90)

Spilomantis occipitalis (Westwood)

捕 食 性。

分 佈：福建；越南。

Statilia flavobrunnea Zhang et Li 黃褐靜螳 (Yang et Wang, 1999, 1:94)

Statilia flavobrunnea Zhang et Li, 1983:

捕 食 性。

分 佈：福建、四川、浙江。

Statilia maculata Thunberg et Lundahl 綠斑螳 (Wang et Zhang, 1992:43; Yang et Wang, 1999, 1:94)

Statilia maculata Thunberg et Lundahl, 1784:

捕 食：微小昆蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東；泰國。

Statilia nemoralis (Saussure) 綠靜螳 (Yang et Wang, 1999, 1:94)

Statilia nemoralis (Saussure, 1870:)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Statilia occipivittata Yang 頂帶靜螳 (Yang, 1997:101)

Statilia occipivittata Yang, 1997:101-102.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Statilia parva Yang 小靜螳 (Yang et Wang, 1999, 1:94)

Statilia parva Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:94-95.

捕 食 性。
分 佈：福建(南平)。

Tenodera acuticauda Yang 尖尾刀螳 (Yang,1997:100)
Tenodera acuticauda Yang, 1997:100-101.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Tenodera angustipennis Saussure 北大刀螳 (Wang, 1988:35; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yang, 1997:101; Yang et Wang, 1999, 1L95)
Tenodera angustipennis Saussure, 1842:
別 名：*窄大刀螂，亮翅刀螳*。
捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、東南亞、美國。

Tenodera aridifolia (Stoll) 大刀螳螂 (Chen, 1996, 18(1):20; Chen et al., 1993:123; He et al., 1991:71; Hun., 1992:23; Li et al., 1990:5; Liu et al., 1999, 21(3):99; Shi, 1980[ed.]:122; Tao et al., 1991:167-170; Tian et al., 1993, 15(4):156; Wang, 1988:34; Wang et Zhang, 1992:42; Wu et Wu, 1995:55; Xiao, 1985(2):28; Yan et al., 1981(3):24; Yang et Wang, 1999, 1:96; Yunn., 1987:73; Zhang, 1987[ed.]:13)
Tenodera aridifolia (Stoll)
Paradenodera aridifolia
別 名：*南方大刀螳螂，南大刀螳，枯葉刀螳*。
捕 食：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)
蟋蟀
金龜
螟蟲
松毛蟲
棘尺蠖
桃小
舟蛾
Clostera anastomosis Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、蛹)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
葉蜂等幼蟲
直翅目
雙翅目昆蟲
森林中重要捕食天敵。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅、遼寧、黑龍江(海林)；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼。

Tenodera attenuata (Stoll) 瘦刀螳 (Wang, 1988:34)
捕 食 性。

分 佈：廣東、西藏；爪哇。

Tenodera brevicollis Beler 短胸刀螳 (Yang, 1997:101; Yang et Wang, 1999, 1:95)

Tenodera brevicollis Beler, 1933:

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、海南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北、遼寧；東南亞。

Tenodera fasciata Olivier 瘦刀螳 (Wang et Zhang, 1992:43)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、湖北；印尼(爪哇)。

Tenodera sinensis Saussure 中華螳螂 (ASZI, 1986, 1:25; Chen, 1996, 18(1):20; Chen et al., 1993:122: Ge et al., 1986:200; He et al., 1991:71; Hun., 1992:23; Li et al., 1990:4; Tang et al., 1995(4):168; Wang, 1988:35; Wang et Zhang, 1992:42; 1992:57; Wu et Wu, 1995:55; Wu et al., 1989:166; Xiao, 1985(2):28; Xie et al., 1999, 21(2):82; Xu, 1985:25; Yan et al., 1981(3):22; Yang et Wang, 1999, 1:96; Yie et al., 1966:119-128; Yunn., 1987:72; Zhang, 1987[ed.] :13;)

Tenodera sinensis Saussure, 1842:

Paradenodera sinensis (Saussure)

別 名：*北方大刀螳螂，中華大刀螳螂，中華刀螳，中華綠螳螂* 。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

蚜蟲

Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧

松毛蟲

粘蟲(幼蟲)

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

杉天牛(成蟲、幼蟲)

金龜

棉蟲

同翅目、鱗翅目、鞘翅目、膜翅目等幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；日本、越南、亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、美國(引進)、美洲，世界廣布。

天 敵：*Podagrion chinensis* Ashmead 中華螳波蜂

Podagrion philippinense Habu 廣腹螳波蜂

Thaumaglossa ovivorus Matsumura 螵蛸皮囊

蜘蛛、鳥類、樹蛙、樹蜥、白僵菌等。

Eremiaphilidae 埃螳科

Humbertiella nada Zhang 那大石紋螳螂 (Zhang, 1986:231)

Humbertiella nada Zhang, 1986:231.

捕 食 性。
分 佈：海南。

Humbertiella ocularis (Saussure) (Yang et Wang, 1999, 1:99)
Humbertiella ocularis (Saussure)
捕 食 性。
分 佈：海南。

Hembertiella yunaneensis Wang et Bi 雲南石紋螳 (Yang et Wang, 1999, 1:99)
Hembertiella yunaneensis Wang et Bi, 1995:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Mintis septemspina Yang 七刺閩螳 (Yang et Wang, 1999, 1:99)
Mintis septemspina Yang, *in* Yang et Wang, 1999, 1:99.
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Thepompa ophthalmica (Olivier) 眼斑廣緣螳 (Yang et Wang, 1999, 1:99)
Thepompa ophthalmica (Olivier, 1792:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Vatidae 長頸螳科

Kishinouyeum cornutus Zhang 角胸屏頂螳螂 (Zhang, 1988:303)
Kishinouyeum cornutus Zhang, 1988:303.
捕 食 性。
分 佈：福建(三港)。

Kishinouyeum hepaticus Zhang 棕褐屏頂螳螂 (Zhang, 1988:302)
Kishinouyeum hepaticus Zhang, 1988:302.
捕 食 性。
分 佈：福建(三港)。

Kishinouyeum jianfenglingensis Hua 尖峰屏頂螳螂 (Hua, 1984:29)
Kishinouyeum jianfenglingensis Hua, 1984:29.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Kishinouyeum sinensis (Ouchi) 天目屏頂螳螂 (Zhang, 1988:301; Wu et Wu, 1995:54)
別 名：*中華屏頂螳*。
捕 食 性。

分 佈：福建、浙江。

Leptomantis albella (Burmeister) 白小絲螳 (Wang, 1988:33)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、西藏、四川；馬來西亞、爪哇。

Leptomantis tonkinae hainanae Tinkham 海南小絲螳螂 (Li et al., 1990:5)
捕 食：多種昆蟲
分 佈：海南、廣西。

Odontomantis brachyptera Zheng 短翅大齒螳 (Zheng, 1989:186)
Odontomantis brachyptera Zheng, 1989:186-187.
捕 食 性。
分 佈：四川(南坪)。

Odontomantis foveafrons Zhang 凹額大齒螳 (Zhang, 1985:330)
Odontomantis foveafrons Zhang, 1985:330.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Odontomantis javana hainan Tinkham 海南大齒螳 (Zhang, 1985:330)
捕 食 性。
分 佈：海南。

Odontomantis laticollis Beie 四川大齒螳 (Zhang, 1985:330)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Odontomantis longipennis Zheng 長翅大齒螳 (Zheng, 1989:187)
Odontomantis longipennis Zheng, 1989:187-188.
捕 食 性。
分 佈：福建(和溪)。

Odontomantis monticola Beir 雲南大齒螳 (Zhang, 1985:330)
捕 食 性。
分 佈：雲南(大理)。

Odontomantis nigrimarginalis Zhang 黑緣大齒螳 (Zhang, 1985:330)
Odontomantis nigrimarginalis Zhang, 1985:330.
捕 食 性。
分 佈：西藏(察隅)。

Odontomantis sinensis (Giglio-Tos) 中華大齒螳 (Zhang, 1985:330; Zhang, 1987[ed.] :13)

Euantissa sinensis Giglio-Tos, 1915:
捕 食 性。
分 佈：廣東、江西、陝西。

Odontomantis xizangensis Zheng 西藏大齒螳 (Zhen, 1989:188)
Odontomantis xizangensis Zheng, 1989:188.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Palaeothespis pallidus Zhang 淡色古細足螳 (Zhang, 1987:239)
Palaeothespis pallidus Zhang, 1987:239.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Paratenodera angustipennis Saussure 窄小刀螳螂 (He et al., 1991:71; Xiao, 1985(2):28; Yan et al., 1981(3):25; Zhang, 1987[ed.] :13)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、美國。

Rhombodem valida (Burmeister) 圓胸螳螂 (Li et al., 1990:6)
捕 食：多種昆蟲。
分 佈：廣東、廣西。

Sinomiopteryx brevifrons Wang et Bi 短額華小翅螳 (Wang et Bi, 1991:125)
Sinomiopteryx brevifrons Wang et Bi, 1991:125.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Sinomiopteryx brevifrons Wang ett Bi 短額華小翅螳 (Wu et Wu, 1995:55)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Sinomiopteryx grahami Timkham 格氏華小翅螳 (Wang et Bi, 1991:125)
捕 食 性。
分 佈：四川、江西。

Sinomiopteryx guangxiensis Wang et Bi 廣西華小翅螳 (Wang et Bi, 1991:126)
Sinomiopteryx guangxiensis Wang et Bi, 1991:126.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Spilomantis occipitalis (Westwood) 毛紅翅螳 (Chen, 1996, 18(1):29)

捕 食 性。
分 佈：廣東。

Statilis chayuensis Zhang et Li 察隅小刀螳 (Zhang et Li, 1983:252)
Statilis chayuensis Zhang et Li, 1983:252.
捕 食 性。
分 佈：西藏(察隅)。

Statilis flavobrunnea Zhang et Li 黃褐小刀螳 (Zhang et Li, 1983:252)
Statilis flavobrunnea Zhang et Li, 1983:252.
捕 食 性。
分 佈：福建(南平)。

Statilis maculata Thunberg 小刀螳螂 (ASZI,1986, 1:26; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:71; Hun., 1992:24; Wang. 1988:34; Xiao, 1985(2):28; Yan et al., 1981(3):25; Yunn., 1987:74; Zhang et Li, 1983:251)
別 名：*斑小刀螳螂，污斑螳，綠斑螳*。
捕 食：蚜蟲
葉蟬
飛蝨
鱗翅目幼齡幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、河南、山東、北京；日本、越南、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度。

Statilis nemoralis (Saussure) 棕污斑螳螂 (Li et al., 1990:4; Zhang et Li, 1983:251)
捕 食：多種昆蟲。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、四川、浙江、甘肅。

Statilis viridibrunnea Zhang et Li 綠褐小刀螳 (Zhang et Li, 1983:252)
Statilis viridibrunnea Zhang et Li, 1983:252.
捕 食 性。
分 佈：江蘇(南京)。

Theopompa ophthalmica Olivier 短胸螳螂 (Li et al., 1990:5)
捕 食：多種昆蟲。
分 佈：廣西。

ORTHOPTERA 直翅目

Gryilidae 蟋蟀科

Gampsocleis grafiosa Brunner Von Wattenwvl 蟈蟈 (Zhang, 1992:354; 1993:162-166)
捕 食：雜食性。獵食昆蟲達 55 科 113 種(Zhang, 1993:162-166)
車蝗、尖頭蚱蜢、油葫蘆、飛蝗、負蝗等

兩點廣腹螳螂、小刀螳螂等
麻皮蝽、菜蝽等
大綠葉蟬、蟬類等
黃粉甲、瓢蟲、金龜等
蠅類、大蚊等
玉米螟、柳天蛾、甘藷天蛾、粘蟲、松毛蟲、舞毒蛾、葛藤舟蛾、蘋掌舟蛾、蝶類、綠尾大蠶蛾等幼蟲、成蟲。
取食禾本科、十字花科、鼠李科、百合科、菊科、傘形科、黎科等
分 佈：河北。
天 敵：螳螂、步甲、蜘蛛、紅色蟎(寄生翅下及口器、頸部)、白僵菌。

Oecanthus indicus Saussure 樹蟋 (Zhang, 1987[ed.] :24)
寄 主：捕食小蟲。
分 佈：江西。

Tettigoniidae 螽蟴科

Anonconotus sp. 啞聒聒 (Tsai et al., 1979:49)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵、幼蟲、蛹)。
分 佈：安徽。

Atlanticus brunner (Pyln.) 布氏西洋螽 (Yan et al., 1993, 9(2):50)
捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。
分 佈：遼寧。

Atlanticus jeholensis Mari 土褐螽蟴 (Hun., 1992:84; Xiao , 1992:107)
寄 主：
分 佈：

Atlanticus kiangus Rammer 江蘇側隆螽蟴 (Wu et al, 1989:175-176; Xiao , 1992:108)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：江蘇、安徽。

Conocephalus divergentus (Mats. et Shir.) 鈎草螽 (Wang et Wu, 1988:159)
捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(卵)。
分 佈：福建(福州)。

Conocephalus gladiatus Redtenbacher 長劍角螽 (He et al., 1991:72; Zhao et al., 1997:192)
捕 食：葉蟬
飛蝨
分 佈：福建、貴州、陝西、東北。

Conocephalus maculatus (LeGuillon) 斑翅螽蟴 (Hun., 1992:81; Xiao , 1992:110; Zhang, 1987[ed.] :22)

寄 主：

分 佈：

Conocephalus melas de Haan 鳴角螽 (He et al., 1991:72)

捕 食：稻蝨。

分 佈：貴州。

Conocephalus sp. (? **longipennis** de Haan) 黑背角螽 (Deng, 1985(4):8-11; He et al., 1991:72; Li et al.,, 1990:8)

別 名：*黑背小綠螽*。

捕 食：稻蝗(低齡若蟲)

葉蟬

飛蝨

Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟(卵塊)

白螟(卵塊)

Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾(卵)。

分 佈：廣西。

Conocephalus spp. 草螽 (Tsai et al., 1979:49)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲(卵、幼蟲、蛹)。

分 佈：安徽、山東。

Ducetia japonica Thunberg 黑條螽蟴 (Xiao, 1992:112)

寄 主：

分 佈：

Euconocephalus nasutus Thunberg 錐頭螽 (Zhang, 1987[ed.] :22)

寄 主：獵食其他小蟲，甘蔗、小麥、大豆。

分 佈：江西。

Euconocephalus thunbergi (Stål) 瑟氏草螽 (Wang et Wu, 1988:159)

捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟(卵)。

分 佈：福建(福州)。

Euconocephalus varius (Walker) 圓鈍頭螽 (Zhang, 1987[ed.] :22)

寄 主：捕食小蟲，麥穗、竹。

分 佈：江西。

Gampsocleis sedakovii obscura Walker 土聒聒 (Tsai et al., 1979:49)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲(卵、幼蟲、蛹)。

分 佈：安徽、山東。

Gampsocleis ussuriensis Adelung 烏蘇里鳴螽 (ASZI, 1986, 1:54; Yan et al., 1993, 9(2):50)

捕 食：蝗蟲(草原上)

Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾

爲害瓜類、桃。

分 佈：陝西、內蒙古、烏蘇里江流域；蘇聯。

Hexacentrus japonicus Karny 日本六刺螽 (He et al., 1991:72)

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

紅腹燈蛾(成蟲)。

分 佈：湖南。

Hexacentrus unicolor Serville 單色六刺螽 (He et al., 1991:72; Zhang, 1987[ed.] :22))

別 名：*似織六刺螽，蠟螽*。

捕 食：飛蝨、小蟲，玉米。

分 佈：江西、貴州。

Homorocoryphus fuscipes 螽蟴 (Zhang, 1985:51)

捕 食：*Eurostus validus* Dallas 碩蝽(卵)。

分 佈：江西(南昌)。

Homorocoryphus lineosus Walker 尖頭草螽 (He et al., 1991:72)

捕 食：飛蝨、葉蟬。

分 佈：臺灣、貴州、陝西。

Metrioptera brachyptera Adl. 短翅迷螽 (Yan et al., 1993, 9(2):50)

捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。

分 佈：遼寧。

Phaneroptera falcata Poda 露螽 (He et al., 1991:72)

捕 食：葉蟬

分 佈：臺灣、陝西。

Sympaestria truncata-lobata 游伴樹螽 (Wu et al., 1989:175-176)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

多種鱗翅目卵及幼蟲。

分 佈：廣西。

Tettigonia viridissima (Linnaeus) 綠螽蟴 (Hun., 1992:85; Xiao, 1992:113)

寄 主：

分 佈：

DERMAPTERA 革翅目

Pygidicranidae 筒螋科

Challia fletcheri Burr. 福氏大尾螋 (Zhou et Zhang, 1995:79)
Challia fletcheri Burr., 1904:
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、海南、廣西、浙江；朝鮮。

Diplatyidae 細腰螋科(絲尾螋科)

Diplatys denticulatus Hincks 鋸絲尾螋 (Ma et Chen, 1992:98)
Diplatys denticulatus Hincks, 1957:
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

Diplatys foreipatus Ma et Chen 鉗絲尾螋 (Ma et Chen, 1997:172)
Diplatys foreipatus Ma et Chen, 1991:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北。

Diplatys reconditus Hincks 隱居絲尾螋 (Zhou et Zhang, 1995:79)
Diplatys reconditus Hincks, 1955:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、浙江、江蘇。

Diplatys siva Burr 歇絲尾螋 (Ma et Chen, 1992:98)
Diplatys siva Burr, 1904:
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度、錫金。

Haplodiplatys fengyangensis (Zhou) 鳳陽絲尾螋 (Zhou et Zhang, 1995:79)
Haplodiplatys fengyangensis (Zhou, 1985:)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Haplodiplatys siva Burr 歇單突絲尾螋 (Ma et Chen, 1997:172; Zhang et al., 1992:117)
Haplodiplatys siva Burr, 1804:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、湖北；緬甸、印度、錫金。

Psalididae 肥螋科 (Anisolabididae)

Anisolabis (Euborellia) annulipes (Lucas) 小須蠼螋 (He et al., 1991:73; Ma et Chen, 1992:99; Zhang et al., 1992:117)

Anisolabis (*Euborellia*) *annulipes* (Lucas, 1847:)
別 名：*環紋肥螋*。
捕 食：螟蛾、蛾類。
分 佈：臺灣、貴州、雲南、河南；印度。

Anisolabis (Goonolabis) burri Zacher 布肥螋 (Zhang et Yang, 1993:252; Zhang et al., 1992:117)
捕 食 性。
分 佈：貴州；印度、非洲。

Anisolabis cheni Bey-Bienko 觸黃肥螋 (Ma et Chen, 1992:99)
Anisolabis cheni Bey-Bienko, 1959:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anisolabis cavalerieri Borelli 卡肥螋 (Ma et Chen, 1992:98)
Anisolabis cavalerieri Borelli, 1921:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川、甘肅；菲律賓、越南、緬甸、錫金、非洲、澳洲、巴西。

Anisolabis (s. str.) **maritima** Gene 砂地蠼螋 (He et al., 1991:73; Ma et Chen, 1997:175; Zhang et al., 1992:117; Zhu, 1994, 16(1):28-35)
Anisolabis maritima Gene, 1832:
別 名：*海肥螋*。
捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、湖北、甘肅；印度、尼泊爾。

Anisolibis (Euborellia) stali (Dohrn) 袋肥螋 (Zhang et Yang, 1993:252; Zhang et al., 1992:117)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、海南、廣西、貴州、江蘇；馬來西亞、印度。

Anisolabis undata Bey-Bienko 曲肥螋 (Ma et Chen, 1992:99)
Anisolabis undata Bey-Bienko, 1959:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anisolabis sp. 蠼螋 (Gu, 1988:174)
捕 食：寄居藥材：檳榔、棗仁，捕食害蟲幼蟲、蛹
分 佈：廣東。

Euborellia (s. str.) **annulata** (Fabricius) 袋小肥螋 (Ma et Chen, 1997:174)
Euborellia annulata (Fabricius, 1793:)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、海南、廣西、貴州、湖北；馬來西亞、印度。

Euborellia (s. str.) **annulipes** (Lucas) 環紋小肥螋 (Ma et Chen, 1997:175)

Euborellia annulipes (Lucas, 1847:)

捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南、四川、湖北；世界廣布。

Euborellia puncta Borelli 斑紋肥螋 (Zhou et Zhang, 1995:79)

Euborellia puncta Borelli, 1927:

捕 食 性。

分 佈：廣東、浙江、江蘇。

Euborellia plebeja (Dohrn) 黃足蠼螋 (He et al., 1991:73; Zhang, 1987[ed.] :36; Zhou et Zhang, 1995:79; Zong et al., 1984:249)

Euborellia plebeja Dohrn, 1863:

=*Euborellia pallipes* Shiraki

別 名：*灰足蠼螋，普通肥螋*。

寄 主：*Mythimns separata* (Walker) 粘蟲

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

Nilaparvata lugens (Stål) 稻飛蝨(短翅型高齡蟲)

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(若蟲)

中華稻蝗(高齡若蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陜西；日本、菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Gonolabis marginalis (Dohrn) 緣瘤螋 (Ma et Chen, 1997:175; Zhou et Zhang, 1995:80)

Gonolabis marginalis (Dohrn, 1864:)

別 名：*緣殖肥螋*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本、越南、爪哇。

Isolaboides recurvata Yang et Zhang 臀凹肥螋 (Zhang et Yang, 1993:252)

寄 主：

分 佈：貴州。

Platylabia major Dohrn 扁肥螋 (Zhang et Yang, 1993:253)

寄 主：

分 佈：海南、雲南、貴州；菲律賓、緬甸、印度、錫金。

Labiduridae 蠼螋科

Apachyus feae Bormans 黃扁螋 (Chen et Ma, 1988:55; Ma et Chen, 1992:99)

Apachyus feae Bormans, 1894:

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、雲南、西藏、四川；越南、緬甸、印度、錫金、不丹。

Forcipula clavata Liu 弓鋏蠼螋 (Zhang et Yang, 1993:252; Zhou et Zhang, 1995:80)

Forcipula clavata Liu, 1946:

別 名：*迪氏蠼螋*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、四川、浙江。

Forcipula decolyi Bormans 素鉗螋 (Chen et Ma, 1988:55; Ma et Chen, 1992:99; 1997:174; Zhang et al., 1992:117)

Forcipula decoly Bormans, 1900:

捕 食 性。

分 佈：福建、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；越南、印度、錫金、尼泊爾、新幾內亞。

Forcipula trispinosa (Dohrn) 三刺鉗螋 (Ma et Chen, 1992:99)

Forcipula trispinosa (Dohrn, 1863:)

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸、印度。

Labia minor (Linnaeus) 小蠼螋 (Zhou et Zhang, 1995:80)

Labia minor (Linnaeus, 1758:)

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇；世界廣布。

Labidura japonica de Haan 日本蠼螋 (Zhang, 1987[ed.] :36; Zhang et Cao, 1984:108-109)

捕 食：棉花害蟲。

分 佈：江西。

Labidura riparia (Pallas) 溪岸蠼螋 (He et al., 1991:73; Hun., 1992:89; Ma et Chen, 1992:99; 1997:173; Zhang et Li, 1982:228; Zhang et Yang, 1993:252; Zhou et Zhang, 1995:80)

Labidura riparia (Pallas, 1775:)

別 名：*日本蠼螋，岸棲蠼螋，蠼螋*。

捕 食：鱗翅目(幼蟲)

蠅類

蚜蟲等

Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻。

分 佈：福建、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古；日本、菲律賓、越南、緬甸、印度、錫金、非洲北部、法國、蘇聯、美國、南美等，世界廣布。

Labidura sp. 黃褐蠼螋 (He et al., 1991:73; Hu, 1985:110-112; Zong et al., 1984:249)

捕 食：*Gryllotalpa africana* 非洲螻蛄

Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：江蘇、湖北。

Nala lividipes (Dufour) 青黑蠼螋 (Zhou et Zhang, 1995:80)

Nala lividipes (Dufour, 1820:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、雲南、浙江、山東；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲南部、澳洲。

Nala nepalensis (Burr) 尼納螋 (Ma et Chen, 1992:99; 1997:173; Zhang et Yang, 1993:252; Zhang et al, 1992:117; Zhou et Zhang, 1995:80)

Nala nepalensis (Burr, 1907:)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、浙江、湖北；菲律賓、馬來西亞、印度、尼泊爾、阿富汗。

Psili sp. 蠼螋 (Gao, 1996, 12(30:139)

捕 食：*Ephestia elutella* (Hübner) 煙粉斑螟。

分 佈：貴州。

Labiidae 姬螋科

Chaetospania silvestrii Borelli 莽光螋 (Chen et Ma, 1988:56)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏；越南。

Nesogastridae 錘角螋科

Nesogaster nigritus Shiraki 黑蠼螋 (He et al., 1991:73)

捕 食：螟蛾(幼蟲)。

分 佈：河南、陝西。

Chelisochidae 墊跗螋科

Proreus simulans Stål 草葉蠼螋 (He et al., 1991:73; Wang et al., 1993, 15(1):14-17; Wang et al., 1994, 10(2)52-54)

別 名：*擬墊跗螋*。

捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟

Melanaphis sp. 荻色蚜

薊馬

蟎類。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南、江蘇。

Pygidicranidae 大尾螋科

Diplatys fengyangensis Zhou 鳳陽絲尾螋 (Zhou, 1985:49)

Diplatys fenpyangensis (!) Zhou, 1985:39.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Diplatys flavicolis Shiraki 細腰絲尾螋 (Chen et Ma, 1988:56)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Echinosoma sumatranum (de Haan) 南棘螋 (Chen et Ma, 1988:56; Ma et Chen, 1992:98)

Echinosoma sumatranum (de Haan, 1842:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南、西藏；越南、緬甸、印度、錫金、不丹、巴布亞新幾內亞。

Pye sauteri Burr 細胸大尾螋 (Chen et Ma, 1988:56)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Anechuridae 張鋏螋科

Anechura filchneri (Burr) 蕃張鋏螋 (Ma et Chen, 1992:199)

Anechura filchneri (Burr, 1907:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、江蘇、甘肅；印度。

Anechura harmandi f. lewisi (Burr) 瘤蠼螋 (He et al., 1991:72)

捕 食：螟蛾(幼蟲)。

分 佈：陝西。

Anechura modesta Bey-Biencko 寧張鋏螋 (Ma et Chen, 1992:100)

Anechura modesta Bey-Biencko, 1959:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Anechura sven-hedini Bey-Bienko 雯張鋏螋 (Ma et Chen, 1992:100)

Anechura sven-hedini Bey-Bienko, 1934:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、江蘇。

Anechura torquata Burr 環張鋏螋 (Chen et Ma, 1988:58)
捕食性。
分佈：西藏、四川；越南。

Forficulidae 球螋科

Allodablia coriacea signata Bey-Bienko 革異螋 (Chen et Ma, 1988:57)
捕食性。
分佈：雲南、西藏、四川。

Allodablia macropyga (Westwood) 巨臀異球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:100; Zhang et Yang, 1993:253; Zhang et al., 1992:114)
Allodablia macropyga (Westwood, 1839:)
捕食性。
分佈：貴州、雲南、西藏、四川、湖北；越南、印度。

Allodahlia scabriuscula Serville 異球螋 (Chen et Ma, 1988:56; Ma et Chen, 1992:100; 1997:177; Zhang et Yang, 1993:253; Zhang et al., 1992:114)
Allodahlia scabriuscula Serville, 1839:
捕食性。
分佈：臺灣、福建、湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、河北、甘肅；菲律賓、越南、緬甸、印度、尼泊爾、錫金、不丹、印尼。

Anechura (s. str.) **bipunctata** (Fabricius) (Zhang et Yang, 1994:331)
捕食性。
分佈：中國。

Anechura (s. str.) **crinitata** (Shiraki) (Zhang et Yang, 1994:331)
捕食性。
分佈：臺灣。

Anechura (s. str.) **filchneri** (Burr) (Zhang et Yang, 1994:331)
捕食性。
分佈：中國。

Anechura (**Odeontopsalis**) **forficaliformis** Sem. et Bey-Bienko (Zhang et Yang, 1994:331)
捕食性。
分佈：中國。

Anechura (s. str.) **huangi** Zhang et Yang 黃氏張球螋 (Zhang et Yang, 1994:331)
Anechura (s. str.) *huangi* Zhang et Yang, 1994:332.
捕食性。
分佈：四川。

Anechura (Odeontopsalis) japonica (Bormans) 日本張鋏螋 (Ma et Chen, 1997:177; Zhang et Yang, 1993:253; 1994:331; Zhang et al., 1992:114; Zhou et Zhang, 1995:80)

Anechura japonica (Bormans, 1880:)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、吉林；朝鮮、日本、蘇聯。

Anechura (Odeontopsalis) modesta Bey-Bienko (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Anechura (Odeontopsalis) potenini Bey-Bienko (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Anechura (s. str.) **primaris** Bey-Bienko (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Anechura (Odeontopsalis) rubicapitis Liu (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Aechura sakaii Zhou 清六張球螋 (Zhou et Zhang, 1995:80)

Aechura sakaii Zhou, 1995:80-81.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Anechura (s. str.) **senator** Steinmann (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Anechura (s. str.) **seven hedini** Bey-Bienko (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Anechura (s. str.) **torquata** Burr 環張鋏螋 (Zhang et Yang, 1993:253; 1994:331; Zhang et al., 1992:114)

捕 食 性。

分 佈：貴州、西藏、四川；越南。

Anechura (s. str.) **zubovskii** Semenov (Zhang et Yang, 1994:331)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Cosmiella subcornuta (Yang et Zhang) 擬角球螋 (Zhang et Yang, 1993:254)

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Eparchus insignis (Haan) 慈球螋 (Zhang et Yang, 1993:254)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州；馬來西亞、緬甸、印度、爪哇。

Eudohrnia hirsuta Zhang, Ma et Chen 多毛垂緣球螋 (Ma et Chen, 1997:176)

Eudohrnia hirsuta Zhang, Ma et Chen, 1992:116-117.

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、四川、浙江、湖北。

Eudohrnia metallica (Dohrn) 垂緣球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:102; 1997:176; Zhang et Yang, 1993:254; Zhang et al., 1992:116)

Forficula metallica Dohrn, 1865:90.

=*Sondax pubescence* Liu, 1946:15.

=*Timomenus zeae* Liu, 1946:16.

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；越南、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

Eumegalura mandarina Bey-Bienko 實鋏螋 (Ma et Chen, 1992:100)

Eumegalura mandarina Bey-Bienko, 1934:

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Eutimomenus paradoxa Bey-Bienko 脊角敬蛺螋 (Zhang et al., 1992:115)

捕 食 性。

分 佈：廣西、四川；越南。

Forficula aeris Burr 艾球螋 (Ma et Chen, 1992:101; Zhang et Yang, 1993:253)

Forficula aeris Burr, 1905:

捕 食 性。

分 佈：貴州、雲南、四川；緬甸、印度、尼泊爾。

Forficula ambigua Burr 混球螋 (Zhou et Zhang, 1995:82)

Forficula ambigua Burr, 1904:

捕 食 性。

分 佈：浙江、國內廣布；越南、印度。

Forficula berezovskyi Bey-Bienko 貝球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:100; 1997:180)

Forficula berezovskyi Bey-Bienko, 1934:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、湖北；印度、尼泊爾。

Forficula bimaculata Zhou 雙斑球螋 (Zhou et Zhang, 1995:81)

Forficula bimaculata Zhou, 1995:81.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Forficula carinata Zhang et Yang 脊鋏蛷螋 (Zhang et al., 1992:115)

捕 食 性。

分 佈：湖南、甘肅。

Forficula curvivesica Ma et Chen 曲囊球螋 (Ma et Chen, 1997:180)

Forficula curvivesica Ma et Chen, 1992:

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川。

Forficula davidi Burr 達球螋 (Ma et Chen, 1992:101; Zhang et Yang, 1993:254; Zhou et Zhang, 1995:81)

Forficula davidi Burr, 1905:

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏。

Forficula externa Bey-Bienko 僑球螋 (Ma et Chen, 1992:101; Zhang et Yang, 1993:254)

捕 食 性。

分 佈：貴州、雲南；印度、錫金。

Forficula guishouensis Yang et Zhang 貴州球螋 (Zhang et Yang, 1993:253)

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Forficula longidilatata Zhang et Yang 長擴鋏蛷螋 (Zhang et al., 1992:115)

捕 食 性。

分 佈：廣西、湖北。

Forficula kinfu-montis Liu 大扁鋏球螋 (Zhang et Yang, 1993:253; Zhang et al., 1992:115)

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川。

Forficula longidilatata Zhang et Yang 長擴鋏球螋 (Zhang et Yang, 1993:253)

捕 食 性。

分 佈：廣西、貴州。

Forficula mandarina Borelli 中國球螋 (Ma et Chen, 1997:182)

Forficula mandarina Borelli, 1915:

捕 食 性。

分 佈：福建、四川。

Forficula mikado Burr 齒球螋 (Ma et Chen, 1997:182)

Forficula mikado Burr, 1904:

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Forficula ornata Bormans 飾球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:101)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、西北、越南、緬甸、印度。

Forficula pilifera Yang et Zhang 披毛球螋 (Zhou et Zhang, 1995:81; Zhang et al., 1992:114)

Forficula pilifera Yang et Zhang, 1988:

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、浙江。

Forficula schlagintwiti (Burr) 施球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:101)

Forficula schlagintwiti (Burr, 1904:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川；緬甸。

Forticula scudderi de Bonmans 櫟黃蠼螋 (He et al., 1991:73)

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

蛾類幼蟲。

分 佈：陝西。

Forficula sinica Bey-Bienko 中華蠼螋 (Ma et Chen, 1992:101; 1997:180; Zhang et Yang, 1993:253; Zhou et Zhang, 1995:81; Zhang et al., 1992:115)

Forficula sinica Bey-Bienko, 1934:

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北。

Forficula splendida Bey-Bienko 輝球螋 (Ma et Chen, 1992:101; 1997:182)

Forficula splendida Bey-Bienko, 1933:

捕 食 性。

分 佈：雲南、江蘇、湖北。

Forficula subauricularia Bey-Bienko 擬歐洲球螋 (Zhang et Yang, 1993:253)

捕 食 性。
分 佈：貴州、四川。

Forticula uvarovi Semenov et Bey-Bienko 烏球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:102)
Forticula uvarovi Semenov et Bey-Bienko, 1953:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Forticula vicaria Semenov 迭球螋 (Chen et Ma, 1988:57; Ma et Chen, 1992:102; 1997:181)
Forticula vicaria Semenov, 1902:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、江蘇、湖北、西北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、西伯利亞。

Guanchia bicarinata Hincks 雙龍穢螋 (Ma et Chen, 1992:100)
Guanchia bicarinata Hincks, 1947:
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸。

Obelura sp. 劍球螋 (Zhang et Yang, 1993:254)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Opisthocosmia ramose Zhang et al. 分支長蠼螋 (Zhang et al., 1992:115)
Opisthocosmia ramose Zhang et al., 1992:115-116.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Oreasiobia chinensis Steinmann 中華山球螋 (Ma et Chen, 1997:179; Zhang et Yang, 1993:253; Zhang et al., 1992:114)
Oreasiobia chinensis Steinmann, 1974:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、湖北、陝西。

Oreasiobia forcepina Yang et Zhang 近鋏山球螋 (Zhang et Yang, 1993:253)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Oreasiobia stoliczkae (Burr) 翘山球螋 (Ma et Chen, 1997:179)
Oreasiobia stoliczkae (Burr, 1911:)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北；印度、不丹、尼泊爾。

Paratimomenus flavocapitatus (Shraki) 黃頭球螋 (Zhou et Zhang, 1995:82)

Paratimomenus flavocapitatus (Shraki, 1906:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、西藏、浙江。

Pterygoda longituba Yang et Zhang 長管翅球螋 (Zhou et Zhang, 1995:82)
Pterygida longituba Yang et Zhang, 1988:
捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江。

Pterygoda maculata (Bey-Bienko) 斑翅球螋 (Zhang et Yang, 1993:254; Zhang et al., 1992:116)
別 名：*具斑球螋*。
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南。

Timomenus cuneatus Zhang 楔角敬球螋 (Zhou et Zhang, 1995:82)
Timomenus cuneatus Zhang
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Timomenus inermis Borelli 淨喬球螋 (Ma et Chen, 1992:102; 1997:178)
Timomenus inermis Borelli, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、雲南、湖北、西北地區。

Timomenus komarvi (Semenov) 科氏球螋 (Ma et Chen, 1997:178; Zhou et Zhang, 1995:82)
Timomenus komarvi (Semenov, 1901:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、海南、四川、浙江、東北；朝鮮、日本、菲律賓。

Timonenus lugens (Bormana) 素喬螋 (Ma et Chen, 1992:102)
Timonenus lugens (Bormana, 1894:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；日本、緬甸。

Timomenus paradoxa (Bey-Bienko) 脊角敬球螋 (Zhang et Yang, 1993:254; Zhou et Zhang, 1995:82)
Timomenus paradoxa (Bey-Bienko)
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、四川、浙江；越南。

Opisthocosmlidae 長鋏螋科

Eparchus insignis (de Haan) 慈螋 (Chen et Ma, 1988:58; Ma et Chen, 1992:102)
Eparchus insignis (de Haan, 1842:)
捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、雲南、西藏、東北；馬來西亞、緬甸、印度、印尼。

Eparchus yezonensis Matsumura et Shiraki 蝦夷蠼螋 (He et al., 1991:73)
捕 食：螟蛾(幼蟲)。
分 佈：陝西。

Timomenus aesculapius (Burr) 堂喬螋 (Chen et Ma, 1988:57)
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川；日本、緬甸、印度。

Timomenus flavocapitatus (Shiraki) 黃頭喬螋 (Chen et Ma, 1988:58)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、西藏。

Timomenus komarovi (Semenov) 克喬球螋 (Hun., 1992:92)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、湖南。

Timomenus lugens (Bormans) 素喬螋 (Chen et Ma, 1988:57)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；日本、緬甸、印度。

Timomenus oannes (Burr) 喬螋 (Chen et Ma, 1988:57)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏。

HEMIPTERA 半翅目

Pentatomidae 蝽科

Asopinae 益蝽亞科

Acicazira gibbosa Hsiao et Cheng 峰蝽 (Hsiao et al., 1977:81)
Acicazira gibbosa Hsiao et Cheng, 1977:81.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Amyotea malabarica forma **nigripes** Elenrieder 丹蝽(黑足型) (Hsiao et al., 1977:88; Yunn., 1987:130; Zhang et Lin, 1988:85)
別 名：*黑足丹蝽*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、雲南、西藏、貴州；菲律賓、印尼、印度。

Amyotea malabarica forma **typica** (Fabricius) 丹蝽 (Hsiao et al., 1977:88; Li et al., 1990:47; Yunn., 1987:130; Zhang, 1987[ed.] 1:84; Zhang et Lin, 1988:85)

捕 食：鱗翅目幼蟲。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州；菲律賓、印尼、印度。

Andrallus spinidens (Fabricius) 側刺蝽 (Chen, 1986:207; He et al., 1991:89; Hsiao et al., 1977:87; Hun.:227; Li et al., 1990:47; Sun et al., 1980(4):23; Zhang, 1985:68; Zhang, 1987ed.(1):85)

Ciemx spinidens Fabricius

=*Aspous geometricus* Burmeister

=*Adudinetis aculeata* Ellenrieder

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

Tirideta sabulifera Guenée 黃麻擬尺蠖

眉紋夜蛾

Spodoptera mauritia (Boisduval) 禾灰翅夜蛾。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、湖北；印度、不丹、小亞細亞、馬達加斯加、埃塞俄比亞、印尼、巴布亞幾內亞、新喀里多尼亞、斐濟、澳洲、墨西哥。

Arma chinensis (Fallou) 蠋蝽 (ASZI et al., 1978:237; Bu et Zheng, 1997:190; Chen, 1986:207; He et al., 1991:88; Hun., 1992:228; Lin et al., 1992:171; Liu et Zhang, 1993, 15(2)::89; Tian et al., 1993, 15(4)::156; Wang, 1993:149; Wang et al., 1992:281; Wu et al., 1989:168-169; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yue, 1989:159-163; Yunn., 1987:129; Zhang, 1981(4):28; 1985:67; Zhang, 1987[ed.] 1:85; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

=*Cimex custos* Fabricius

別 名：*蠋敵*。

捕 食：在蘋果、海棠、楊樹、梨等樹上生活，捕食鱗翅目等昆蟲的軟體幼蟲，包括：蚜蟲

Apria crataegi Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)

Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)

棉鈴蟲(幼蟲)

大豆造橋蟲(幼蟲)

Pryeria sinica Moore 大葉黃長毛斑蛾

Parasa spp. 刺蛾(幼蟲)

Clostera anastomosis Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、蛹)

Lmantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾

Diprion luwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)

Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)

Neodiprion dailingensis Xiao et Zhou 帶嶺新松葉蜂(紅松)

琉璃葉甲(幼蟲)

(稻田)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、中亞、歐洲中南部。

Arma custos (Fabricius) 蠋蝽 (Chen et Wnag, 1987:305; Lin et al., 1992:171; Wu et al., 1991:28; Zheng, 1981(4):29; Zheng et Su, 1985:87-89; Zheng et al., 1992:155-156)

別 名：*蠋敵*。

捕 食：*Ambrostoma quadriimpressum* 榆紫葉甲

楊紅葉甲

Cnidocampa flavescens (Walker) 黃刺蛾

捲葉蛾

梨星毛蟲

刺槐尺蠖等幼蟲

楊毒蛾

楊扇舟蛾

Spilonota lechriaspis 蘋果芽白小捲蛾。

分 佈：江蘇、安徽、湖北、陝西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、中亞、歐洲。

Arma ferruginea (Hsiao et Cheng) 銹色蠋蝽 (Yunn., 1987:129; Zhang et Lin, 1992:111; Zheng, 1981(4):20)

Arma ferruginea (Hsiao et Cheng, 1977:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、湖北。

Arma koreana Josifov et Kerzhner 朝鮮蠋蝽 (Zheng, 1981(4):29)

捕 食 性。

分 佈：貴州、東北；朝鮮。

Arma maculata Zheng 斑翅蠋蝽 (Yunn., 1987:129; Zheng, 1981(4):29; Zhang et Lin, 1992:111)

Arma maculata Zheng, 1980:

捕 食 性。

分 佈：雲南(昆明)、西藏、四川、湖北。

Arma peipingensis (Yang) 北平蠋蝽 (Zheng, 1981(4):29)

Arma peipingensis (Yang, 1933:)

捕 食 性。

分 佈：北京。

Arma tubercula (Yang) 腹突蠋蝽 (Yunn., 1987:129; Zheng, 1981(4):29; Zhang et Li, 1992:112)

Arma tubercula (Yang, 1934:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、湖北。

Blachia ducalis Walker 捕蝽 (Hsiao et al., 1977:80; Yunn., 1987:127)

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸、印度北部、錫金。

Breddiniella yunnanica Zhang et Lin 雲南棘峰蝽 (Yunn., 1987:127; Zhang et Lin, 1982:57)

Breddiniella yunnanica Zhang et Lin, 1982:57.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Cantheconidea binotata (Distant) 二斑厲蝽 (Bu et Zheng, 1997:190; Hsiao et al., 1977:85; Yunn., 1987:127)

Cantheconidea binotata (Distant, 1879:)

捕 食 性。

分 佈：江西、廣東、雲南、西藏、四川；緬甸、印度、不丹。

Cantheconidea concinna (Walker) 厲蝽 (ASZI et al., 1978:237; Chen, 1986:207; Chen, 1996, 18(1):20; Dai, 1992:42; Hsiao et al., 1977:84; Hun., 1992:228; Li et al., 1990:46; Lin et al., 1992:171; Su et al., 1986:37; Wu et al., 1989:169; Yunn., 1987:126; Zhang, 1987[ed.] 1:85; Zhang et Lin, 1988:85)

Canthecona concinna Walker

別 名：*海南蝽*。

捕 食：*Stethoconus japonicus* Schumacher 軍配盲蝽(茶)

Phauds flammans (Walker) 朱紅毛斑蛾(多種花木)

Buzura suppressaria 油桐尺蠖

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

黃檀丑舟蛾

蛾蝶類(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、河南；越南。

Cantheconidea farcellafa Walff 斑蠣蝽 (Tu et al., 1962:158)

別 名：*粗吻針椿象*。

捕 食：*Titideta sabulifera* Guenée 黃麻擬尺蠖。

分 佈：臺灣。

Cantheconidea formosa Horvath 麗厲蝽 (Hsiao et al., 1977:84)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Cantheconidea formosana Sonan 臺灣厲蝽 (Hsiao et al., 1977:84)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Cantheconidea furcellata (Wolff) 叉角厲蝽 (ASZI, 1986, 1:371; Chen, 1986:207; Dai et Yang, 1993, 19(2):20-21; Hsiao et al., 1977:84; Li et al., 1990:46; Li et al., 1988, 4(1):41; Su, 1997, 19(4):181; Yunn., 1987:126; Zhang et Lu, 1996, 18(2):74-77; Zhu, 1990, 12(2):71-74)

捕 食：*Darna trima* Moore 油棕刺蛾(幼蟲、蛹)
棉翠紋金鋼鑽
槐樹粉蝶。
室內：*Corcyra cephalonica* 米蛾
Galleria mellonella 大蠟螟
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Erionota thrax 香蕉弄蝶
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
鱗翅目(幼蟲)
國外：*Antigastra catalaunalis* 芝麻莢野螟
Crocidolomia binotalis
Oocassida pudibunda
Andraca bipunctat 茶帶蛾
Diarisia abliqua 塵污燈蛾
Pelopidas mathias 隱紋谷弄蝶。

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州；菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Cantheconidea humeralis (Distant) 尖角厲蝽 (Hsiao et al., 1977:84; Li et al., 1990:46; Yunn., 1987:126)

捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南；緬甸。

Cantheconidea kyshyeuries 苦厲蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:85)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Cantheconidea parva Distant 小厲蝽 (Hsiao et al., 1977:85; Yunn., 1987:127; Zhang et Lin, 1988:85)

捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏；印度。

Cantheconidea thomsoni Distant 黑厲蝽 (Bu et Zheng, 1997:190; Chen, 1993:45; Hsiao et al., 1977:85; Hun., 1992:228; Lin et al., 1992:171; Zhang, 1987[ed.] 1:85)

Cantheconidea thomsoni Distant, 1891:
別 名：*黃點扁脛蝽*。
捕 食：剛竹毒蛾
焦藝夜蛾
中華寬尾鳳蝶
鱗翅目幼蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河北、黑龍江。

Cantheconidea sp. 寬厲蝽 (Hsiao et al., 1977:85; Zhang, 1987[ed.] 1:85)
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西。

Cantheconides sp. 扁脛厲蝽 (Chen, 1986:207)
別 名：*扁脛蝽*。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Cazira bhoutanica Schouteden 削瘤蝽 (ASZI et al., 1978:236; Hsiao et al., 1977:82; Yunn., 1987:127; Zhang, 1987[ed.] 1:85)
別 名：*不丹瘤蝽*。
捕 食：蛾蝶類(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、雲南、貴州、浙江、江蘇、安徽；不丹。

Cazira breddini Schouteden 背線瘤蝽 (ASZI et al., 1978:236; He et al., 1991:89; Hsao et al., 1977: 82; Yunn., 1987:127; Zhang et Lin, 1988:85; 1992:1102)
Cazira breddini Schouteden, 1907:
捕 食：蛾蝶類(幼蟲)
(稻田)。
分 佈：雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇；不丹。

Cazira concinna Hsiao et Cheng 麗疣蝽 (Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:81; Zhang, 1987[ed.] 1:85)
Cazira concinna Hsiao et Cheng, 1977:81.
捕 食 性。
分 佈：江西、海南、浙江。

Cazira emeia Zhang et Lin 峨嵋疣蝽 (Hun., 1992:228; Lin et al., 1992:171; Yunn., 1987:128; Zhang et Lin, 1982:58; 1992:102)
Cazira emeia Zhang et Lin, 1982:58.
別 名：*峨嵋瘤蝽*。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、安徽、陝西、甘肅。

Cazira flava Yang 普洱瘤蝽 (Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:81; Yunn., 1987:129)
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州。

Cazira frivaldszkyi Horvath 削疣蝽 (Hun., 1992:229; Lin et al., 1992:171)
=*Cazira bhoutanica* Schouteden
捕 食：葉蜂幼蟲

鱗翅目幼蟲。
分佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽；印度、不丹。

Cazira horvathi Breddin 峰疣蝽 (Hun., 1992:229)
=*Acicazira gibbosa* Hsiao et Cheng
別名：*峰蝽*。
捕食性。
分佈：福建、湖南、廣東、海南、貴州、四川、湖北、河南；越南。

Cazira inerma Yang 無刺疣蝽 (ASZI et al., 1978:236; He et al., 1991:89; Hsiao et al., 1977:82; Hun., 1992:229)
捕食：*Mythimna separata* Walker 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
蛾蝶類(幼蟲)。
分佈：福建、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、陝西。

Cazira membrania Zhang et Lin 膜疣蝽 (Bu et Zheng, 1997:192; Hun., 1992:229; Zhang et Lin, 1982:59)
Cazira membrania Zhang et Lin, 1982:59.
捕食性。
分佈：湖南、貴州、浙江、湖北。

Cazira montandoni Breddin 黃瘤蝽 (Hsiao et al., 1977:81; Yunn., 1987:129)
捕食性。
分佈：雲南；越南。

Cazira sichuana Zhang et Lin 四川疣蝽 (Zhang et Lin, 1986:92; 1992:102)
Cazira sichuana Zhang et Lin, 1986:92-93.
捕食性。
分佈：四川(瀘定磨西)。

Cazira thibetensis Schouteden 錫比瘤蝽 (Hsiao et al., 1977:81)
捕食性。
分佈：雲南、西藏。

Cazira vegeta Kirkaldy 紅瘤蝽 (Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:81; Yunn., 1987:129)
捕食性。
分佈：廣東、雲南；越南、泰國、印度。

Cazira verrucosa (Westwood) 疣蝽 (ASZI et al., 1978:235; Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:82; Hun., 1992:230; Li et al., 1990:45; Yunn., 1987:128; Zhang et Lin, 1988:85)
Pentotma verrucosa Westwood
別名：*瘤蝽*，*多疣蝽*。
捕食：象甲
蛾蝶類(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、青海、陝西、河南、河北、北京、甘肅；朝鮮、日本、緬甸、印度。

Cazira sp. 峨嵋瘤蝽 (Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:82)

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、四川、陝西。

Cecyrina platyrhynoides Walker 象蝽 (Hsiao et al., 1977:86; Hun., 1992:230; Lin et al., 1992:171; Zhang et Lin, 1992:102)

Cecyrina platyrhynoides Walker, 1867:

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣西、雲南、四川；緬甸、印度(北部)、不丹。

Dinorhynchus dybowskyi Jakovlev 喙蝽 (Hsiao et al., 1977:88)

捕 食 性。

分 佈：山東、北京、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞。

Eocanthecona furcellata (Wolff) 叉角厲蝽 (Chang et Hsieh, 2001(3):257-267; Chu et Chu, 1971:185; 1975:99, 114; 133-141; Hsu et Chu, 1971:185; Li et al., 1988, 4(1):45; Lo, 1997:61; Xie et al., 1999, 21(2):83; Zhang, 1985:66; Zhang et Lu, 1996, 18(2):74-77; Zhu, 1990, 12(2):71-74)

別 名：*黃斑粗喙椿象*。

捕 食：*Darna trima* Moore 油棕蛾(幼蟲、蛹)

二化螟

玉米螟

擬尺蠖

小菜蛾

菜心螟

天蛾

小造橋蟲

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

棉鈴蟲(玉米穗蟲)

Pieris rapae Linnaeus 紋白蝶(幼蟲)。

分 佈：臺灣、海南、廣西、四川；菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡。

Jalla dumosa (Linnaeus) 捉蝽 (Hsiao et al., 1977:83)

捕 食 性。

分 佈：新疆、吉林、黑龍江；西伯利亞、小亞細亞、伊朗、土耳其、阿爾及利亞、歐洲。

Jalla subcalcarata Jakovlev 黑脛捉蝽 (Hsiao et al., 1977:83; Yunn., 1987:126; Zhang et Lin, 1981:136; 1992:112)

Jalla subcalcarata Jakovlev, 1884:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、河北、北京、新疆、內蒙古；西伯利亞、土耳其。

Martinina ferruginea Hsiao et Cheng 狩蝽 (Hsiao et al., 1977:86)

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Martinina inexpectata Schouteden 深色狩蝽 (Hsiao et al., 1977:86; Zhang et Lin, 1992:112)

Martinina inexpectata Schouteden, 1907:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Parastrachia japonensis (Scott) 日本朱蝽 (ASZI et al., 1978:238; Hsiao et al., 1977:87; Zhang, 1987[ed.]):85)

Parastrachia japonensis (Scott, 1880:)

別 名：*大紅蝽*。

捕 食：蛾蝶類(幼蟲)。

分 佈：江西、貴州、雲南、四川、浙江；朝鮮、琉球。

Parastrachia nagaensis Distant 華西朱蝽 (Hsiao et al., 1977:87; Yunn., 1987:129; Zhang et Lin, 1992:113)

Parastrachia nagaensis Distant, 1907:

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南、四川、湖北；印度。

Picromerus bidens (Linnaeus) 雙刺益蝽 (Yan et al., 1993, 9(2):50)

捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。

分 佈：遼寧。

Picromerus fasciaticeps Zheng et Liu 黃額益蝽 (Zheng et Liu, 1987:181)

Picromerus fasciaticeps Zheng et Liu, 1987:181-182.

捕 食 性。

分 佈：雲南(東川、鶴慶)。

Picromerus griseus (Dallas) 黑益蝽 (Chen, 1986:207; He et al., 1991:89; Hsiao et al., 1977:83; Li et al.,:47; Yunn., 1987:127; Zhang, 1985:64; Zhang, 1987[ed.] 1:85; Zhang et Lin, 1981:136; 1988:85; 1992:113)

Picromerus griseus (Dallas, 1851:)

捕 食：*Mycalesis gotama* Moore 稻眼蝶

菜青蟲

菜蛾

麥蛾

Ostrinia furnacalis (Guenée) 玉米螟

豆莢螟

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Agrotis ipsilon (Rottemberg) 小地老虎

蚜蟲。

分 佈：江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川；緬甸、印度、不丹。

Picromerus lewisi Scott 益蝽 (ASZI et al., 1978:237; Bu et Zheng, 11997:191; Bu et al., 1995:124; Chen, 1986:207; He et al., 1991:89; Hsiao et al., 1977:84; Hun., 1992:230; Li et al., 1990:47; Lin et al., 1992:172; Wang, 1993:149; Wang et al., 1992:280; Yunn., 1987:127; Zhang, 1985:66; Zhang et Lin, 1992:113; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

Picromerus lewisi Scott, 1874:

別 名：*廣喙蝽*。

捕 食：*Pryeria sinica* Moore
大葉黃楊長毛斑蛾
松毛蟲(幼蟲)
柞蠶(幼蟲)
蛾蝶類(幼蟲)
Gilpinia massoniana　馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion dailingensis Xiao et Zhou　帶嶺新松葉蜂(紅松)
(稻田)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Picromerus viridipuntatus Yang 綠點益蝽 (Bu et Zheng, 1997:191; Bu et al., 1995:124; Chen, 1986:207; Hsiao et al., 1977:83; Hun., 1992:230; Lin et al., 1992:172; Zhang, 1987[ed.] 1:85; Zhang et Lin, 1992:113)

Picromerus viridipuntatus Yang, 1934:

別 名：*貴陽蝽*。

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽。

Pinthaeus humeralis Horváth 并蝽 (Bu et Zheng, 1997:191; Hsiao et al.,:1977:80; Hun., 1992:231; Yunn., 1987:126; Zhang, 1987[ed.] 1:86; Zhang et Lin, 918:136; 1988:86)

Pinthaeus humeralis Horváth, 1911:

別 名：*大理蝽*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、西藏(察隅)、四川、陝西、遼寧、吉林。

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius) 紅足并蝽 (Hsiao et al., 1977:80)

捕 食 性。

分 佈：吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲、土耳其。

Podisus maculiventris (Say) 斑腹刺蝽 (Pu, 1987:60; Wang et Gong, 1987:81-83)

別 名：*刺兵蝽*。

捕 食：*Ectropis obliqua hypulina*　茶尺蠖
Hyphantria cunea　美國白蛾
Laspeyresia leucostoma　茶卷葉蛾
Leptinotarsa decemlineata　馬鈴薯甲蟲

Pyrralta aenescens 榆螢葉甲。
分 佈：安徽、河南、北京。
附 註：1983 年自美國引進。

Rhacognathus corniger Hsiao et Cheng 角雷蝽 (Hsiao et al., 1977:88)
Rhacognathus corniger Hsiao et Cheng, 1977:88.
捕 食 性。
分 佈：河北、黑龍江。

Rhacognathus punctatus (Linnaeus) 雷蝽 (Hsiao et al., 1977:89)
捕 食 性。
分 佈：河北；西伯利亞、歐洲、土耳其。

Troilus luridus (Fabricius) 耳蝽 (Hsiao et al., 1977:88; Yunn., 1987:129; Zhang et Lin, 1981:136; 1992:113)
Troilus luridus (Fabricius, 1775:)
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、西藏(古井)、四川、河北、甘肅、黑龍江；西伯利亞、緬甸、印度、西伯利亞、歐洲。

Troilus testaceus Zhang et Lin 褐耳蝽 (Zhang et Lin, 1992:113)
Troilus testaceus Zhang et Lin, 1987:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Zicrona caerulea (Linnaeus) 藍蝽 (ASZI; 1986, 1:371; Chen, 1986:207; He et al., 1991:89; Hsiao et al., 1977:87; Hun., 1992:231; Li et al., 1990:47; Lin et al., 1992:172; Xie et al., 1999, 21(2):83; Yunn., 1987:129; Zhang, 1985:68; Zhang, 1987[ed.] 1:86; Zhang et Lin, 1992:113)
Cimex coerulea Linnaeus, 1758:
=*Zierona illustris* Amyot et Serville
別 名：*純藍蝽*。
捕 食：*Dendrolimus* spp. 松毛蟲(幼蟲)
菜白蝶(幼蟲)
眉紋夜蛾(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Spodoptera mauritia (Boisduval) 禾灰翅夜蛾
亦見吸食水稻、甘草、毛薄荷、蛇含、一年蓬及其它植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南，廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、加里曼丹、緬甸、印度、阿富汗、古北區全部、加拿大、美國、南美洲。

Pentatominae 蝽亞科

Halymorpha picus Fabricius 茶翅蝽 (Chang, 1955:195)

捕 食：*Mimastra cyanura* Hope 桑藍葉甲(黃葉甲)(成蟲)。

分 佈：廣東、福建、浙江。

Harpector sp. 真蝽 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

捕 食：*Neodiprion dailingensis* 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)。

分 佈：

Menida histrio (Fabricius) 稻赤曼蝽 (ASZI, 1986, 1:372; Chao, 1982:48; Yunn., 1987:135; Zhang, :74; Zhang, 1987[ed.] 1:90)

別 名：*稻赤蝽，小赤蝽*。

寄 主：柑橘、桑、水稻、小麥、玉米、花生、甘蔗、亞麻、油桐等，並發現捕食鱗翅目幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、雲南、西藏；越南、印尼、緬甸、印度。

Coreidae 緣蝽科

Riptortus pedestris Fabricius 點蜂緣蝽 (Qi et al., 1983:56)

捕 食：*Eumeta vaariegata* (Snellen) (=*Cryptothelea formosicola*) 大袋蛾(幼蟲)。

分 佈：江蘇、安徽。

Lygaeidae 長蝽科

Geocorinae 大眼長蝽亞科

Geocoris arenarius (Jakovlev) 沙地大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:83; Li, 1981(1-2):84)

捕 食 性。

分 佈：河南、新疆；蘇聯、伊朗、土耳其、歐洲南部。

Geocoris ater (Fabricius) 黃紋大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:86)

捕 食 性。

分 佈：新疆；西伯利亞、中亞、阿富汗、土耳其、敘利亞、歐洲。

Geocoris chinai Kiritschenko 珠峰大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:85; Zhang et Lin, 1981:153)

捕 食 性。

分 佈：西藏(協格爾)。

Geocoris chinensis Jakovlev 川西大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:82; Zheng et Zou, 1992:155)

Geocoris chinensis Jakovlev, 1904:

捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Geocoris dubreuili Montandon 黃褐大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:80; Li et al., 1990:44)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南；印度。

Geocoris flaviceps fenestellus Breddin 斑翅大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:83)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄)、雲南；馬來西亞、印尼、緬甸、斯里蘭卡。

Geocoris grylloides (Linnaeus) 白邊大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:86)
捕 食 性。
分 佈：中國；西伯利亞、中亞、歐洲。

Geocoris hirsutus Montandon 長毛大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:84)
捕 食 性。
分 佈：四川；印度。

Geocoris hirticornis Jakovlev 淡色大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:79)
捕 食 性。
分 佈：新疆；中亞、伊朗。

Geocoris itonis Horvàth 黑大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:87)
捕 食 性。
分 佈：陝西、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧；日本。

Geocoris lapponicus Zetterstedt 北大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:87)
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞、歐洲。

Geocoris montanus Zheng 紋盾大眼長蝽 (Zhang et Lin, 1981:152)
Geocoris montanus Zheng, 1981:152.
捕 食 性。
分 佈：西藏(普蘭朗瑪拉巴)。

Geocoris ochropterus (Fieber) 南亞大眼長蝽 (Cao, 1986:182; Chang et al., 1993:240; He et al., 1991:88; Hsiao et al., 1981:81; Li et al., 1990:44; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Zheng, 1988:97; Zheng et Zou, 1992:155)
Geocoris ochropterus (Fieber, 1844:)
=*Geocoris tricolor* (Fabricius)
別 名：*三色長蝽*，*大眼長蝽*。
捕 食：稻蝨
葉蟬

Aphis gossypii Glover　棉蚜
Thrips palmi Barny　南黃薊馬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱卷葉螟(卵、幼蟲)
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、江蘇、湖北；緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Geocoris pallidipennis pallidipennis (Costa) 大眼長蝽 (Ai et Zhuo, 1989:36-38; He et al., 1991:88; Hsiao et al., 1981: 84; Li, 1981(1-2):84; Qi et al., 1983:55; Sun, 1993, 15(4):157-159; Zheng et Zou, 1992:155)
Geocoris pallidipennis (Costa, 1843:)
捕 食：棉蚜
蚜蟲
稻飛蝨
稻葉蟬
棉葉蟬(若蟲)
稻縱捲葉螟(卵)
紅鈴蟲(卵、低齡幼蟲)
棉鈴蟲(卵、低齡幼蟲)
銀紋夜蛾(卵、低齡幼蟲)
蟎類。
分 佈：江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、天津、北京；古北界廣布；菲律賓、中南半島、印尼、印度、中亞、北非、歐洲。

Geocoris pallidipennis xizangensis Zhen 大眼長蝽(西藏亞種) (Hsiao et al., 1981:85)
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Geocoris varius (Uhler) 寬大眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:81; Qi et al., 1983:55; Wu et al., 1991:102; Zheng, 1988:97; Zheng et Zou, 1992:155)
Geocoris varius (Uhler, 1860:)
捕 食：在棉田捕食鱗翅目卵及幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、陝西、山西；日本。

Geocoris sp. 大眼蟬長蝽 (ASZI et al., 1978:247; Lo et Chen, 1995:369; Zhu, 1994, 16(1):28-35)
捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama　柑橘木蝨
蚜蟲
盲蝽
棉紅鈴蟲(卵、幼蟲)
棉鈴蟲(卵、幼蟲)
金剛鑽(卵、幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾(卵、幼蟲)

在各種蔬菜、穀類、綠肥、棉花、苜蓿上經常見到。
分 佈：黃河流域和長江流域。

Germalus sp. 泡眼長蝽 (Hsiao et al., 1981:88)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Harmostica emeia Zheng 峨眉斜眼長蝽 (Zheng, 1980:153)
Harmotica emeia Zheng, 1980:153.
寄 主：樹棲鼠類(吸血)。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Harmostica hirsuta (Usinger) (Zheng, 1980:153)
寄 主：松鼠(吸血)。
分 佈：海南。

Oxycarenus sp. 長蝽 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)
寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop. 薊(葉)。
分 佈：新疆。

Pyrrhocoridae 紅蝽科

Antilochus conquebertii (Fabricius) 頸紅蝽 (Li et al., 1990:45)
捕 食：棉二點紅蝽(成蟲、若蟲)。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、江蘇。

Phymatidae 瘤蝽科

Amblythyreus angustus Westwood 銳菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:386)
捕 食 性。
分 佈：臺灣；寮國、印度。

Amblythyreus chapa Komilev 碩菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:385
捕 食 性。
分 佈：四川；越南。

Amblythyreus esakii Maa et Lin 山菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:385; Yunn., 1987:198)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南。

Amblythyreus fasciatus (Dudich) 帶菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:385)
捕 食 性。

分 佈：貴州。

Amblythyreus gestroi Handlirsch 鈍菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:385; Yunn, 1987:198)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南；緬甸。

Amblythyreus izzardi Kormilev 察隅菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:384)
Amblythyreus izzardi Kormilev, 1962:
捕 食 性。
分 佈：西藏；緬甸。

Amblythyreus martini Handlirsch 短角菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:383; Yunn., 1987:198)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Amblythyreus oberthuri Handlirsch 長角菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:383; Yunn., 1987:198)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Amblythyreus potaninae (Bianchi) 小菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:383; Liu, 1992:173; Yunn., 1987:198)
Amblythyreus potaninae (Bianchi, 1899:)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Amblythyreus rectus Maa et Lin 直緣菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:384)
Amblythyreus rectus Maa et Lin, 1954:
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西。

Amblythyreus rhombiventris Westwood 尖菱瘤蝽 (Li et al., 1990:43)
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Amblythyreus taiwanus Sonan 臺灣菱瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:385)
Amblythyreus taiwanus Sonan, 1935:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Carcinochelis bannaensis Hsiao et Liu 版納蟹瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:170)
Carcinochelis bannaensis Hsiao et Liu, 1979:170.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Carcinocoris binghami (Sharp) 賓刺瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:170; Hsiao et al., 1981:387; Yunn., 1987:198)

捕 食 性。

分 佈：雲南；泰國、緬甸。

Chalocoris bianchii Kormilev 川龜瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:388)

Chalocoris bianchii Kormilev, 1970:

捕 食 性。

分 佈：四川(康定)。

Chelocoris dissimilis Liu 異角龜瘤蝽 (Liu, 1988:72; Yunn., 1987:200)

Chelocoris dissimilis Liu, 1988:72.

捕 食 性。

分 佈：雲南(麗江)。

Chelocoris handlirschi Bianchi 原龜瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:388; Liu, 1992:174; Yunn., 1987:199)

Chelocoris handlirschi Bianchi, 1899:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Chelocoris sinicus Hsiao et Liu 華龜瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:172; Hsiao et al., 1981:389; Yunn., 1987:199)

Chelocoris sinicus Hsiao et Liu, 1979:172.

捕 食 性。

分 佈：福建、雲南。

Chelocoris tibeticus Hsiao et Liu 藏龜瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:171; Hsiao et al., 1981:387; Liu, 1992:174)

Chelocoris tibeticus Hsiao et Liu, 1979:171.

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Chelocoris yangi Liu 巴蜀龜瘤蝽 (Liu, 1992:173)

Chelocoris yangi Liu, 1992:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chelocoris yunnanus Hsiao et Liu 滇龜瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:171; Hsiao et al., 1981:388; Liu, 1992:174; Yunn., 1987 200)

Chelocoris yunnanus Hsiao et Liu, 1979:171.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Cnizocoris berezowskii Bianchi 松潘螳蝽 (Hsiao et al.:380, 382)

捕 食 性。

分 佈：四川、華南區。

Cnizocoris davidi Handlirsch 模螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:381; Hun., 1992:278; Liu, 1992:1173; Yunn., 1987:198)
Cnizocoris davidi Handlirsch, 1897:
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川。

Cnizocoris dimorphus Maa et Lin 天目螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:379, 382; Hun., 1992:278; Liu, 1992:175; 1992:195; Zhang, 1987[ed.] 1:108)
Cnizocoris dimorphus Maa et Lin, 1956:
別 名：*瘦疣蝽*。
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣西、四川、浙江、湖北。

Cnizocoris draki Kormilev 廬山螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:380, 383; Zhang, 1987ed.(1):108)
Conizocoris draki Kormilev, 1957:
捕 食 性。
分 佈：江西(廬山)。

Cnizocoris hsiaoi Liu 蕭螳瘤蝽 (Liu, 1988:71; Yunn., 1987:198)
Cnizocoris hsiaoi Liu, 1988:71.
捕 食 性。
分 佈：雲南(麗江)。

Cnizocoris jakowlevi (Bianchi) 川西螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:381)
捕 食 性。
分 佈：四川(西部)。

Cnizocoris obvius Hsiao et Liu 顯螳瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:169; Hsiao et al., 1981:378)
Cnizocoris obvius Hsiao et Liu, 1979:169.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Cnizocoris potanini (Bianchi) 寶興螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:379, 381; Ren, 1997:270)
Cnizocoris potanini (Bianchi, 1899:)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、陝西。

Cnizocoris shansiensis Hsiao et Liu 晉螳瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:170; Hsiao et al., 1981:378)
Cnizocoris shansiensis Hsiao et Liu, 1979:170.
捕 食 性。
分 佈：山西。

Cnizocoris similis Liu 似模螳瘤蝽 (Liu, 1992:173)
Cnizocoris similis Liu, 1992:
捕 食 性。

分 佈：四川。

Cnizocoris sinensis Kormilev 華螳瘤蝽 (ASZI, 1986, 1:414; Hsiao et al., 1981:381, 382; Zhang, 1985:175)
別 名：*中國螳瘤蝽*。
捕 食：在花序伏擊小蟲。
分 佈：陝西、山西、河北、北京、甘肅、內蒙古。

Cnizocoris sirakii Sonan 臺灣螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:378)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cnizocoris sp. 四川螳瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:380)
捕 食 性。
分 佈：四川(康定)。

Duirocoris nakabayashi (Sonan) 原尾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:376)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(基隆)。

Glossopelta acuta Handlirsch 原盾瘤蝽 (Hsiao et Liu, 1979:169; Hsiao et al., 1981:377; Yunn., 1987:198)
捕 食 性。
分 佈：雲南；印尼、緬甸。

Glossopelta lineolata Distant 緬甸盾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:376)
捕 食 性。
分 佈：貴州；緬甸。

Glossopelta praerupta Maa et Lin 閩盾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:377)
捕 食 性。
分 佈：福建(崇安挂墩)。

Glossopelta rhodiola Maa et Lin 玫盾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:377)
捕 食 性。
分 佈：福建(崇安、邵武)、北京。

Glossopelta tridens Maa et Lin 三齒盾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:376; Zhang, 1987[ed.] 1:108)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、四川。

Glossopelta truncata Distant 截肩盾瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:377)
捕 食 性。
分 佈：浙江；緬甸。

Phymata crassipes (Fabricius) 原瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:374)

捕 食 性。

分 佈：黑龍江；廣泛分佈在舊北區。

Phymata crassipes chinensis Kormilev 華原瘤蝽 (Hsiao et al., 1981:374; Zhang, 1985:175)

捕 食：小蟲。

分 佈：山東、山西、天津、北京。

Enicocephalidae 奇蝽科

Henschiella saigusai Miyamoto 粗喙奇蝽 (Hsiao et al., 1981:372)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Hoplitocoris lewisi (Distant) 瘤背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:373; Ren, 1981:173; 1992:168)

Hoplitocoris lewisi (Distant, 1903:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、西藏、四川；日本。

Oncylocoris shirozui Miyamoto 溝背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:371; Yunn., 1987:201)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南、四川。

Stenopirates chipon (Esaki) 小光背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:370)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Stenopirates collaris Walker 褐足光背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:370)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)；爪哇、緬甸、印度。

Stenopirates jeanneli Stys 紅足光背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:370; Ren, 1992:168; Yunn., 1987:201)

Stenopirates jeanneli Stys, 1970:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川；印度、錫金、尼泊爾。

Stenopirates yami (Esaki) 赤光背奇蝽 (Hsiao et al., 1981:371; Ren, 1981:173; 1988:105)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、西藏、四川；印度、錫金、尼泊爾、日本。

Reduviidae 獵蝽科

Emesinae 蚊獵蝽亞科

Ademula nubecula McAtee et Malloch 淡三節蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:402)

捕 食 性。

分 佈：雲南；馬來西亞、加里曼丹。

Emesopsis plagiatus Miller 駝峰蚋蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:402)

捕 食 性。

分 佈：海南；菲律賓、馬來西亞。

Emesopsis spicatus McAtee et Malloch 淺斑蚋蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:403)

捕 食 性。

分 佈：雲南；菲律賓。

Empicoris culiciformis (De Geer) 白紋蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:400)

捕 食 性。

分 佈：天津、北京；亞洲、歐洲、非洲北部、阿根廷地區。

Empicoris culicis Hsiao 隱帶蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:401)

捕 食 性。

分 佈：海南。

Empicoris rubromaculatus (Blackburn) 紅痣蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:401)

捕 食 性。

分 佈：廣東；日本、菲律賓、印度、馬達加斯加、南非、夏威夷等地。

Gardena brevicollis Stål 角片蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:398)

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本、菲律賓、馬來西亞、爪哇、加里曼丹、斯里蘭卡、澳洲等。

Gardena melinarthrum Dohrn 黃環蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:398)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南；斯里蘭卡、澳洲。

Gardena muscicapa Bergroth 蚊獵蝽 (Li et al., 1990:11)

捕 食 性。

分 佈：廣西(南寧)。

Gardena yunnana Hsiao 雲南蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:397)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Gardena sp. 蚊獵蝽 (Li, et al., 1990:11)

Gardena sp., Li et al., 1990:11.

捕 食 性。

分 佈：廣西

Gomesius hesione (Kirkaldy) 羽突蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:395)

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓、爪哇、加里曼丹、巴布亞新幾內亞、夏威夷。

Ischnobaenella hainana Hsiao 海南杆蛛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:393)

捕 食 性。

分 佈：海南。

Myiophanes tipulina Reuter 大蚊獵蝽 (ASZI et al., 1978:243; Hsiao et al., 1981:400)

別 名：*蚊獵蝽*。

捕 食 性。

分 佈：西藏、貴州、浙江、上海、河北、北京、東北；日本、澳洲、非洲。

Onychomesa sauteri Wygodzinsky 齒爪蛛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:394)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Ploiaria hainana Hsiao 海南筏蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:396)

捕 食 性。

分 佈：海南。

Ploiaria insolida (White) 島筏蚊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:396)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海；菲律賓、馬來西亞、加里曼丹、巴布亞新幾內亞、夏威夷。

Schidium marcidum (Uhler) 三葉蛛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:394)

捕 食 性。

分 佈：上海；日本、爪哇、斯里蘭卡、澳洲。

Saicinae 盲獵蝽亞科

Gallobelgicus typicus Distant 刺脛盲獵蝽 (Ren, 1997:260)

Gallobelgicus typicus Distant, 1906:

捕 食 性。

分 佈：湖北；印度、東喜馬拉雅、斯里蘭卡。

Polytoxus femoralis Distant 南盲獵蝽 (He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:404; Li et al., 1990:12)
別 名：*長刺獵蝽*。
捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南；印度、斯里蘭卡。

Polytoxus fuscipennis Hsiao 褐翅盲獵蝽 (Hsiao et al., 1981:404)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Polytoxus fuscovittatus Stål 縱帶盲獵蝽 (He et al., 1991:86)
捕 食：稻飛虱類。
分 佈：廣西。

Polytoxus minimus China 小盲獵蝽 (Hsiao et al., 1981:406)
捕 食 性。
分 佈：福建(福州)。

Polytoxus pallipennis Hsiao 淡翅盲獵蝽 (Hsiao et al., 1981:405; Zhang, 1985:178)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Polytoxus ruficeps Hsiao 中褐盲獵蝽 (ASZI, 1986, 1:404; He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:405; Li et al., 1990:12)
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
分 佈：福建、廣西、雲南；越南。

Polytoxus rufinevis Hsiao 紅脈盲獵蝽 (Hsiao et al., 1981:405)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Tribelocephalinae 絨獵蝽亞科

Apocaucus sinicus Hsiao 冠絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:407)
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Opistoplatys majusculas Distant 大錐絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:409; Li et al., 1990:13)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南。

Opistoplatys mustela Miller 褐錐絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:409; Li et al., 1990:13; Ren, 1992:196)

捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江、湖北；爪哇。

Opistoplatys perakensis Miller 小錐絨獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao et al., 1981:409; Li et al., 1990:13)
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：湖南、廣西；馬來西亞。

Opistoplatys seculusus Miller 寬額錐絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:410; Li et al., 1990:14)
捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江、江蘇；爪哇。

Opistoplatys sorex Horvàth 錐絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:409; Zhang, 1987[ed.] 1:111)
捕 食 性。
分 佈：江西；爪哇。

Tribelocephala walkeri China 瓦絨獵蝽 (Hsiao et al., 1981:408; Li et al., 1990:12; Zhang, 1985:178)
Tribelocephala wlkeri China, 1940:
捕 食 性。
分 佈：廣東沿海島嶼、廣西、雲南。

Holoptilinae 毛獵蝽亞科

Holoptilus silvanus Hsiao 樹毛獵蝽 (Hsiao, 1974:318; Hsiao et al., 1981:411)
Holoptilus silvanus Hsiao, 1974:318.
捕 食 性。
分 佈：廣東沿海島嶼、廣西(南寧)。

Holoptilus viverra (Walker) (Hsiao, 1974:318)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Ptilocerus kanoi Esaki 羽獵蝽 (Hsiao et al., 1981:411)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Ectinoderinae 粘獵蝽亞科

Amulius malayus Stål 馬來粘獵蝽 (Hsiao et al., 1981:412)
捕 食 性。
分 佈：海南；馬來西亞。

Bannania pulchella Hsiao (Hsiao, 1973:59)
Bannania pulchella Hsiao, 1973:59.

捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Bayerus pilosus Hsiao (Hsiao, 1973:58)
Bayerus pilosus Hsiao, 1973:58.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Ectrychotes andreae Thunberg 八節黑獵蝽 (Chen et al., 1993:133; Hsiao, 1973:66; Ren et Bu, 1995:137; Wang et al., 1989:116)
別 名：*黑光獵蝽*。
捕 食：蚜蟲(荻、蘆葦)
葉蟬(荻、蘆葦)
鱗翅目(幼蟲) (荻、蘆葦)
棗樹害蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、甘肅、遼寧；朝鮮、日本。

Ectrychotes atripes Hsiao (Hsiao, 1973:68)
Ectrychotes atripes Hsiao, 1973:68.
捕 食 性。
分 佈：雲南(元江)。

Ectrychotes breviceps Hsiao (Hsiao, 1973:67)
Ectrychotes breviceps Hsiao, 1973:67.
捕 食 性。
分 佈：雲南(金平)。

Ectrychotes comottoi Leth. (Hsiao, 1973:66)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ectrychotes gressitti China (Hsiao, 1973:66)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ectrychotes jakovlevi Horv. (Hsiao, 1973:66)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ectrychotes lingnanensis China (Hsiao, 1973:66)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ectrychotes rubellus Hsiao (Hsiao, 1973:67)

Ectrychotes rubellus Hsiao, 1973:67.

捕 食 性。

分 佈：雲南(怒江)。

Ectrychotes ventralis Hsiao (Hsiao, 1973:66)

Ectrychots ventralis Hsiao, 1973:66.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Haematoloecha aberrens Hsiao (Hsiao, 1973:61)

Haematoloecha aberrens Hsiao, 1973:61.

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇、北京。

Haematoloecha andersoni Distant (Hsiao, 1973:61)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Haematoloecha fokiensis Distant 福建赤蠟蝽 (Hsiao, 1973:59; Ren et Bu, 1995:137; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、浙江。

Haematoloecha minor Hsiao (Hsiao, 1973:61)

Haematoloecha minor Hsiao, 1973:61.

捕 食 性。

分 佈：上海。

Haematoloecha nigrorufa Stål 二色赤蠟蝽 (Hsiao, 1973:61; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食 性。

分 佈：江西、我國分佈很廣，變異亦較大；日本。

Haematoloecha rufescens Distant (Hsiao, 1973:61)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Harpactor fuscipes (Fabricius) 紅彩真獵蝽 (Ren et Bu, 1995:137)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江；日本、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Harpactor incertus (Distant) 雲斑獵蝽 (Ren, 1992:198; Ren et Bu, 1995:137)

捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本。

Mendis hainana Hsiao (Hsiao, 1973:65)
Mendis hainana Hsiao, 1973:65.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰天池林場)。

Parascadra rubida Hsiao (Hsiao, 1973:59)
Parascadra rubida Hsiao, 1973:59.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰南岸)。

Rhysostethus glabellus Hsiao (Hsiao, 1973:64)
Rhysostethus glabellus Hsiao, 1973:64.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨眉山)。

Scadra militaris Hsiao (Hsiao, 1973:62)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Scadra rubida Hsiao (Hsiao, 1973:62)
Scadra rubida Hsiao, 1973:62.
捕 食 性。
分 佈：雲南(保山)。

Scadra wuchengfui China (Hsiao, 1973:62)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Tamaonia montana Hsiao (Hsiao, 1973:63)
Tamaonia montana Hsiao, 1973:63.
捕 食 性。
分 佈：浙江(莫干山)。

Tamaonia yunnana Hsiao (Hsiao, 1973:63)
Tamaonia yunnana Hsiao, 1973:63.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Centrocneminae 新獵蝽亞科

Neocentrocnemis formosana (Matsumura) 臺灣新獵蝽 (Hsiao, 1974:321; Hsiao et al., 1981: 414)

Centrocnemis formosana Mtsumura
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Neocentrocnemis stali (Reuter) 橫脊新獵蝽 (Hsiao et al., 1981:414; Zhang, 1985:178)
捕 食：林區捕食性種類。
分 佈：海南；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Neocentrocnemis yunnana Hsiao 雲南新獵蝽 (Hsiao, 1974:321; Hsiao et al., 1981:413)
Neocentrocnemis yunnana Hsiao, 1974:321.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Salyavatinae 颯獵蝽亞科

Lisarda annulosa Stål 環斑劍獵蝽 (Hsiao, 1974:320; Hsiao et al., 1981:416)
Lisarda annulosa Stål, 1874:83.
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Lisarda pilosa Hsiao 毛劍獵蝽 (Hsiao, 1974:320; Hsiao et al., 1981:416; Li et al., 1990:14)
Lisarda pilosa Hsiao, 1974:320.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(西雙版納)。

Lisarda rhypara Stål 晦紋劍獵蝽 (Hsiao et al., 1981:417)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州；越南、新加坡、爪哇、緬甸。

Lisarda spinosa Hsiao 刺劍獵蝽 (Hsiao, 1974:319; Hsiao et al., 1981:415)
Lisarda spinosa Hsiao, 1974:319.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Petalochirus spinosissimus Distant 葉脛獵蝽 (Hsiao, 1974:321; Hsiao et al., 1981:418)
Petalochirus spinosissimus Distant, 1903:260.
捕 食 性。
分 佈：雲南；越南、馬來西亞。

Valentia compressipes Stål 錘脛獵蝽 (ASZI et al., 1978:242; Hsiao et al., 1981:417; Zhang, 1985: 179)
捕 食：田間常見捕食性天敵。
分 佈：海南、雲南；越南、泰國、緬甸。

Valentia hoffmanni China 小錐脛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:417; Li et al.,, 1990:14)

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

Ectrichodinae 光獵蝽亞科

Bannania pulchella Hsiao 麗版納獵蝽 (Hsiao et al., 1981:427)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Bayerus pilosus Hsiao 柔毛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:436)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ectrychotes andreae (Thunberg) 黑光獵蝽 (ASZI, 1986, 1:404; He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:424; Hun., 1992:282; Li et al., 1990:15; Yunn., 1987:213)

別 名：*八節黑獵蝽*。

捕 食：稻田、豆類、甘蔗田覓食鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、甘肅、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、越南。

Ectrychotes atripes Hsiao 黑足光獵蝽 (Hsiao et al., 1981:426; Yunn., 1987:214)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ectrychotes breviceps Hsiao 短頭光獵蝽 (Hsiao et al., 1981:427; Yunn., 1987:214)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ectrychotes comotoi Lethierry 緣斑光獵蝽 (ASZI et al., 1978:241; He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:425; Hun., 1992:281; Li et al., 1990:15; Ren, 1992:196; Yunn., 1987:213)

別 名：*黑紅八節蝽*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川；日本、越南、緬甸。

Ectrychotes crudelis (Fabricius) 黑光獵蝽 (He et al., 1991:84; Sun et al., 1984:111; Zhang, 1985:179)

捕 食：在水稻、豆類、甘蔗及雜草叢等基部及表土附近爬行，獵食鱗翅目幼蟲，為農作物害蟲捕食天敵。

分 佈：臺灣、廣東、四川；越南、緬甸。

Ectrychotes gressitti China 紅腹光獵蝽 (Hsiao et al., 1981:425)

捕 食 性。
分 佈：海南。

Ectrychotes lingnanensis China 南方光獵蝽 (Hsiao et al., 1981:424; Li et al., 1990:15)
捕 食：稻田、豆類、甘蔗田覓食鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：海南、廣東、廣西。

Ectrychotes rubellus Hsiao 艷紅光獵蝽 (Hsiao et al., 1981; Yunn., 1987:213)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Ectrychotes ventralis Hsiao 黑腹光獵蝽 (Hsiao et al., 1981:424)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Haematoloecha aberrens Hsiao 異赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:433)
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、河南、山東、北京。

Haematoloecha andersoni Distant 安赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:435)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Haematoloecha fokiensis Distant 福建赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:432)
捕 食 性。
分 佈：福建(福州)、浙江(天目山).

Haematoloecha minor Hsiao 小赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:432)
捕 食 性。
分 佈：上海。

Haematoloecha nigrorufa (Stål) 黑紅獵蝽 (ASZI et al., 1978；He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:434; Zhang, 1985:179)
別 名：*二色赤獵蝽*。
捕 食：稻蛛緣蝽
稻大蛛緣蝽
鱗翅目(幼蟲)
稻飛蝨
多種農林害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅；日本。

Haematoloecha rubescens Distant 黑環赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:435; Li et al., 1990:17)

捕 食 性。

分 佈：廣西、四川、浙江；日本。

Haematoloecha yunnana Hsiao et Ren 雲南赤獵蝽 (Hsiao et al., 1981:434; Li et al.,1990:16)

Haematoleocha yunnana Hsiao et Ren, 1981:434.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南。

Labidocoris elegans Mayr 晦鉗獵蝽 (Hsiao et al., 1981:421)

捕 食 性。

分 佈：江蘇；印度。

Labidocoris pectoralis (Stål) 亮鉗獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao et al., 1981:421; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食：蚜蟲
葉蟬
鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、浙江、江蘇、上海、山東、天津、北京、甘肅；日本。

Mendis chinensis Distant 華曼獵蝽 (Hsiao et al., 1981:422)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Mendis hainana Hsiao 海南曼獵蝽 (Hsiao et al., 1981:422)

捕 食 性。

分 佈：海南。

Mendis rufus Hsiao et Ren 紅曼獵蝽 (Hsiao et al., 1981:422; Yunn., 1987:212)

Mendis rufus Hsiao et Ren, 1981:422.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Mendis yunnanus Hsiao et Ren 雲南曼獵蝽 (Hsiao et al., 1981:423; Yunn., 1987:212)

Mendis yunnana Hsiao et Ren, 1981:423.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neozirta annulipes China 環足健獵蝽 (Hsiao et al.,1981:420)

捕 食 性。

分 佈：浙江、陝西、北京。

Parascadra rubida Hsiao 紅副斯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:435)

捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰南岸)。

Physorhynchus eidmanni Taeuber 杭州六節獵蝽 (Hsiao et al., 1981:421)
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州)。

Rhysostethus glabellus Hsiao 皺背獵蝽 (Hsiao et al., 1981:430)
捕 食 性。
分 佈：四川(峨眉山)。

Scadra militaris Distant 紅斯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:431)
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Scadra rubida Hsiao 滇紅斯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:431; Li et al.,, 1990:16)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南。

Scadra wuchengfui China 褐斯獵蝽 (He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:431)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：海南、廣東、廣西、雲南。

Tamaonia montana Hsiao 山達獵蝽 (Hsiao et al., 1981:429; Li et al., 1990:16)
捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江(莫干山)。

Tamaonia pilosa China 毛達獵蝽 (Hsiao et al., 1981:428)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Tamaonia yunnana Hsiao 雲南達獵蝽 (Hsiao et al., 1981:429; Yunn., 1987:212)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Vilius melanopterus Stål 爪盾獵蝽 (Hsiao et al., 1981:420; Yunn., 1987:212)
捕 食 性。
分 佈：雲南、江蘇、上海；馬來西亞、緬甸、印度。

Piratinae 盜獵蝽亞科

Androclus granulatis Stål 粒寬背獵蝽 (Yunn., 1987:209)

捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Ectomocoris atrox Stål 黑哎獵蝽 (He et al., 1991:83; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:440; Li et al.,, 1990:18; Ren, 1992:175; Yunn., 1987:211; Zhang, 1985: 180)
Ectomocoris atrox Stål, 1855:
捕 食：稻飛蝨
葉蟬
蚜蟲
獵食多種鱗翅目幼蟲，是果林常見捕食性天敵。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、江蘇、陝西；菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Ectomocoris biguttulus Stål 二星哎獵蝽 (He et al., 1991:84; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981: 440; Li et al., 1990:18; Yunn., 1987:211; Zhang, 1985:180)
捕 食：(稻田)
鱗翅目幼蟲及蚜蟲等，是果樹、林木中常見捕食性天敵。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南；菲律賓、馬來西亞、緬甸、斯里蘭卡。

Ectomocoris erebus Distant 黑喙哎獵蝽 (Yunn., 1987:211)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Ectomocoris flavomaculatus Stål 黃斑艾獵蝽 (He et al., 1991:84; Hsiao, 1974:323; Li et al., 1990:18)
捕 食：水稻害蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南。

Lestomerus affinis Amyot et Serville 黑股隸獵蝽 (Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:441; Li et al., 1990:18; Yunn., 1987:210)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、上海；馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

Lestomerus femoralis Walker 紅股隸獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:441; Hun., 1992:282; Ren, 1992:196; Yunn., 1987:211; Zhang, 1987[ed.] 1:110)
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；印尼、緬甸、印度。

Phalantus geniculatus Stål 伐獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:439; Li et al., 1990:17; Yunn., 1987:209; Zhang, 19878[ed.] 1:111)
別 名：*黃頸烏蠟蝽*。
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣東沿海島嶼、廣西、雲南、四川、湖北；日本、緬甸、印度。

Pirates arcuatus (Stål) 日月盜獵蝽 (ASZI et al., 1978:243; He et al., 1991:85; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:442; Hun., 1992:283; Li et al., 1990:19; Sun et al., 1980(4):23; Wang et al., 1989:117; Zhang, 1985:181; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

別 名：*日月獵蝽，穹紋盜獵蝽*。

捕 食：多活動於稻叢基部，在花生、黃豆田亦常發現，獵食多種鱗翅目幼蟲，是常見農作物害蟲捕食天敵，亦在荻和蘆葦田獵食。

蚜蟲
薊馬
葉蟬
鱗翅目(幼蟲)
瓢蟲

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；日本、菲律賓、越南、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

Pirates (Cleptocoris) atromaculatus Stål 黃紋盜獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao, 1074:323; Hsiao et al., 1981: 443; Hun., 1992:283; Li et al., 1990:19; Ren, 1992:196; Wang et al., 1989:117; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

別 名：*橙斑盜獵蝽*。

捕 食：(稻田、荻和蘆葦田)。

分 佈：江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、北京；菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Pirates (Cleptocoris) fulvescens Lindberg 茶褐盜獵蝽 (Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:443)

捕 食 性。

分 佈：山東、河北、天津、北京。

Pirates (Cleptocoris) lepturoides (Wolff) 細盜獵蝽 (Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:442; Li et al., 1990:19; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、雲南、四川、湖北、河北；印尼、緬甸、斯里蘭卡。

Pirates quadrinotatus Fabricius 四點盜獵蝽 (Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:442)

捕 食 性。

分 佈：中國；日本、菲律賓、爪哇、印度、斯里蘭卡。

Pirates (Cleptocoris) turpis Walker 污黑盜獵蝽 (ASZI et al., 1978:243; He et al., 1991:85; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:443; Ren, 1992:175; 1997:261; Yunn., 1987:210; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

Pirates turpis Walker, 1873:

別 名；*烏獵蝽*。

捕 食：葉蟬、薊馬。

分 佈：江西、湖南、廣東及沿海島嶼、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅；日本、越南。

Sirthenea dimidiata Horvàth 半黃足獵椿 (Cai et Lu, 1990:89; He et al., 1991:86; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:444; Hun., 1992:282; Li et al., 1990:20; Yunn., 1987:211; Zhang, 1987[ed.] 1:112)

Sirthenea dimidiata Horvàth, 1911:33.

捕 食：蟎類
蚜蟲
葉蟬
鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、四川、安徽。

Sirthenea flavipes (Stål) 黃足獵椿 (ASZI, 1986, 1:405; ASZI et al., 1978:244; Cai et Lu, 1990:87; He et al., 1991:87; Hsiao, 1974:323; Hsiao et al., 1981:444; Hun., 1992:282; Li et al., 1990:20; Ren, 1988:105; Ren et Bu, 1995:137; Sun et al., 1980(4):23; Wang et al., 1989:117; Yunn., 1987:211; Zhang, 1985:181; Zhang, 1987[ed.] 1:112; Zong et al., 1984:249)

Rasahus flavipes Stål, 1855:187.
=*Rasahus cumingi* Dohrn, 1860:407.
Sirthenea flavipes Stål, 1866:252.
=*Pirates strigifer* Walker, 1873:116.
=*Pirates basiger* Walker, 1873:117.
=*Pharantes geniculatus* Matsumura, 1905:41 (*nec* Stål)
Sirthenea flavipes, Hsiao et al., 1981:444.

捕 食：葉蟬
蚜蟲
椿
鱗翅目(幼蟲)
葉甲
蟎類
Pectinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲(卵、幼蟲)
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵、幼蟲)
水旱田鱗翅目(幼蟲)

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼。

Sirthenea flavipes f. **apicalis** Sign (Cai et Lu, 1990:89)

Rasahus apicalis Sign, 1862:125.
=*Pirates strigifer* Walker, 1873:112, 116, 71.
=*Pirates basifer* Walker, 1873:112, 117, 72.
Sirthenea flavipes var. *apicalis,* Horvàth, 1909:359.
=*Sirthenea clavata* Miller, 1948:444.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西；日本、婆羅洲、爪哇、印度。

Reduviinae 獵椿亞科

Acanthaspis cincticrus Stål 淡帶荆獵蝽 (ASZI et al., 1978:240; Chen et al., 1993:132; He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:457; Hun., 1992:283; Li et al., 1990:21; Yunn., 1987:219; Zhang, 1985: 181; Zhang, 1987[ed.] 1:108)

別 名：*白帶獵蝽*。

捕 食：成蟲食性較廣，主要捕食蚜蟲、葉蟬和鱗翅目幼蟲。在水稻區可捕食食多種水稻害蟲，若蟲則主要捕食螞蟻和小蜘蛛類，亦在棗樹捕食害蟲

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅；日本、緬甸、印度。

Acanthaspis collaris Hsiao 四斑荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:455; Yunn., 1987:218)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Acanthaspis fuscinervis Hsiao 槽斑荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:457; Yunn., 1987:219)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Acanthaspis geniculata Hsiao 圓斑荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:456; Li et al., 1990:20; Yunn., 1987:219)

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

Acanthaspis immodesta Bergroth 紅足荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:455)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Acanthaspis picta Hsiao 連斑荆獵蝽 (He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:456; Yunn., 1987:218)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：雲南。

Acanthaspis quinquespinosa (Fabricius) 黑荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:455)

捕 食 性。

分 佈：海南；緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

Acanthaspis ruficeps Hsiao 紅荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:457; Li et al., 1990:21; Yunn., 1987:218)

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南。

Acanthaspis subnerrmis Hsiao 異斑荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:454; Yunn., 1987:218)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Acanthaspis tenebrosa Stål 圓肩荆獵蝽 (Hsiao et al., 1981:454)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海島嶼。

Acanthaspis westermanni Reuter 黃革荊獵蝽 (Hsiao et al., 1981:457)

Acanthaspis westermanni Reuter
=*Acanthaspis aberrens* China, (syn. by Hsiao, et al., 1981:457)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Agriosphodus dohrni (Signoret) 田蠟蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:108)

捕 食：核桃扁葉甲 等。
分 佈：江西。

Allaeocranum biannulipes Montr. et Sign. 雙環躍獵蝽 (Hsiao et al., 1981:458)

捕 食：*Minthea rugicollis* (Walker) 鱗毛粉蠹(成蟲)
Tribolium castaneum (Hbst.) 赤擬穀盜(成蟲)
分 佈：海南；馬來西亞、緬甸、印度西部、斯里蘭卡、中美。

Apechtia tofaikwongi China 爭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:447; Yunn., 1987:215)

捕 食 性。
分 佈：海南、雲南。

Brachytonus bicolor China 二色短獵蝽 (Hsiao et al., 1981:463; Yunn., 1987:220)

捕 食 性。
分 佈：雲南。

Brachytonus nigripes Hsiao 黑足短獵蝽 (Hsiao et al., 1981:463; Li et al., 1990:22; Yunn., 1987:221)

捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南；越南。

Coranus fuscipennis Reuter 斑緣土獵蝽 (Ren, 1997:264)

Coranus fuscipennis Reuter, 1881:
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、浙江。

Cydnocoris russatus Stål 艷紅獵蝽 (Ren, 1992:197; 1997:263)

Cydnocoris russatus Stål, 1866:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇；日本、越南。

Durganda pedestris Distant 藍光杜獵蝽 (Hsiao et al., 1981:448; Yunn., 1987:215)

捕 食 性。
分 佈：海南、雲南；越南。

Durganda rubra Amyot et Serville 紅杜獵蝽 (Hsiao et al., 1981:448)
捕 食 性。
分 佈：海南；印尼、泰國、緬甸、印度。

Durgandana formidabilis (Distant) 紅堅獵蝽 (Hsiao et al., 1981:449; Yunn., 1987:215)
捕 食 性。
分 佈：雲南；越南。

Inara alboguttata Stål 淡斑虎獵蝽 (Hsiao et al., 1981:454; Yunn., 1987:217)
捕 食 性。
分 佈：雲南；越南、緬甸。

Isyndus obscurus (Dallas) 褐菱獵蝽 (Ren, 1992:178; 1997:263)
Isyndus obscurus (Dallas, 1850:)
捕 食：松毛蟲(幼蟲)、天幕毛蟲(幼蟲)
鱗翅目幼蟲。
分 佈：福建、江西、雲南、西藏、四川、江蘇、安徽、陜西、山東、山西、河北；朝鮮、日本、印度、不丹。

Isyndus planicollis Lindberg 淡色菱獵蝽 (Ren, 1992:178)
Isyndus planicollis Lindberg, 1934:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅。

Isyndus yunnanus Ren 雲南菱獵蝽 (Ren, 1992:178)
Isyndus yunnanus Ren, 1986:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Opinus bicolor Hsiao 黑片獵蝽 (Hsiao et al., 1981:451; Yunn., 1987:216)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Opinus rufus (Laporte) 紅片獵蝽 (Hsiao et al., 1981:451; Yunn, 1987.:216)
捕 食 性。
分 佈：雲南；印尼。

Pasira perpusilla (Walker) 帕獵蝽 (Hsiao et al., 1981:453; Yunn., 1987:217)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸。

Pasiropsis bicolor Hsiao 褐突胸獵蝽 (Hsiao et al., 1981:453; Yunn., 1987:217)

捕 食 性。
分 佈：雲南。

Pasiropsis maculata Distant 青突胸獵蝽 (Hsiao et al., 1981:453; Yunn., 1987:217)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸。

Peregrinator biannulipes Montrouzier et Signoert 雙環躍獵蝽 (ASZI, 1986, 1:405; Zhang, 1985:182)
捕 食：若蟲及成蟲捕食鱗毛粉蠹及赤擬穀盜等倉庫害蟲，爲我國南方地區倉庫中常見天敵。
分 佈：福建、海南；菲律賓、馬來西亞、緬甸、斯里蘭卡、中美洲、西印度群島。

Psophis consanguinea Distant 紅棱頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:452; Yunn., 1987:217)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸。

Reduvius bicolor Ren 雙色獵蝽 (Ren, 1981:178)
捕 食 性。
分 佈：西藏(芒康)。

Reduvius decliviceps Hsiao 背同色獵蝽 (Hsiao et al., 1981:459)
捕 食 性。
分 佈：江蘇(南京)。

Reduvius fasciatus Reuter 黑腹獵蝽 (Hsiao et al., 1981:462; Ren, 1992:176)
Reduvius fsciatus Reuter, 1887:
=*Reduvius ursinus* Jak. (syn. by Hsiao et al., 1981:462)
捕 食 性。
分 佈：四川、山東、河北、北京、甘肅。

Reduvius gregoryi China 雙色背獵蝽 (Hsiao et al., 1981:460)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Reduvius lateralis Hsiao 紅緣獵蝽 (Hsiao et al., 1981:461; Li et al., 1990:22; Ren, 1992:176; 1997:261; Yunn., 1987:219)
Reduvius lateralis Hsiao, 1976:
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、四川、湖北。

Reduvius nigerrimus Hsiao 黑背獵蝽 (Hsiao et al., 1981:460; Yunn., 1987:220)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Reduvius nigrorufus Hsiao 紅斑獵蝽 (Hsiao et al., 1981:462)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Reduvius ruficeps Hsiao 紅頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:460; Yunn., 1987:219)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Reduvius tenebrosos Walker 橘紅背獵蝽 (Hsiao et al., 1981:461; Hun., 1992:283; Li et al., 1990:21; Ren, 1992:176; 1992:196; Yunn., 1987: 220; Zhang, 1987[ed.] 1:112)
Reduvius tenebrosos Walker, 1873:
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇。

Reduvius testaceus Herrich-Schaeffer 伏刺獵蝽 (Hsiao et al., 1981:459)
捕 食 性。
分 佈：甘肅、寧夏、內蒙古；歐洲南部。

Tapeinus fuscipennis Stål 紅平腹獵蝽 (Hsiao et al., 1981:450; Ren, 1988:105; Yunn., 1987:216)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南、西藏；緬甸、印度。

Tapeinus singularis (Walker) 褐平腹獵蝽 (Hsiao et al., 1981:451)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南；馬來西亞、印尼、緬甸。

Tiarodes salvazai Miller 紅滑獵蝽 (Hsiao et al., 1981:450)
捕 食 性。
分 佈：海南；越南。

Velitra incontaminata Bergroth 黑翅委獵蝽 (Hsiao et al., 1981:449)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Velitra melanomeris Distant 斑翅委獵蝽 (Hsiao et al., 1981:449)
捕 食 性。
分 佈：海南；越南。

Velitra rubropicta (Amy. et Serv.) 赭斑獵蝽 (ASZI et al., 1978:245)
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、巴基斯坦。

Velitra sinensis Walker 黑脛委獵蝽 (Hsiao et al., 1981:450)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海島嶼；斯里蘭卡。

Stenopodinae 細足獵蝽亞科

Aulacogenis corniculata Stål 顯頰獵蝽 (Hsiao et al., 1981:477; Li et al.,1990:27; Yunn., 1987:225)

捕 食 性。

分 佈：廣東、廣西、雲南；菲律賓、印尼(爪哇)、斯里蘭卡。

Canthesancus dislurco Hsiao 六斑獵蝽 (Hsiao, 1977:79; Hsiao et al., 1981:479)

Canthesancus dislurco Hsiao, 1977:79.

捕 食 性。

分 佈：雲南(景東)。

Canthesancus geniculatus Distant 小菱斑獵蝽 (Hsiao et al., 1981:479; Hun., 1992:284; Zhang, 1987[ed.] 1:108)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣西、浙江。

Canthesancus helluo Stål 短斑獵蝽 (Hsiao et al., 1981:480; Li et al., 1990:27)

捕 食 性。

分 佈：廣東、廣西、雲南；加里曼丹、印度、斯里蘭卡。

Canthesancus lurco Stål 狹斑獵蝽 (Hsiao et al., 1981:480)

捕 食 性。

分 佈：雲南、東南沿海島嶼、安徽。

Caunus noctulus Hsiao 垢獵蝽 (Hsiao, 1977:74; Hsiao et al., 1981:477; Li et al., 1990:27)

Caunus noctulus Hsiao, 1977:74.

捕 食 性。

分 佈：福建、廣西、雲南(景東)、四川、浙江。

Isyndus obscurus (Dallas) 褐菱獵蝽 (ASZI et al., 1978:243; Chen, 1993:46; Gao et Zhang, 1994(1):47; Hun., 1992:284; Ren 1981:179)

別 名：*茶褐獵蝽*。

捕 食：馬尾松毛蟲(幼蟲)、天幕毛蟲

蚜蟲等

Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏(芒康)、四川、浙江、安徽、山東、陝西、河北、北京、吉林；朝鮮、日本、印度、不丹。

Isyndus yunnananus Ren 雲南菱獵蝽 (Ren, 1986:139)

Isyndus yannananus Ren, 1986:139.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Keliocoris wangi Ren 王顆粒獵蝽 (Ren, 1992:177)

Keliocoris wangi Ren, 1992:177.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Neothodelmus yangmingshengi China 長背獵蝽 (Hsiao et al., 1981:473; Li et al., 1990:25)

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。

Oncocephalus annulipes Stål 環足普獵蝽 (Hsiao, 1977:75; Hsiao et al., 1981:467; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、上海、山西、天津；爪哇、印度、斯里蘭卡。

Oncocephalus breviscutum Reuter 雙環普獵蝽 (Hsiao, 1977:76; Hsiao et al., 1981:466; Hun., 1992:284; Li et al., 1990:23; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

Oncocephalus breviscutum Reuter, 1882:64.

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣西、浙江；印尼(爪哇、加里曼丹)。

Oncocephalus confusus Hsiao 短翅普獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao, 1977:76; Hsiao et al., 1981: 468; Li et al., 1990:23; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

Oncocephalus confusus Hsiao, 1977:76.

捕 食：蚜蟲
葉蟬
鱗翅目(幼蟲)

分 佈：江西、廣西、浙江、江蘇、上海、河北、北京、黑龍江(哈爾濱)。

Oncocephalus impudicus Reuter 粗股普獵蝽 (Hsiao, 1977:76; Hsiao et al., 1981:470; Li et al., 1990:24; Yunn., 1987:222; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；越南、印尼、緬甸、印度；斯里蘭卡。

Oncocephalus impurus Hsiao 顆普獵蝽 (Hsiao, 1977:78; Hsiao et al., 1981:469; Li et al.,1990:24; Yunn., 1987: 223)

Oncocephalus impurus Hsiao, 1977:78.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南。

Oncocephalus lineosus Distant 四紋普獵蝽 (Hsiao, 1977:76; Hsiao et al., 1981:470; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、河南；新加坡、斯里蘭卡。

Oncocephalus modestus Reuter (Hisao, 1977:75)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Oncocephalus notatus Klug 顯普獵蝽 (Hsiao, 1977:75; Hsiao et al., 1981:466)

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本、印度、非洲北部、歐洲。

Oncocephalus philippinus Lethierry 南普獵蝽 (ASZI et al., 1978:244; He et al., 1991:85; Hsiao, 1977:75; Hsiao et al., 1981:468; Ren, 1997:262; Sun et al., 1984:111; Yunn., 1987:222; Zhang, 1985:182; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

Oncocephalus philippinus Lethierry, 1877:

別 名：*褐獵蝽*。

捕 食：常在水稻叢間及黃豆、花生、黃麻等旱作上發現，獵食多種鱗翅目幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北；朝鮮、日本、菲律賓。

Oncocephalus pudicus Hsiao 毛眼普獵蝽 (Hsiao, 1977:77; Hsiao et al., 1981:466; Li et al., 1990:23; Ren, 1981:178; 1988:106; Yunn., 1987:222)

Oncocephalus pudicus Hsiao, 1977:77.

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)。

Oncocephalus purus Hsiao 圓肩普獵蝽 (Hsiao, 1977:78; Hsiao et al., 1981:471; Li et al., 1990:24)

Oncocephalus purus Hsiao, 1977:78.

捕 食 性。

分 佈：海南、廣東、廣西。

Oncocephalus scutellaris Reuter 盾普獵蝽 (He et a., 1991:85; Hsiao, 1977:76; Hsiao et al., 1981:469; Li et al., 1990:23; Yunn. 1987:223; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、貴州；越南、印尼。

Oncocephalus sp. 普獵蝽 (He et al., 1991:85)

捕 食：稻田害蟲。

分 佈：湖南。

Pygolampis angusta Hsiao 窄刺胸獵蝽 (Hsiao, 1977:69; Hsiao et al., 1981:475; Li et al., 1990:26; Yunn., 1987: 224; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

Pygolampis angusta Hsiao, 1977:69.

捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、雲南。

Pygolampis bidentata Coeze 雙刺胸獵蝽 (ASZI, 1986, 1:405; He et al., 1991:86; Hsiao, 1977:69; Hsiao et al., 1981:474; Li et al., 1990:25; Zhang, 1985:183)
Cimex bidentata Coeze, 1778:243.
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：湖南、廣西、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、黑龍江；廣泛分佈于歐洲。

Pygolampis brevipterus Ren 短翅刺胸獵蝽 (Ren, 1981:177; 1988:105)
Pygolampis brevipterus Ren, 1981:177
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Pygolampis cognata Horvàth 細獵蝽 (He et al., 1991:86)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：湖南。

Pygolampis foeda Stål 污刺胸獵蝽 (Hsiao, 1977:69; Hsiao et al., 1981:475; Li et al., 1990:26; Yunn., 1987:224; Zhang, 1987[ed.] 1:112)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、湖北；加里曼丹、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。

Pygolampis longipes Hsiao 小刺胸獵蝽 (Hsiao, 1977:70; Hsiao et al., 1981:475; Li et al., 1990:26; Yunn., 1987: 224)
Pygolampis longipes Hsiao, 1977:70.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南。

Pygolampis rufescens Hsiao 赭刺胸獵蝽 (Hsiao, 1977:71; Hsiao et al., 1981:477; Yunn., 1987:224)
Pygolampis rufescens Hsiao, 1977:71.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南。

Pygolampis simulipes Hsiao 中刺胸獵蝽 (Hsiao, 1977:70; Hsiao et al., 1981:476; Yunn., 1987:224)
Pygolampis simulipes Hsiao, 1977:70.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Sastrapada baerensprungi Stål 嬌梭獵蝽 (Hsiao, 1977:72; Hsiao et al., 1981:473)
捕 食 性。
分 佈：中國；馬來西亞、印度、斯里蘭卡、南非等地區。

Sastrapada brevipennis China 短翅梭獵蝽 (Hsiao, 1977:72; Hsiao et al., 1981:472; Yunn., 1987:223)

捕 食 性。

分 佈：海南、雲南。

Sastrapada marmorata Hsiao 石紋梭獵蝽 (Hsiao, 1977:72; Hsiao et al., 1981:471; Yunn., 1987:223)

Sastrpoda marmorata Hsiao, 1977:72.

捕 食 性。

分 佈：雲南(景東)。

Sastrapada oxyptera Bergroth 敏梭獵蝽 (He et al., 1991:86; Hsiao, 1977:72; Hsiao et al., 1981:472)

捕 食：稻田害蟲。

分 佈：福建、湖南、浙江；印尼(加里曼丹)。

Sastrapada robusta Hsiao 壯梭獵蝽 (He et al., 1991:86; Hsiao, 1977:73; Hsiao et al., 1981:472; Li et al., 1990:24)

捕 食：稻田害蟲。

分 佈：湖南、廣東、廣西(石牌)。

Staccia diluta Stål 舟獵蝽 (ASZI, 1986, 1:406; He et al., 1991:87; Hsiao et al., 1981:465; Li et al., 1990:22; Ren, 1997:261; Sun et al., 1980(4):23; Yunn., 1987: 222; Zhang, 1985:183; Zhang, 1987[ed.] 1:112)

別 名：*淡色獵蝽*。

捕 食：稻飛蝨(短翅型成蟲爲主)

稻葉蟬

鱗翅目(幼蟲)

爲水稻害蟲最常見捕食性天敵。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北；越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Stachyotropha punctifera Stål (Hsiao et al., 1981:465)

捕 食 性。

分 佈：福建(福州)。

Tapirocoris annulatus Hsiao et Ren 環塔獵蝽 (Ren, 1997:262)

Tapirocoris annulatus Hsiao et Ren, 1981:

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北。

Thodelmus falleni Stål 敏獵蝽 (Hsiao et al., 1981:480; Hun., 1992:284; Li et al., 1990:28; Yunn., 1987:225; Zhang, 1987[ed.] 1113)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川；斯里蘭卡。

Rhaphidosominae 桿獵蝽亞科

Hoffmannocoris spinicollis China 桿獵蝽 (Hsiao et al., 1981:481; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食 性。

分 佈：江西、海南、廣西。

Harpactorinae 真獵蝽亞科

Agriosphodrus dohrni (Signoret) 暴獵蝽 (ASZI, 1986, 1:407; ASZI et al., 1978:241; He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:523; Hun., 1992:285; Qi et al., 1983:54; Yunn., 1987:226, 240; Zhang, 1985:183; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

Eulyes dohrni Signoret

別 名：*圓腹獵蝽*。

捕 食：葉甲幼蟲，如核桃扁葉甲(*Gastrolina depressaa* Baly)

松毛蟲

斑蛾科幼蟲

稻葉蟬

稻飛蝨

鱗翅目(卵、幼蟲)

Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅、華北；日本、越南、印度。

Astinus siamensis Distant 秀獵蝽 (Hsiao, 1979:253; Hsiao et al., 1981:496; Yunn., 1987:230)

Astinus siamensis Distant, 1903:248.

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南、泰國。

Biasticus abdominalis Reuter 腹壯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:537)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海島嶼；緬甸。

Biasticus confusus Hsiao 艷腹壯獵蝽 (Hsaio, 1979:138; Hsiao et al., 1981:537; Li et al., 1990:41)

Biasticus confusus Hsiao, 1979:138-139.

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西。

Biasticus flavus (Distant) 黃壯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:538; Li et al., 1990:42; Ren, 1981:182; 1992:181; Yunn., 1987;250)

Biasticus flavus (Distant, 1903:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、東南及沿海島嶼、海南、廣西、雲南、西藏(樟木、聶拉木)；日本、馬來西亞、緬甸、印度、爪哇(加里曼丹、爪哇)。

Biasticus minus Hsiao 小壯獵蝽 (Hsiao, 1979:138; Hsiao et al., 1981:538; Li et al., 1990:41; Yunn., 1987:249)

Biasticus minus Hsiao, 1979:138.

捕 食 性。
分 佈：海南、雲南(金平猛喇、西雙版納)。

Biasticuis ventralis Hsiao 黑腹壯獵蝽 (Hsiao, 1979:137; Hsiao et al., 1981:537; Yunn., 1987:249)
Biasticuis ventralis Hsiao, 1979:137138.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Coranus choui Lu et Cai 周氏土獵 (Lu et Cai, 1989:193)
Coranus choui Lu et Cai, 1989:193.
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Coranus emodicus Kiritschenko 黃緣土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:515; Ren, 1981:180; 1984:283)
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木、吉隆、錯那)；錫金、印度(大吉嶺)。

Coranus fuscipennis Reuter 斑緣土獵蝽 (He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:516; Li et al., 1990:36; Ren, 1984:282; Yunn., 1987:237)
捕 食：小蟲(稻田)。
分 佈：海南、廣東、廣西、雲南、西藏、浙江；緬甸、印度。

Coranus guttatus Ren 淡斑土獵蝽 (Ren, 1984:284)
Coranus guttatus Ren, 1984:284.
捕 食 性。
分 佈：新疆(石河子)。

Coranus hammarstroemi Reuter 顯脈土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:514)
捕 食 性。
分 佈：四川、山西、內蒙古；西伯利亞。

Coranus lativentris Jakovlev 中黑土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:513; Ren, 1984:280; Zhang, 1985:184)
捕 食：鱗翅目幼蟲、蚜蟲等小蟲。
分 佈：四川、陝西、河南、山東、山西、天津、北京、新疆、內蒙古。

Coranus magnus Hsiao et Ren 大土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:514; Ren, 1984:281)
Coranus magnus Hsiao et Ren, 1981:514.
捕 食 性。
分 佈：陝西、河北、內蒙古、黑龍江。

Coranus marginatus Hsiao 紅緣土獵蝽 (Hsiao, 1979:151; Hsiao et al., 1981:515; Ren, 1984:282; 1988:106; 1992:179; Yunn., 1987:237)
Coranus marginatus Hsiao, 1979:151-152.

捕 食 性。
分 佈：雲南(保山、西雙版納)、西藏(墨脫)。

Coranus sichuensis Hsiao et Ren 四川土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:516; Ren, 1984:282; 1992:179)
Coranus sichuensis Hsiao et Ren, 1981:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川(康定)。

Coranus spiniscutis Reuter 黑尾土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:516; Ren, 1984:283; Zhang, 1987[ed.] 1:108)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南(西雙版納)；越南、爪哇、緬甸、印度。

Coranus stenopygus Putshkov 狹臀土獵蝽 (Lu et Cai, 1989:192)
Coranus stenopygus Putshkov, 1982:190.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、甘肅、內蒙古(包頭)；蒙古、蘇聯。

Coranus tibetensis China 西藏土獵蝽 (Hsiao et al., 1981:514; Ren, 1981:170; 1984:283)
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Coranus sp. 土獵蝽 (He et al., 1991:83)
別 名：*黑色獵蝽*。
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
分 佈：福建。

Cosmolestes annulipes Distant 環勻獵蝽 (ASZI et al., 1978:242; He et al., 1991:83; Hsiao, 1979:150; Hsiao et al., 1981:527; Sun et al., 1984:111; Yunn., 1987:244; Zhang, 1987[ed.] 1:108)
Cosmolestes annulipes Distant, 1879:132.
別 名：*環足獵蝽*。
捕 食：跳蛃
稻田葉蟬、稻飛蝨、蠟蟬
盲蝽、長蝽、緣蝽
蝶類幼蟲
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南(河口、金平、普洱、西雙版納)、江蘇；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Cosmolestes nigrinus Distant 黑翅勻獵蝽 (Hsiao et al., 1981:528)
捕 食 性。
分 佈：海南；越南。

Cosmolestes pulcher Hsiao 麗勺獵蝽 (Hsiao, 1979:149; Hsiao et al., 1981:527; Li et al., 1990:38)

Cosmolestes pulcher Hsiao, 1979:149-150.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Cosmolestes yunnanus Hsiao 雲南勺獵蝽 (Hsiao, 1979:149; Hsiao et al., 1981:528:Yunn., 1987:245)

Cosmolestes yunnanus Hsiao, 1970:149.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Cydnocoris binotatus Hsiao 雙斑紅獵蝽 (Hsiao, 1979:238; Hsiao et al., 1981:510; Ren, 1988:106; Yunn., 1987:236)

Cydnocoris binotatus Hsiao1979:238-239.

捕 食 性。

分 佈：廣東、雲南(墨脫)。

Cydnocoris fasciatus Reuter 烏帶紅獵蝽 (Li et al., 1990:35; Ren, 1988:106; Yunn., 1987:237)

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)；馬來西亞、印度。

Cydnocoris geniculatus Hsiao 玟腹紅獵蝽 (Hsiao, 1979:240; Yunn., 1987:236; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

Cydnocoris geniculatus Hsiao, 1979:240.

捕 食 性。

分 佈：江西、雲南(西雙版納)。

Cydnocoris gilvus (Burmeister) 橘紅獵蝽 (Hsiao, 1979:238; Hsiao et al., 1981:511; Yunn., 1987:236)

Myocoris gilvus Burmeister, 1838:104.

Cydnocoris gilvus, Distant, 1904:229.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南(西雙版納、景谷、景東)；爪哇、蘇門答臘、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Cydnocoris hyalinus Miller 二星紅獵蝽 (Hsiao, 1979:238; Hsiao et al., 1981:513; Yunn., 1987:237)

Cydnocoris hyalinus Miller, 1955:73.

捕 食 性。

分 佈：雲南(金平、思茅)；菲律賓。

Cydnocoris russatus Stål 艷紅獵蝽 (ASZI et al., 1978:244; He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:511; Hun., 1992:286; Li et al., 1990:35; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

別 名：*淡紅獵蝽*。

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、甘肅；日本、菲律賓、越南、印度。

Cydnocoris tabularis Distant 層斑紅獵蝽 (Hsiao et al., 1981:510; Yunn., 1987:236)

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)；馬來西亞。

Cydnocoris ventralis Hsiao 晦腹紅獵蝽 (Hsiao, 1979:239; Yunn., 1987:236)

Cydnocoris ventralis Hsiao, 1979:239-240.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Ectomocoris andreae (Thunberg) 黑光蠟蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Ectomocoris atrox Stål 黑哎蠟蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Endochiella angulata Hsiao 角小嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:248; Hsiao et al., 1981:503; Yunn., 1987:234)

Endochiella angulata Hsiao, 1979:248.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Endochiella capitata Hsiao 淡小嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:248; Hsiao et al., 1981:502)

Endochiella capitata Hsiao, 1979:248.

捕 食 性。

分 佈：海南(文昌)。

Endochopsis confusus Hsiao 黑背類嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:244; Hsiao et al., 1981:508; Yunn., 1987:235)

Endochopsis confusus Hsiao, 1979:244-245.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Endochopsis insularis Hsiao 島類嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:245; Hsiao et al., 1981:509)

Endochopsis insularis Hsiao, 1979:245.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Endochopsis pulcher Hsiao 麗類嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:245; Hsiao et al., 1981:509; Yunn., 1987:235)

Endochopsis pulcher Hsiao, 1979:245.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Endochopsis quadrimaculatus Hsiao 四斑類嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:244; Hsiao et al., 1981:508)

Endochopsis quadrimaculatus Hsiao, 1979:244.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(西雙版納)。

Endochus albomaculatus Stål 霜斑嗯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:506)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、雲南。

Endochus cingalensis Stål 嗯獵蝽 (Hsiao et al., 1981:506; Li et al., 1990:34; Ren, 1992:197; Yunn., 1987:234)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南；緬甸、斯里蘭卡。

Endochus niger Hisao 黑嗯獵蝽 (Hsiao, 1979:245-246; Hsiao et al., 1981:507; Li et al., 1990:34; Yunn., 1987:234)
Endochus niger Hisao, 1979:245-246.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(西雙版納)。

Endochus niger bicoloripes Hsiao 黑嗯獵蝽(橘股亞種) (Hsiao, 1979:246; Hisao et al., 1981:507)
Endochus niger bicoloripes Hsiao, 1979:246.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Endochus niger flavopectus Hsiao 黑嗯獵蝽(黑股亞種) (Hsiao, 1979:246; Hsiao et al., 1981:507)
Endochus niger flavopectus Hsiao, 1979:246.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Endochus nigricornis Stål 環角嗯獵蝽 (Li et al., 1990:34; Ren, 1992:197; Zhang, 1987[ed.] 1:109)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、湖北；日本。

Epidaucus carinatus Hsiao 脊獵蝽 (Hsiao, 1979:253; Hsiao et al., 1981:497; Li et al., 1990:31; Zhang, 1987[ed.] 1:109)
Epidaucus carinatus Hsiao, 1979:253.
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、四川、浙江。

Epidaus atrispinus Distant 小素獵蝽 (Li et al., 1990:32)
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Epidaus bicolor Distant 雙色素獵蝽 (Li et al., 1990:32)
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Epidaus famulus (Stål) 素獵蝽 (Hsiao et al., 1981:499; Hun., 1992:286; Li et al., 1990:31; Yunn., 1987:231; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川；緬甸、印度。

Epidaus longispinus Hsiao 長刺素獵蝽 (Hsiao, 1979:251; Hsiao et al., 1981:499; Hun., 1992:285; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

Epidaus longispinus Hsiao, 1979:251-252.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南。

Epidaus nebulo (Stål) 暗素獵蝽 (ASZI, 1986, 1:408; Hsiao et al., 1981:498; Li et al., 1990:31; Yunn., 1987:231; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食：鱗翅目幼蟲。

分 佈：江西、廣西、雲南、四川、黑龍江。

Epidaus sexspinus Hsiao 六刺素獵蝽 (Hsiao, 1979:250; Hsiao et al., 1981:499; Hun., 1992:286; Li et al., 1990:32; Ren, 1992:197; Yunn., 1987:232; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

Epidaus sexspinus Hsiao, 1979:250-251.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江。

Euagoras plagiatus (Burmeiter) 彩紋獵蝽 (ASZI, 1986, 1:409; He et al., 1991:84; Hun., Hsiao et al., 1981:501; 1992:288; Li et al., 1990:33; Yunn., 1987:233; Zhang, 1987[ed.] 1:109)

捕 食：稻大緣蝽、異稻緣蝽
葉甲(林間)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；菲律賓、越南、爪哇、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Euagoropsis inermis Hsiao 麗獵蝽 (Hsiao, 1979:254; Hsiao et al., 1981:501; Yunn., 1987:233)

Euagoropsis inermis Hsiao, 1979:254.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Harpactor altaicus Kiritschenko 獨環真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:531; Li et al., 1990:39)

捕 食 性。

分 佈：廣西、陝西、河北、北京、內蒙古；蒙古。

Harpactor costalis (Stål) 山彩真獵蝽 (Ren, 1981:180; 1992:179)

Harpactor costalis (Stål, 1866:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(察雅吉隆)、四川；馬來西亞、緬甸、印度。

Harpactor dauricus Kiritschenko 雙環真獵蝽 (He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:531)

捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：四川、浙江、山西、河北、甘肅、內蒙古；蘇聯。

Harpactor fuscipes (Fabricius) 紅彩真獵蝽 (ASZI, 1986, 1:407; ASZI et al., 1978:245; He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:532; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Hun., 1992:287; Li et al., 1990:39; Yunn., 1987:246; Zhang, 1985:184; Zhang, 1987[ed.] 1:110)
別 名：*黑紅捕獵蝽*。
捕 食：馬尾松毛蟲幼蟲
稻蛛緣蝽、稻大蛛緣蝽
稻飛蝨短翅型成蟲
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
鱗翅目(幼蟲)
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽；越南、寮國、馬來西亞、印尼(爪哇、蘇門答臘)、沙撈越、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Harpactor incertus (Distant) 雲斑真獵蝽 (He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:530; Hun., 1992:286; Ren, 1992:180; 1997:265; Zhang, 1987[ed.] 1:110)
Harpactor incertus (Distant, 1903:)
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本。

Harpactor iracundus Poda 麗真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:532)
捕 食 性。
分 佈：新疆(塔城)；廣泛分佈于舊北區。

Harpactor leucospilus Stål 青背真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:531)
捕 食 性。
分 佈：安徽；日本、西伯利亞、阿拉斯加、波蘭、澳洲。

Harpactor marginellus (Fabricius) 黃緣真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:533; Li et al., 1990:40; Yunn., 1987:246)
捕 食：松毛蟲(幼蟲)
松蚜。
分 佈：廣西、雲南；越南、緬甸、印度、錫金。

Harpactor mendicus (Stål) 紅股真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:532; Li et al., 1990:39)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、江蘇；馬來西亞、緬甸、印度、錫金。

Harpactor reuteri Distant 黑緣真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:530; Ren, 1981:181)
捕 食 性。
分 佈：西藏(普蘭)；印度、孟加拉、巴基斯坦、克什米爾河谷。

Harpactor rubromarginatus Jakovlev 紅緣真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:530; Hu, 1995:40-42; Ren, 1997:265; Yan et al., 1993, (2):50; Yue et al., 1990, 1:33)

Harpactor rubromarginatus Jakovlev, 1893:

捕 食：*Arge* sp. 玫瑰三節葉蜂

Perigea sp. 梔子星夜蛾

Cifuna locuples Waker 肾毒蛾

Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾

Aphis laburni Kaltenbach 槐蚜

樟子松球果上捕食害蟲。

分 佈：江西、湖北、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮。

Harpactor sibiricus Jakovlev 斑緣真獵蝽 (Hsiao et al., 1981:531; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89)

捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)。.

分 佈：大興安嶺北部、吉林、黑龍江；西伯利亞。

Harpactor sp. 真獵蝽 (Wang et al., 1992:281)

Harpactor sp. Wang et al., 1992:281

捕 食：*Neodiprion dailingensis* Xiao et Zhou 帶嶺新松葉蜂(紅松)。

分 佈：遼寧、黑龍江。

Henricohahnia cauta Miller 冡突長頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:485; Yunn., 1987:226)

捕 食 性。

分 佈：廣東、雲南；印度。

Henricohahnia monticola Hsiao et Ren 錐角長頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:486)

Henricohahnia monticola Hsiao et Ren, 1981:486.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Henricohahnia tuberosa Hsiao et Ren 雙突長頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:485; Yunn., 1987:227)

Henricohahnia tuberosa Hsiao et Ren, 1981:485.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Henricohahnia typica Distant 菱角長頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:485)

捕 食 性。

分 佈：海南；印度、錫金。

Henricohahnia vittata Miller 長頭獵蝽 (Hsiao et al., 1981:484; Li et al., 1990:28; Yunn., 1987:226)

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南；寮國。

Isyndus obscurus (Dallas) 褐菱獵蝽 (ASZI, 1986, 1:408; He et al., 1991:84; Hsiao et al., 1981:494; Li et al., 1990:30; Ren, 1992:1197; Yunn., 1987:226; Zhang, 1985:184; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食：(稻田)

松毛蟲(幼蟲)、天幕毛蟲(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京；日本、印度、不丹。

Isyndus planicollis Lindberg 淡色菱獵蝽 (Hsiao et al., 1981:494)

捕 食 性。

分 佈：四川、甘肅。

Isyndus reticulatus Stål 錐盾菱獵蝽 (ASZI, 1986, 1:408; Hsiao et al., 1981:495; Li et al., 1990:30; Liu et al., 1999, 21(3):99; Yunn., 1987:229)

捕 食：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、浙江；印度。

Isyndus sinicus Hsiao et Ren 華菱獵蝽 (Hsiao et al., 1981:495; Li et al., 1990:31; Ren, 1988:106; 1992:1197; Yunn., 1987:230)

Isyndus sinicus Hsiao et Ren, 1981:495.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川。

Karenocoris granulus Hsiao et Ren 沙獵蝽 (Hsiao et al., 1981:488; Yunn., 1987:227)

Karenocoris granulus Hsiao et Ren, 1981:488.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Karenocoris rudis Hsiao et Ren 角沙獵蝽 (Hsiao et al., 1981:487; Yunn., 1987:227)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Lanca major Hsiao 大矛獵蝽 (Hsiao, 1979:250; Hsiao et al., 1981:497; Yunn., 1987:230)

Lanca major Hsiao, 1979:250.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Lingnania braconiformis China 嶺獵蝽 (Hsiao et al., 1981:504; Li et al.,, 1990:33)

捕 食 性。

分 佈：廣東、廣西、四川。

Macracanthopsis nigripes Distant 黑足角獵蝽 (Hsiao et al., 1981:500)

捕 食 性。

分 佈：海南；加里曼丹、印度。

Macracanthopsis nodipes Reuter 結股角獵蝽 (He et al., 1991:85; Hsiao et al., 1981:500; Li et al., 1990:32; Ren, 1988:106; Yunn., 1987:232; Zhang, 1987[ed.] 1:110)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)；越南、馬來西亞、緬甸。

Narsetes longinus Distant 平背獵蝽 (Hsioa et al., 1981:524; Yunn., 1987:238)

捕 食 性。

分 佈：雲南(河口)；緬甸、印度。

Narsetes rufipennis Ren 紅平背獵蝽 (Ren, 1988:106)

Narsetes rufipennis Ren, 1988:106.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Panthous excellens Stål 黑匿盾獵蝽 (Hsiao, 1979:150; Hsiao et al., 1981:517; Ren, 1981:179; 1988:107)

Panthous excellens Stål, 1863:42.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)；印度。

Panthous ruber Hsiao 紅匿盾獵蝽 (Hsiao, 1979:150; Hsiao et al., 1981:517)

Panthous ruber Hsiao, 1979:150.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Parendochus leptocorisoides (China) 棒獵蝽 (Hsiao, 1979:247; Hsiao et al., 1981:510; Li et al., 1990:35; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

Endochus leptocorisoides China

Parendochus leptocorisoides, Hsiao, 1979:247.

捕 食 性。

分 佈：江西、廣東、海南、廣西、雲南(普洱)。

Platymerus laevicollis Distant 大紅紋獵蝽 (Hsin et Chu, 1971:185)

別 名：*大紅紋食蟲椿象*。

捕 食：*Oryctes rhinoceros* Linnaeus 犀角金龜(馬來西亞)。

分 佈：臺灣(1971 年由馬來西亞引進)；馬來西亞。

Polididus armatissimus Stål 棘獵蝽 (ASZI, 1986, 1:406; He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:490; Li et al., 1990:29; Sun et al., 1980(4):23; Yunn., 1987:228; Zhang, 1985:185; Zhang, 1987[ed.] 1:111)

捕 食：爲南方水稻害蟲常見捕食天敵。

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
鱗翅目(幼蟲)
蜘蛛
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江、安徽、湖北；日本、越南、馬來西亞、印尼(爪哇、蘇門答臘)、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Rihirbus sinicus Hsiao et Ren 華齒脛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:494)
Rihirbus sinicus Hsiao et Ren, 1981:494.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Rihirbus trochantericus Stål 多變齒獵蝽 (Hsiao et al., 1981:493; Li et al., 1990:30; Yunn., 1987:229)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南；印度、斯里蘭卡。

Scipinia erinacea Stål 多刺淡脈獵蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:112)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Scipinia horrida Stål 輪刺獵蝽 (ASZI, 1986, 1:406; He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:492; Hun., 1992:285; Li et al., 1990:29; Ren, 1988:106; 1992:197; Sun et al., 1980(4):23; Yunn., 1987:228; Zhang, 1985:185; Zhang, 1987[ed.] 1:112)
捕 食：*Dendrolimius punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。
稻飛蝨、稻葉蟬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、陝西；菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

Scipinia subula Hsiao et Ren 角輪刺獵蝽 (Hsiao et al., 1981:491)
Scipinia subula Hsiao et Ren, 1981:491.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Sclomina erinacea Stål 齒緣刺獵蝽 (Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:86; Hsiao et al., 1981:490; Hun., 1992:285; Li et al., 1990:29; Ren, 1992:197)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、安徽、湖北。

Serendiba hymenoptera China 膜翅塞獵蝽 (Ren, 1992:197)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、四川、湖北。

Serendiba nigrospina Hsiao 黑刺塞獵蝽 (Hsiao, 1979:20; Hsiao et al., 1981:503; Li et al., 1990:33)
Serendiba nigrospina Hsiao, 1979:240-241.

捕 食 性。
分 佈：廣東、海南、廣西。

Serendus flavonotus Hsiao 黃背雅獵蝽 (Hsiao, 1979:243; Hsiao et al., 1981:504)
Serendus flavonotus Hsiao, 1979:243.
捕 食 性。
分 佈：湖北(武昌珞珈山)。

Serendus geniculatus Hsiao 斑腹雅獵蝽 (Hsiao, 1979:242; Hsiao et al., 1981:505)
Serendus geniculatus Hsiao, 1979:242-243.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Sphedanolestes anellus Hsiao 小紅猛獵蝽 (Hsiao, 1979:139; Hsiao et al., 1981:535; Yunn., 1987:247)
Sphedanolestes anellus Hsiao, 1979:139-140.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Sphedanolestes annulipes Distant 雙環猛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:536; Li et al., 1990:41; Yunn., 1987:247)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(景東、河口、墨江、瀾滄、思茅、西雙版納)；緬甸。

Sphedanolestes bicolor Hsiao 二色猛獵蝽 (Hsiao, 1979:140; Hsiao et al., 1981:536; Yunn., 1987:248)
Sphedanolestes bicolor Hsiao, 1979:140.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Sphedanolestes granulipes Hsiao et Ren 黃顆猛獵蝽 (Ren, 1981:181)
Sphedanolestes granulipes Hsiao et Ren, 1981:181.
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)。

Sphedanolestes gularis Hsiao 紅緣猛獵蝽 (ASZI, 1986, 1:410; Hsiao, 1979:139; Hsiao et al., 1981:535; Hun., 1992:287; Li et al., 1990:41; Ren, 1988:107; Ren, 1992:198; 1997:265; Yunn., 1987:247; Zhang, 1987[ed.] 1:112)
Sphedanolestes gularis Hsiao, 1979:139.
別 名：*猛獵蝽*。
捕 食：山竹緣蝽。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、湖北。

Sphedanolestes impressicollis (Stål) 環斑猛獵蝽 (ASZI, 1986, 1:410; ASZI et al., 1978:244: Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:87; Hsiao et al., 1981:533; Hun., 1992:288; Li et al., 1990:40; Ren, 1992:180; 1992:198; 1997:266; Ren et Bu, 1995:137; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yunn., 1987:246; Zhang, 1985:185; Zhang, 1987[ed.] 1:112)
Sphedanolestes impressicollis (Stål, 1861:)
別 名：*細頸獵蝽*。

捕 食：(稻田)

Megacopta majuscula Hsiao et Jin 巨豆龜蝽

小長蝽(福建)

樟螢、葉甲、龜

松毛蟲(幼蟲)

Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾

花布麗燈蛾

鱗翅目幼蟲

葉蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陜西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、越南、印度。

Sphedanolestes pilosus Hsiao 斑腹猛獵蝽 (Hsiao, 1979:140; Hsiao et al., 1981:534; Ren, 1992:180; Yunn., 1987:247)

Sphedanolestes pilosus Hsiao, 1979:140-141.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Sphedanolestes pubinotum Reuter 赤腹猛獵蝽 (Hsiao et al., 1981:534; Li et al., 1990:40; Ren, 1981: 182; 1988: 107; 1992:180; 1992:198; Yunn., 1987:246; Zhang, 1987[ed.] 1:112)

Sphedanolestes pubinotum Reuter, 1881:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川；馬來西亞、緬甸、印度、錫金、印尼(加里曼丹)。

Sphedanolestes subtilis (Jakovlev) 斑緣猛獵蝽 (He et al., 1991:87; Hsiao et al., 1981:534; Ren, 1992: 180)

Sphedanolestes subtilis (Jakovlev, 1893:)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：福建、江西、四川、浙江、江蘇、湖北、甘肅。

Sphedanolestes trichrous Stål 紅猛獵蝽 (Hsiao, 1979:139; Hsiao et al., 1981:535; Yunn., 1987:247)

Sphedanolestes (*Haemactus*) *trichrous* Stål, 1874:34.

捕 食 性。

分 佈：雲南；斯里蘭卡。

Sycanus bicolor Hsiao 二色犀獵蝽 (Hsiao, 1979:141; Hsiao et al., 1981:523; Yunn., 1987:242)

Sycanus bicolor Hsiao, 1979:141-143.

捕 食 性。

分 佈：雲南(潞西、怒江西部河谷、西雙版納)。

Sycanus bifidus (Fabricius) 黑翅犀獵蝽 (Hsiao et al., 1981:519)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海島嶼；爪哇。

Sycanus croceovittatus Dohrn 黃帶犀獵蝽 (ASZI, 1986, 1:409; ASZI et al., 1978:242; Li et al., 1990:36; Wu et al., 1989:169-170; Yunn., 1987:240; Zhang, 1985:186)

=*Sycanus leucomesus* Walker

捕 食：常見于果樹、灌木和竹林間，獵食鱗翅目幼蟲、姬緣蝽、蚜蟲、蝗蟲、蟋蟀、蠼螋、甲蟲、葉蜂、蜘蛛等

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南(西雙版納、金平、河口)；緬甸、印度。

Sycanus croceus Hsiao 黃犀獵蝽 (Chen, 1996, 18(1):20; Hsiao, 1979:145; Hsiao et al., 1981:520; Li et al., 1990:36; Yunn., 1987:241; Zhang, 1987[ed.] 1:112)

Sycanus croceus Hsiao, 1979:145-146.

捕 食 性。

分 佈：江西、廣東、廣西、雲南。

Sycanus falleni Stål 大紅犀獵蝽 (Hsiao, 1979:146; Hsiao et al., 1981:520; Yunn., 1987:240)

Sycanus falleni Stål, 1863:34.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南；緬甸。

Sycanus fuscirostris Dohrn 黃翅犀獵蝽 (Hsiao et al., 1981:519)

Sycanus fuscirostris Dohrn, 1859:

捕 食 性。

分 佈：中國。

Sycanus insularis Hsiao 黃背犀獵蝽 (Hsiao, 1979:146; Hsiao et al., 1981:521)

Sycanus insularis Hsiao, 1979:146.

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰天池)。

Sycanus marginatus Hsiao 赭緣犀獵蝽 (Hsiao, 1979:143; Hsiao et al., 1981:520; Yunn., 1987:240)

Sycanus marginatus Hsiao1979:143.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus minor Hsiao 小犀獵蝽 (Hsiao, 1979:143; Hsiao et al., 1981:521)

Sycanus minor Hsiao,1979:143.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus rufus Hsiao 紅犀獵蝽 (Hsiao, 1979:141; Hsiao et al., 1981:522; Yunn., 1987:242)

Sycanus rufus Hsiao, 1979:141.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus croceovittatus Dohrn 黃帶犀獵 (ASZI, 1986, 1:409; ASZI et al., 1978:242; Li et al., 1990:36; Wu et al., 1989:169-170; Yunn., 1987:240; Zhang, 1985:186)

=*Sycanus leucomesus* Walker

捕 食：常見于果樹、灌木和竹林間，獵食鱗翅目幼蟲、姬緣　、蚜蟲、蝗蟲、蟋蟀、蠼　、甲蟲、葉蜂、蜘蛛等

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南(西雙版納、金平、河口)；緬甸、印度。

Sycanus croceus Hsiao 黃犀獵 (Chen, 1996, 18(1):20; Hsiao, 1979:145; Hsiao et al., 1981:520; Li et al., 1990:36; Yunn., 1987:241; Zhang, 1987[ed.] 1:112)

Sycanus croceus Hsiao, 1979:145-146.

捕 食 性。

分 佈：江西、廣東、廣西、雲南。

Sycanus falleni Stål 大紅犀獵 (Hsiao, 1979:146; Hsiao et al., 1981:520; Yunn., 1987:240)

Sycanus falleni Stål, 1863:34.

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南；緬甸。

Sycanus fuscirostris Dohrn 黃翅犀獵 (Hsiao et al., 1981:519)

Sycanus fuscirostris Dohrn, 1859:

捕 食 性。

分 佈：中國。

Sycanus insularis Hsiao 黃背犀獵 (Hsiao, 1979:146; Hsiao et al., 1981:521)

Sycanus insularis Hsiao, 1979:146.

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰天池)。

Sycanus marginatus Hsiao 赭緣犀獵 (Hsiao, 1979:143; Hsiao et al., 1981:520; Yunn., 1987:240)

Sycanus marginatus Hsiao1979:143.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus minor Hsiao 小犀獵 (Hsiao, 1979:143; Hsiao et al., 1981:521)

Sycanus minor Hsiao,1979:143.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus rufus Hsiao 紅犀獵 (Hsiao, 1979:141; Hsiao et al., 1981:522; Yunn., 1987:242)

Sycanus rufus Hsiao, 1979:141.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sycanus sichuanensis Hsiao 四川犀獵 (Hsiao, 1979:145; Hsiao et al., 1981:520; Hun., 1992:286; Ren, 1992:198; Yunn., 1987:240)

Sycanus sichuanensis Hsiao, 1970:145.
=*Sycanus szecheanus*, Hun., 1992:286.
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、四川。

Tapirocoris annuliatus Hsiao et Ren 環塔獵 (Hsiao et al., 1981:489; Ren, 1992:177; Ren et Bu, 1995:137)

Tapirocoris annuliatus Hsiao et Ren, 1981:489.
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江。

Tapirocoris densa Hsiao et Ren 齒塔獵 (Hsiao et al., 1981:488; Li et al., 1990:28; Ren, 1992:177)

Tapirocoris densa Hsiao et Ren, 1981:488.
捕 食 性。
分 佈：廣西、四川。

Tapirocoris limbatus Miller 邊塔獵 (Hsiao et al., 1981:490; Ren, 1992:178; 1992:197; Yunn., 1987:227)

Tapirocoris limbatus Miller, 1954:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、安徽、湖北；緬甸。

Vachiria clavicornis Hsiao et Ren 枯獵 (Hsiao et al., 1981:492)

Vachiria clavicornis Hsiao et Ren, 1981:492.
捕 食 性。
分 佈：山東、河北、北京。

Velinus annulatus Distant 革紅脂獵 (He et al., 1991:87; Hsiao et al., 1981:526; Li et al., 1990:37; Yunn., 1987:244)

別 名：*革紅獵* 。
捕 食：(稻田)(林區)。
分 佈：廣西、雲南(西雙版納)；緬甸、印度。

Velinus apicalis Hsiao 小脂獵 (Hsiao, 1979:147; Hsiao et al., 1981:525; Yunn., 1987:243)

Velinus apicalis Hsiao, 1979:147.
捕 食 性。
分 佈：雲南(思茅)。

Velinus malayus Stål 黃背脂獵 (Hsiao, 1979:148; Hsiao et al., 1981:526; Yunn., 1987:244)

Velinus malayus Stål, 1863:38.
捕 食 性。
分 佈：雲南；馬來半島、緬甸。

Velinus marginatus Hsiao 赭翅脂獵 (Hsiao, 1979:148; Hsiao et al., 1981:525; Li et al., 1990:37; Yunn., 1987:243)

Velinus marginatus Hsiao, 1979:148.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(屏邊大圍山)。

Velinus nodipes Uhler 黑脂獵 (ASZI, 1986, 1:407; Hsiao et al., 1981:525; Zhang, 1987[ed.] 1:113; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
其它鱗翅目幼蟲
Neodiprion guangxiicus 廣西新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、廣東沿海島嶼、廣西、四川、浙江、江蘇、河南；日本。

Velinus rufiventris Hsiao 紅腹脂獵 (Hsiao, 1979:148; Hsiao et al., 1981:526; Li et al., 1990:37; Yunn., 1987:244)
Velinus rufiventris Hsiao, 1979:148.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(屏邊大圍山、金平；西雙版納)；緬甸、印度。

Velinus sp. 脂獵 (Li et al., 1990:38)
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Vesbuys hainanensis China 海南小獵 (Hsiao et al., 1981:529)
捕 食 性。
分 佈：海南。

Vesbius purpureus (Thunberg) 紅小獵 (Hsiao et al., 1981:529; Hun., 1992:287; Li et al., 1990:39; Yunn., 1987:245)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、雲南(景谷、河口、西雙版納)；印尼(爪哇、蘇門答臘、加里曼丹)、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Vesbius sanguinosus Stål 紅股小獵 (Hsiao et al., 1981:529; Li et al., 1990:38)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西；馬來西亞、爪哇、加里曼丹、緬甸、印度。

Villanovanus nigrorufus Hsiao 黑文獵 (Hsiao, 1979:241; Hsiao et al., 1981:506; Yunn. 1987:234)
Villanovanus nigrorufus Hsiao, 1979:241.
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南。

Yangicoris geniculatus Cai 粒楊獵 (Cai, 1995:2)
Yangicoris geniculatus Cai, 1995:2.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Aptus potanini Bianchi 波姬蝽 (Ren, 1992:200)
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、西藏、四川；歐洲。

Aptus pulchellus Ren et Hsiao 麗阿姬蝽 (Ren, 1992:170; Ren et Hsiao, 1981:429)
Aptus pulchellus Ren et Hsiao, 1981:429.
捕 食 性。
分 佈：雲南(麗江)。

Arbela nitidula Stål 光棒姬蝽 (ASZI et al, 1978:240; Hsiao, 1964:80; Hsiao et al., 1981:546; He et al., 1991:81)
別 名：*光姬獵蝽*，*光姬蝽*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：江西、廣東、海南、雲南(西雙版納)、貴州、江蘇、北京；蘇門答臘、斯里蘭卡、所羅門群島、西印度群島。

Arbela polita Stål 滑棒姬蝽 (Hsiao, 1964:76; Hsiao et al., 1981:545)
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓。

Arbela pulchella Hsiao 麗棒姬蝽 (Hsiao, 1981:65; Hsiao et al., 1981:546)
Arbela pulchella Hsiao, 1981:65.
捕 食 性。
分 佈：福建(南靖)。

Arbela simplicipes (Poppius) 簡足棒姬蝽 (Hsiao, 1964:76; Hsiao et al., 1981:545; Ren et Bu, 1995:136)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江；日本。

Arbela szechuana Hsiao 川棒姬蝽 (Hsiao et al., 1981:547)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Arbela yunnana Hsiao 雲棒姬蝽 (Hsiao, 1964:80; Hsiao et al., 1981:545)
Arbela yunnana Hsiao, 1964:80.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)、四川。

Aristonabis elegantulus Schumacher (Hsiao, 1964:76)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Aristonabis hasegawai Ishihara (Hsiao, 1964:76)
捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Aspilaspis viridis Brullè (Hsiao, 1964:83)

捕 食 性。

分 佈：天津。

Aspilaspis viridulus Spinola 樫姬蝽 (Hsiao et al., 1981:556; Zhang, 1985:187)

捕 食：搖蚊、盲蝽、長蝽、小蜘蛛等。

分 佈：河北、天津；日本、中亞、伊朗、歐洲、北非。

Dolichonabis flavomarginatus (Scholtz) 黃緣修姬蝽 (Hsiao et al., 1981:556)

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古；西伯利亞、歐洲、阿拉斯加、加拿大。

Gorpis (Oronabis) brevilineatus (Scott) 山高姬蝽 (Ren, 1997:267)

Gorpis brevilineatus (Scott, 1874:)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、四川、浙江、湖北、河北；俄羅斯。

Gorpis denticollis Hsiao 齒高姬蝽 (Hsiao, 1964:77; Hsiao et al., 1981:547; Yunn., 1987:253)

Gorpis denticollis Hsiao, 1964:77.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Gorpis humeralis (Distant) 角肩高姬蝽 (Hun., 1992:288; Ren, 1992:199)

捕 食 性。

分 佈：湖南；錫金。

Gorpis japonicus Kerzhner 日本高姬蝽 (Hsiao, 1981:65; Hsiao et al., 1981:550; Zhang, 1987[ed.] 1:113)

Gorpis japonicus Kerzhner, 1968:849.

捕 食 性。

分 佈：江西、山東、北京；日本。

Gorpis liniolipes Hsiao 紋足高姬蝽 (Hsiao, 1981:65; Hsiao et al., 1981:548)

Gorpis liniolipes Hsiao, 1981:65.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Gorpis longispinis Harris 長刺高姬蝽 (Hsiao et al., 1981:547)

捕 食 性。

分 佈：海南、廣西。

Gorpis minor Hsiao 小高姬蝽 (Hsiao, 1964:77; Hsiao et al., 1981:549; He et al., 1991:82; Yunn., 1987:253)

Gorpis minor Hsiao, 1964:77.
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Gorpis yunnanus Hsiao 雲南高姬蝽 (Hsiao, 1964:78; Hsiao et al., 1981:548; Ren, 1988:111; Yunn., 1987:253)
Gorpis yunnanus Hsiao, 1964:78.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)、西藏(墨脫)。

Halonabis sinicus Hsiao 華海姬蝽 (Hsiao, 1964:82; Hsiao et al., 1981:556)
Halonabis sinicus Hsiao, 1964:82.
捕 食 性。
分 佈：河北。

Himacerus (s. str.) **apterus** (Fabricius) 泛希姬蝽 (ASZI, 1986, 1:411; Hsiao, 1964:81; Hsiao et al., 1981:555; Ren, 1992:199; 1997:268; Shu et Yu, 1985:93; Yan et al., 1993, 9(2):50)
Himacerus apterus (Fabricius, 1798:)
捕 食：葉甲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(卵、幼蟲)
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
小蛾類幼齡幼蟲。
分 佈：雲南、西藏、四川、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲、北非。

Himacerus fuscopennis Ren 栗色希姬蝽 (Ren, 1981:175; 1988:111)
Himacerus fuscopennis Ren, 1981:175.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、波密)。

Himacerus nodipes Hsiao 瘤足希姬蝽 (Hsiao, 1964:81; Hsiao et al., 1981:554; Hun., 1992:289)
Himacerus nodipes Hsiao, 1964:81.
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣西、四川。

Himacerus pulchrus Ren 麗希姬蝽 (Ren, 1988:111)
Himacerus pulchrus Ren, 1988:111.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Himacerus vicinus Hsiao 鄰希姬蝽 (Hsiao, 1981:67; Hsiao et al., 1981:554; Ren, 1992:169)
Himacerus vicinus Hsiao, 1981:67.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Himacerus xizangensis Ren 藏希姬蝽 (Ren, 1988:111; 1992:169)

Himacerus xiangensis Ren, 1988:111.

捕 食·性。

分 佈：雲南、西藏(墨脫)、四川。

Nabis (Milus) apicalis Matsumura 小翅姬蝽 (ASZI et al., 1978:239; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:231; Hsiao et al., 1981:557; Ren, 1997:268; Ren et Bu, 1995:136; Zhang, 1987[ed.] 1:113)

Nabis apicalis Matsumura, 1913:

別 名：*短翅姬獵蝽*。

捕 食：蚜蟲、葉蟬。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、湖北、甘肅；日本、俄羅斯。

Nabis (Tropiconabis) capsiformis Germae 窄姬蝽 (He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:237; Hsiao et al., 1981:560; Li et al., 1990:43; Ren, 1988: 114; 1992:171; 1997:269; Ren et Bu, 1995:136; Yunn., 1987:253)

Nabis capsiformis Germae, 1837:

別 名：*窄姬獵蝽*。

捕 食：稻田害蟲。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、湖北；日本、印度、斯里蘭卡、太平洋島嶼、非洲、南歐、南美。

Nabis christophi Dohrn 雅姬蝽 (ASZI, 1986, 1:411; Hsiao, 1964:76; Hsiao, 1964:233;)

Nabis christophi Dohrn, 1862:

捕 食：麥田小蟲。

分 佈：新疆；歐洲。

Nabis (s. str.) **consobrinus** Bianchi 小金姬蝽 (Hsiao, 1964:233; Hsiao et al., 1981:559; Ren, 1992:170)

Nabis consobrinus Bianchi, 1896:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Nabis feroides minoferus Hsiao 類原姬蝽(亞洲亞種) (He et al., 1991:82; Hsiao et al., 1981:560; Ren, 1981: 177; Zhang, 1985: 187)

別 名：*小姬蝽*。

捕 食：蚜蟲、葉蟬
薊馬
盲蝽的若蟲
蝶蛾類幼蟲。

分 佈：福建、西藏、貴州、四川、上海、安徽、河南、天津、北京、甘肅、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、中亞細亞。

Nabis ferus Linnaeus 原姬蝽 (Chen et al., 1993:133; Hsiao, 1964:234; Hsiao et al., 1981:560)

捕 食：棗樹害蟲。

分 佈：新疆；歐洲。

Nabis gigaferus Hsiao (Hsiao, 1964:233)

Nabis gigaferus Hsiao, 1964:233.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Nabis intermendius Kerzhner 塞姬蝽 (Hsiao, 1964:76, 233; Hsiao et al., 1981:559; Ren, 11992:170)

Nabis intermendius Kerzhner, 1963:

捕 食 性。

分 佈：四川、新疆、遼寧、黑龍江(滿洲里)；朝鮮半島、西伯利亞。

Nabis mandschuricus 泯姬蝽 (Wu et Chen, 1980(4):48)

Nabis mandschuricus

別 名：*長擬蠟蝽*。

捕 食 性。

分 佈：上海。

Nabis medogensis Ren 墨脫姬蝽 (Ren, 1988:113)

Nabis medogensis Ren, 1988:113.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Nabis mimoferus Hsiao 小姬蝽 (ASZI et al., 1978:238; Hsiao, 1964:234; Xie et al., 1999, 21(2):83; Zhang, 1998, 14(2):47; Zeng, 1995, 11(2):90)

Nabis mimoferus Hsiao, 1964:234.

捕 食：梨木蝨。

分 佈：福建、西藏、四川、河南、山東、北京、新疆。

Nabis nigrovittatus Ren 紋斑姬蝽 (Ren, 1981:176)

Nabis nigrovittatus Ren, 1981:176

捕 食 性。

分 佈：西藏(吉隆、聶拉木、樟木)。

Nabis (s. str.) **palifer** (Seidenstucker) 淡色姬蝽 (He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:76, 234; Hsiao et al., 1981:560; Ren, 1981:177; 1992:170; Song, 1984:84)

Nabis (s. str.) *palifer* (Seidenstucker, 1954:)

捕 食：水稻害蟲。

分 佈：湖南、西藏、四川、甘肅；蒙古西部、印度、中亞細亞、伊朗、敘利亞。

Nabis palliferus Hsiao 原姬蝽 (Hsiao, 1964:237; Li et al., 1990:43; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:118)

Nabis palliferus Hsiao, 1964:237.

捕 食 性。

分 佈：廣西、上海、湖北、天津、北京、山西。

Nabis potanini Bianchi 波姬蝽 (Hsiao, 1964:232; Hsiao et al., 1981:558; Ren, 1997:269; Yunn., 1987:254)

Nabis potanini Bianchi, 1897:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川；歐洲。

Nabis (s. str.) **pseudoferus chinensis** Ren et Hsiao 擬原姬蝽(中國亞種) (Ren, 1992:171; Ren et Hsiao, 1981:429)

Nabis pseudoferus chinensis Ren et Hsiao, 1981:429-430.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、湖北(神農架無名峰)。

Nabis (s. str.) **punctatus mimoferus** Hsiao 類原姬蝽 (Ren, 1992:171)

Nabis (s. str.) *punctatus mimoferus* Hsiao, 1964:

捕 食 性。

分 佈：福建、西藏、四川、河北、新疆。

Nabis remanei Kerzhner 雷姬蝽 (Ren et Hsiao, 1981:430)

Nabis remanei Kerzhner

捕 食 性。

分 佈：新疆；蘇聯。

Nabis reuteri Jakovlev 北姬蝽 (ASZI et al., 1978:239; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:232; Hsiao et al., 1981:558)

Nabis reuteri Jakovlev, 1878:

別 名：*寬腹姬獵蝽*。

捕 食：薊馬

稻飛蝨、稻葉蟬。

分 佈：四川、江蘇、安徽、山東、河北、北京、甘肅、吉林、黑龍江；西伯利亞、歐洲。

Nabis sauteri Poppius 紹德姬 (Hsiao, 1964:76; 232)

Nabis sauteri Poppius, 1914:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Nabis seidenstucheri pamirensis Remane 亞洲姬(帕米爾亞種) (Ren et Hsiao, 1981:431)

Nabis seidenstucheri pamirensis Remane

捕 食 性。

分 佈：青海(西寧)；蘇聯、西帕米爾地區。

Nabis semiferus Hsiao 普姬蝽 (Hsiao, 1964:232; Hsiao et al., 1981:559)

Nabis semiferus Hsiao, 1964:232.

捕 食 性。

分 佈：四川(寶興)、河北。

Nabis sinoferus Hsiao 華姬蝽 (ASZI, 1986, 1:412; ASZI et al., 1978:239; Chen et al., 1993;133; Dong, 1984:91; Fan et al., 1990:158-163; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:234; Hsiao et al., 1981:559; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1981(1-2):84; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Nan et al., 1987:125; Sui et Sun, 1996:43; Sun et al., 1984:111; Wang et al., 1991:79-81; Wu et Ji, 1989:151-155; Xie et al., 1999, 21(2):83; Zhang, 1985:188; Zhang, 1987[ed.] 1:113; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zeng, 1995, 11(2):90; Zong et al., 1986:118)

Nabis sinoferus Haiso, 1964:234.

別 名：*華姬獵蝽，華野姬蝽*。

捕 食：梨木蝨、葉蟬、蚜蟲
薊馬
盲蝽若蟲
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲
棉鈴蟲
金鋼鑽(卵)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(卵)
葉蟎
棗樹害蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；帕米爾、中亞細亞。

Nabis (s. str.) **stenoferus** Hsiao 暗色姬蝽 (ASZI, 1986, 1:412; ASZI et al., 1978:238; Cao, 1986:182; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:234; Hsiao et al., 1981:560; Li, 1981(1-2):84; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Qi et al., 1983:57; Ren, 1992:170; Sun et al., 1980(4):23; Wu et al., 1991:102; Xie et al., 1999, 21(2):83; Zhang, 1985:189; Zhang, 1987[ed.] 1:113; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:118)

Nabis stenoferus Hsiao, 1964:234.

=*Nebis palliferus* Hsiao, Misidentifired.

別 名：*窄姬獵蝽*。

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
蚜蟲
稻飛蝨(若蟲)
稻葉蟬(若蟲)
葉蟎
長蝽(若蟲)、蝽(若蟲)
棉鈴蟲(卵)
薊馬(若蟲)
小造橋蟲(卵)
鱗翅目(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林。

Nabis sp. 姬蝽 (Tian et al., 1993, 15(4):156)

Nabis sp. Tian et al., 1993:156.

捕 食：*Clostera anastomosis* Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲)

分 佈：黑龍江(海林)。

Oronabis brevilineatus (Scott) 山姬蝽 (Hsiao et al., 1981:550; Zhang, 1987[ed.] 1:113)

Nabis brevilieatus Scott
=*Oronabis gorpiformis* Hsiao
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣西、四川、浙江。

Oronabia gorpiformis Hsiao (Hsiao, 1964:79)

Oronabia gorpiformis Hsiao, 1964:79.
捕 食 性。
分 佈：江西、浙江(天目山)。

Oronabia zhangmuensis Ren 樟木山姬蝽 (Ren, 1981:173)

Oronabia zhangmuensis Ren, 1981:173.
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)。

Philobatus christophi (Dohrn) 網姬蝽 (Hsiao et al., 1981:557)

捕 食 性。
分 佈：西北。

Phorticus affinis Poppius (Hsiao, 1964:76)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Phorticus bannanus Hsiao 版納晦姬蝽 (Hsiao, 1981:64; Hsiao et al., 1981:540; Yunn., 1987:251)

Phorticus bannanus Hsiao, 1981:64.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Phorticus formosanus Poppius 臺灣晦姬 (Hsiao, 1964:76)

Phorticus formosanus Poppius
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Phorticus yunnanus Hsiao 雲晦姬蝽 (Hsiao, 1981:64; Hsiao et al., 1981:541; Yunn., 1987:251)

Phorticus yunnanus Hsiao, 1981:64.
捕 食 性。
分 佈：雲南(景洪)。

Prostemma fasciatum (Stål) 平帶花姬蝽 (Hsiao et al., 1981:544; Li et al., 1990:42)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西；日本。

Prostemma flavipennis Fukui 黃翅花姬蝽 (ASZI et al., 1978:240; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964: 76; Hsiao et al., 1981:543; Zhang, 1987[ed.] 1:113)

Prostemma flavipennis Fukui
=*Prostemma kiborti* Jakovlev, 1889:
別 名：*黑姬獵蝽*。
捕 食：稻田薊馬、葉蟬。
分 佈：江西、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、新疆；蒙古、朝鮮、日本。

Prostemma hilgendorffi Stein 角帶花姬蝽 (ASZI, 1986, 1:411; ASZI et al., 1978:240; He et al., 1991:82; Hsiao, 1964:76; Hsiao et al., 1981:544)

別 名：*花翅姬獵蝽*。
捕 食：土蝽
稻蚜、葉蟬。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、天津、北京；日本。

Prostemma longicolle Reuter 長胸花姬蝽 (Hsiao, 1964:76; Hsiao et al., 1981:544)

=*Prostemma kiborti* Jakovlev
捕 食 性。
分 佈：江蘇、陝西。

Reuteronabis potanini (Bianchi) 波羅姬蝽 (Ren, 1992:170)

Reuteronabis potanini (Bianchi, 1896:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；歐洲。

Reuteronabis semiferus (Hsiao) 普羅姬蝽 (Ren, 1992:170).

Reuteronabis semiferus (Hsiao, 1964:)
捕 食 性。
分 佈：四川、河北。

Rhamphocoris borneensis (Schumacher) 紅盾光姬蝽 (Hsiao, 1981:63; Hsiao et al., 1981:541)

Aristonabis borneensis Schumacher, 1914:78.
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南；加里曼丹。

Rhamphocoris elegantulus Schumacher 臺灣光姬蝽 (Hsiao et al., 1981:541)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhamphocoris hasegawai (Ishihara) (Hsiao, et al., 1981:542)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南(景東無量山)。

Rhamphocoris tibialis Hsiao 黑脛光姬蝽 (Hsiao, 1981:63; Hsiao et al., 1981:541; Yunn., 1987:251)

Rhamphocoris tibialis Hsiao, 1981:63.

捕 食 性。

分 佈：雲南(思茅)。

Stenonabis bannaensis Hsiao 版納狹姬蝽 (Hsiao, 1981:67; Hsiao et al., 1981:553; Yunn., 1987:253)

Stenonabis bannaensis Hsiao, 1981:67.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Stenonabis fujianus Hsiao 福建狹姬蝽 (Hsiao, 1981:66; Hsiao et al., 1981:551; Ren et Bu, 1995:136)

Stenonabis fujinus Hsiao, 1981:66.

捕 食 性。

分 佈：福建(崇安三港、建陽黃坑)、廣西、浙江。

Stenonabis guangxiensis Hsiao 廣西狹姬蝽 (Hsiao, 1981:66; Hsiao et al., 1981:552; Li et al., 1990:42; Ren, 1992:199)

Stenonabis guangxiensis Hsiao, 1981:66.

捕 食 性。

分 佈：廣西、湖北。

Stenonabis hainana Ren et Hsiao 海南狹姬蝽 (Ren et Hsiao, 1981:428)

Stenonabis hainana Ren et Hsiao, 1981:428-429.

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Stenonabis roseisignis Hsiao 紅斑狹姬蝽 (Hsiao, 1964:81; Hsiao et al., 1981:552; Yunn., 1987:253)

Stenonabis roseisignis Hsiao, 1964:81.

捕 食 性。

分 佈：雲南(河口小南溪)。

Stenonabis taiwncus Kerzhner 臺灣狹姬蝽 (Hsiao et al., 1981:553)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Stenonabis uhleri Miyamota 雙齒狹姬蝽 (He et al., 1991:83; Hsiao et al., 1981:553; Ren et Hsiao, 1981:429; Zhang, 1987[ed.] 1:113)

Stenonabis uhleri Miyamota

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨。

分 佈：福建、江西(南昌)；日本。

Stenonabis venosus Poppius (Hsiao, 1964:81)

捕 食 性。

分 佈：江西(南昌)。

Anthocoridae 花蝽科

Amphiareus obscuriceps (Poppius) 黑頭叉胸花蝽 (Bu et Chen, 11995:135; Zhang, 1980(2):26; 1985:191; Zeng, 1995, 11(2):90)

捕 食：梨木蝨

獵食型昆蟲及動物，是倉庫害蟲的天敵。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯(遠東地區)。

Amphiareus sp. 叉胸花蝽 (He et al., 1991:80; Li et al., 1990:10; Sun et al., 1984:111)

捕 食：薊馬(若蟲)

鱗翅目(幼齡幼蟲)。

分 佈：廣東、廣西、貴州。

Anthocoris alpinus Zheng 橫斷原花蝽 (Zheng, 1984:63)

Anthocoris alpinus Zheng, 1984:63.

捕 食 性。

分 佈：西藏(易貢)、四川(寶興)。

Anthocoris angustatus Zheng 束翅原花蝽 (Zheng, 1984:63)

Anthocoris angustatus Zheng, 1984:63-64.

捕 食 性。

分 佈：四川(寶興)。

Anthocoris chibi Hiura 小原花蝽 (Zheng, 1984:66)

Anthocoris chibi Hiura, 1959:

捕 食 性。

分 佈：山東(煙臺南山)。

Anthocoris dimorphus Zheng 二態原花蝽 (Zheng, 1984:64)

Anthocoris dimorphus Zheng, 1984:64-65.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨眉山)。

Anthocoris elongatus Zheng 長原花蝽 (Zheng, 1982:199)

Anthocoris elongatus Zheng, 1982:199.

捕 食 性。

分 佈：西藏(亞東)。

Anthocoris expensus Bu 闊原花蝽 (Bu et al., 1995:205)

Anthocoris expensus Bu, 1995:205.

捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Anthocoris fasciatus Bu et Zheng 橫帶原花蝽 (Bu et Zheng, 1990:330)
Anthocoris fasciatus Bu et Zheng, 1990:330.
捕 食 性。
分 佈：雲南(武定獅子山)。

Anthocoris gracilis Zheng 黑脈原花蝽 (Zheng, 1984:65)
Anthocoris gracilis Zheng, 1984:65-66.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨眉山)。

Anthocoris himalayanus Zheng 喜馬原花蝽 (Zheng, 1982:201)
Anthocoris himalayanus Zheng, 1982:201.
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)。

Anthocoris hirsutus Zheng 長毛原花蝽 (Zheng, 1982:200)
Anthocoris hirsutus Zheng, 1982:200.
捕 食 性。
分 佈：西藏(易貢)。

Anthocoris hsiaoi Bu et Zheng 蕭氏原花蝽 (Bu et Zheng, 1997:253)
Anthocoris hsiaoi Bu et Zheng, 1991:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、陝西。

Anthocoris marginatus Zheng 褐邊原花蝽 (Zheng, 1982:200)
Anthocoris marginatus Zheng, 1982:200.
捕 食 性。
分 佈：西藏(扎達地鴉)。

Anthocoris miyamotoi Hiura 宮本原花蝽 (Zheng, 1984:66)
Anthocoris miyamotoi Hiura, 1959:
捕 食 性。
分 佈：雲南(麗江、玉龍山)。

Anthocoris montanus Zheng 山地原花蝽 (Zheng, 1984:62)
Anthocoris montanus Zheng, 1984:62-63.
捕 食 性。
分 佈：四川(小金兩河口、理縣)、湖北(神農架)。

Anthocoris nemorum (Linnaeus) 歐花蝽 (Zhang, 1980(2):22)

捕 食：蚜蟲。
分 佈：廣泛分布于各省(區)；印度、日本、歐洲、美洲。

Anthocoris qinlingensis Bu et Zheng 秦嶺原花蝽 (Bu et Zheng, 1990:330)
Anthocoris qinlingensis Bu et Zheng, 1990:330.
捕 食 性。
分 佈：陝西(秦嶺)。

Anthocoris thibetanus Poppius (Zheng, 1982:199)
Anthocoris thibetanus Poppius, 1909:
捕 食 性。
分 佈：四川(西部)。

Anthocoris ussuriensis Lindberg 烏蘇里原花蝽 (Zheng, 1984:66)
Anthocoris ussuriensis Lindberg, 1927:
捕 食 性。
分 佈：湖北、河北。

Anthocoris yunnanus Zheng 雲南原花蝽 (Zheng, 1984:65)
Anthocoris yunnanus Zheng, 1984:65.
捕 食 性。
分 佈：雲南(屏邊大圍山)。

Bilia castanea (Carvalho) 栗色圓花蝽 (Bu et Zheng, 1990:82)
Biliola castanea Carvalho, 1951:381-391.
Bilia castanea, Carayon et Miyamoto, 1960:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南:印度南部。

Bilia japonica Carayon et Miyamoto 日本圓花蝽 (Bu et Zheng, 1990:82)
Bilia japonica Carayon et Miyamoto, 1960:27-28.
捕 食 性。
分 佈：陝西；日本。

Cardiastethus sp. 鐮花蝽 (Lo et al., 1980:209)
捕 食：(棉田)。
分 佈：上海。

Dufouriella ater (Dufour) 黑叉胸花蝽 (Gao, 1987:271-276)
捕 食：*Matsucoccus matsumurae* (Kuwana) 日本松幹蚧。
分 佈：山東。

Elatophilus nipponensis Hiura 松幹蚧花蝽 (Zhang, 1980(2):23; 1985:192)

捕 食：*Matsucoccus matsumurae* (Kuwana) 日本松幹蚧(卵、若蟲、成蟲)。
分 佈：浙江、江蘇、遼寧；日本。

Klatophilus nipponensis Hiura 松幹蚧花蝽 (ASZI, 19861:403)
捕 食：松幹蚧(及卵)。
分 佈：浙江、江蘇、遼寧。

Lyctocoris beneficus (Hiura) 東方細角花蝽 (Bu et Chen, 1997:253; He et al., 1991:80)
Lyctocoris beneficus (Hiura, 1957:)
=*Lyctocoris campestris* Fabricius, Misidentified.
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、河北。

Lyctocoris campestris (Fabricius) 細角花蝽 (Gao, 1996, 12(3):139; Zhang, 1980(2):25; 1985:192)
捕 食：倉庫害蟲的卵及初孵幼蟲
Lasioderma serricorne Fabricius 煙草甲
Ephestia elutella (Hübner) 煙粉斑螟
分 佈：廣泛分佈我國各省區；日本、歐洲、美洲。

Montandoniola moraguesi (Puton) 黑紋花蝽 (He et al., 1991:80; Zhang,1985:192)
=*Teisocoris pictipennis,* Chang, Misidentifired.
別 名：*黑紋透翅花蝽*。
捕 食：薊馬蟲癭中的薊馬
稻薊馬。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州；日本、印度、東南亞一帶。

Orius agilis 黑翅小花蝽 (Wang et al., 1991:125-129)
Orius agilis
捕 食：*Aphis gossypii* 棉蚜
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲。
分 佈：我國棉區。

Orius bifilarus Chauri 二叉小花蝽 (Hun., 1992:280)
捕 食：葉蟎、薊馬、蚜蟲。
分 佈：湖南、雲南、四川；印度、巴基斯坦。

Orius gladiatus Zheng 劍鞭小花蝽 (Zheng, 1982:192)
Orius gladiatus Zheng, 1982:192.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山報國寺)、浙江。

Orius minutus (Linnaeus) 微小花蝽 (ASZI, 1986, 1:402; ASZI et al., 1978:246; Bu et Chen, 1997:254; Chen et Wang, 1987:304; Chen et al., 1993:131; Dong, 1984:91; He et al., 1991:80; Huang et Gao, 1996:142; Hubei Plant Prot. Res. Inst., 1980(1):37-43;

Hun., 1992:280; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1981(1-2):84; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Nan et al., 1987:125; Qi et al., 1983:57; Qin, 1985:117-124; Qiu et Fan, 1980(2):40-47; Song, 1984:84; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:102; Xie et al., 1999, 21(2):83; Yan et Duan, 1988, 15(1):23-27; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1980(2):20; 1985:193)

Orius minutus (Linnaeus, 1758:)

別 名：*小花蝽*。

捕 食：棉蚜、粉虱、梨木蝨、蚧蟲

嚙蟲

稻飛蝨、稻葉蟬

棉薊馬

棉葉蟎

棉盲蝽

紅鈴蟲(卵)、棉鈴蟲(卵)

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(卵)

金剛鑽(卵)

Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎

Schizotetranychus baltazarae Rimando 柑橘裂爪蟎

葉蟎類

在一般作物、蔬菜、林木、果樹、棗樹上捕食蚜蟲和其他害蟲。

分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、四川、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、天津、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧；蒙古、朝鮮、西伯利亞、中亞、北非、歐洲。

Orius niger Volff 毛肩花蝽 (Bu et Chen, 1997:254)

Orius niger Volff, 1811:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、新疆；蒙古、中亞、西亞、歐洲、北非。

Orius sauteri (Poppius) 紹德小花蝽 (Cai, 1988: ; Du, 1991: ; Du et Yan, 1994, 10(3):114-117; He et al., 1991:81; Jiang et al., 1991:7-9; Lo, 1997:61; Lo et al., 1980:209; Luo, 1980, 17(4):155-157; Pan, 1986, 3:41-43; Wang, 1994:141-154; Wang et al., 1994, 10(3):100-102; Wang et al., 1996, 12(2):49-51.Wang et al., 1998, 20(1):42-44; Xia et al., 1992, 2:213-219; Yan, 1986, 1(2):98-104; Yan, 1988, 15(1):23-26; Yan et Tuan, 1988, 15(1):23-26; Yan et Yu, 1997, (62):253-260; Yu, 1996,:1178-1181; Yu et Yan, 1996:1178-1181; 1997, 13(4):185-186; 1998, 7(1):86-91; 1998, 14(1):4-6; 1998, 14(4):148-151; 21(4):145-149; Yu et al., 1997, 13(4):185; Yu et al., 1998, 14(1):4-6; Yu et al., 1998, 14(4):148-151; Yu et al., 1998:701-704; Zhang, 1985:193; Zhang, 1987[ed.] 1:113; Zhou et Wang, 1989:9-12; Zhao et al., 1993:22-27; Zheng, 1980, 3:11-14; Zhou et al., 1991, 7(1):7-9; Zou et al., 1994, 10(3):126-130)

別 名：*東亞小花蝽，小黑花蝽*。

捕 食：*Longiunguis sacchari* 高粱蚜

蚜蟲、粉蝨

Thrips palmi Barny 南黃薊馬

Tetranychus vinnensis 山楂葉蟎(蘋果)

葉蟎類

鱗翅目(卵及初孵幼蟲)

植物花粉。

分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、安徽、上海、湖北、河南、山西、河北、天津、北京、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯(遠東地區)。

Orius similis Zheng 南方小花蝽 (Hun., 1992:281; Lo et al., 1980:209-210; Peng et al., 1988, 15(2):92, 110; Shi et al., 1989-90:80, 83; Wang et al., 1991:79-81; Wang et al., 1999, 21(3):117-120; Wei et al., 1984:32-40; Wu et Ji, 1989:151-155; Zhang, 1980(2):20; 1985: 193; Zhang, 1987[ed.] 1:114; Zhang et al., 1996(4):14; Zheng, 1982:191; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:118-120, 134; 1987:45; Zong et al., 1987:87)

Orius similis Zheng, 1982:191.

捕 食：*Dialeurodes citri* Ashmead 柑橘粉虱
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木虱(卵、若蟲)
Myzus persicae (Sulzur) 桃蚜
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵)
Taeniothrips flavidulus (Bagnall) 黃帶薊馬
Eotetranychus kankitus Ehara 柑橘始葉蟎
蚜蟲、葉蟎類、薊馬、葉蟬、紅鈴蟲、斜紋夜蛾、金剛鑽等害蟲的卵及初孵幼蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北。

Orius strigicollis (Poppius) 南方小黑花蝽 (Wang, 1998:199-202; 1999:17-24; Wang et al., 1999:319-329; Yu et Chen, 2000, (12):34)

捕 食：*Thrips palmi* Karny 南黃薊馬
蚜蟲、粉蝨
葉蟎
Ephestia cautella Walker 粉斑螟
Ephestia kuhniella Zeller 地中海粉斑螟。

分 佈：臺灣。

Orius tantillus (Motschulsky) 淡翅小花蝽 (He et al., 1991:81; Wang, 1998:199-202; Zhang, 1980(2):21; 1985:195)

別 名：*三叉小黑花椿象*。

捕 食：稻薊馬、端帶薊馬、絲帶薊馬(若蟲)
蚜蟲、粉蝨
鱗翅目(卵)
葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西；印度、斯里蘭卡、大洋洲、密克羅尼西亞新西蘭。

Orius sp. 花蝽 (Lo et Ho, 1970:193)

捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎

Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 綉球葉螨
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉螨
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉螨
Tetranychsu trancatus Etr. 截形葉螨。
分 佈：臺灣。

Physopleurella armata Poppius 黃褐刺花蝽 (Bu et Chen, 1995:135; 1997:255; He et al., 1991:81; Zhang, 1980(2): 26; 1985:195)
Physopleurella armata Poppius, 1909:
捕 食：(稻田)
燈蛾
夜蛾等鱗翅目卵及初孵幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、貴州、江蘇、湖北；日本、巴布亞新幾內亞。

Teisoceris pirtipennis (Esaki) 黑紋花蝽 (Sun et al., 1984:111; Zhang, 1980(2):23)
棲 息：稻田、豆類、林木、果樹苗圃。
捕 食：薊馬。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西等南部省(區)；印度、東南亞各國。

Tetraphleps aterrimus (J. Sahlberg) 黑色肩花蝽 (Bu et Zheng, 1991:198)
Anthocoris aterrimus J. Sahlberg, 1878:31.
捕 食 性。
分 佈：雲南、河北、新疆、吉林；蘇聯(遠東地區)、西伯利亞、蒙古、歐洲。

Tetraphleps galchanoides Ghauri 斑翅肩花蝽 (Bu et Zheng, 1991:198)
Tetraphleps galchanoides Ghauri, 1972:409-421.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；印度、錫金。

Tetraphleps parallelus Bu et Zheng 直長肩花蝽 (Bu et Zheng, 1991:198)
Tetraphleps parallelus Bu et Zheng, 1991:198.
捕 食 性。
分 佈：四川、

Tetraphleps pilosulus Bu et Zheng 毛肩花蝽 (Bu et Zheng, 1991:201)
Tetraphleps pilosulus Bu et Zheng, 1991:201.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Tetraphleps yulongensis (Bu et Zheng) 玉龍肩花蝽 (Bu et Zheng, 1991:200)
Tetraphleps yulongensis Bu et Zheng, 1991:200.
捕 食 性。
分 佈：雲南(麗江玉龍山)。

Wollatoniella brunnea Bu et Zheng 褐烏花蝽 (Bu et Zheng, 1990:80)

Wollatoniella brunnea Bu et Zheng, 1990:80.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨眉)。

Wollastoneilla marginella Bu et Zheng 寬邊烏花蝽 (Bu et Zheng, 1990:79)

Wollastoneilla marginella Bu et Zheng, 1990:79.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Wollastoniella yunnanensis Bu et Zheng 雲南烏花蝽 (Bu et Zheng, 1990:81)

Wollastoniella yunnanensis Bu et Zheng, 1990:81.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Xylocoris cursitans (Fallén) 倉花蝽 (Zhang, 1980(2):24; 1985:196)

捕 食：成蟲、若蟲獵食糧堆中的麥蛾、粉螟等的卵及幼蟲。

分 佈：廣泛分佈各省區；亞洲、歐洲、南、北美洲。

Xylocoris flavipes (Reuter) 黃色花蝽 (Deng, 1983:12; Deng et Wen, 1989:6-8; Pu, 1987:60; Yang et Cheng, 1985(2):24; Yao, 1980:95-100; Yao, 1981:95-100; Zhang, 1985:196; Zhou et al., 1986:63-66)

捕 食：煙草甲蟲

穀蠹

鋸穀盜

黑色皮蠹、谷斑皮蠹

赤擬穀盜、雜擬穀盜

大蠟螟、粉斑螟、印度穀螟、麥蛾。

分 佈：原產美國，1980 年姚 康教授引進上海、雲南、四川、貴州、湖南。

Xylocoris galactinus Fieber 黃褐花蝽 (Gu, 1988:174; Yao et Lu, 1993, 9(2):96)

捕 食：寄居于蓮子、白茨、杏仁、棗仁、橘梗、羅漢果、桃仁、生地、桑椹子、黃岑、北鱠、大楓子、大黃、當歸、木棉花、冬花、蔓京子。捕食蟎類。小型昆蟲幼蟲及蛹。

分 佈：廣東、陝西。

Xylocoris sp. 黃岡倉花蝽 (Wen et Deng, 1988, 15(4):273-276)

捕 食：*Cryptolestes minutus* 長角谷盜

Oryzaephilus surinamensis 鋸谷盜

Palorus ratzeburgi 姬粉谷盜。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、湖北。

Xylocoris sp. (Lin, 1968:45)

捕 食：倉庫害蟲。
分 佈：臺灣。

Miridae 盲蝽科

Campylomma chinensis Schuh 秦斑腿盲蝽 (Wang, 1994:141)
捕 食：*Thrips palmi* Karny 南黃薊馬
分 佈：臺灣。

Campylomma livida Reuter 利威盲蝽 (Chang et al., 1993:240)
捕 食：*Thrips palmi* Karny 南黃薊馬
分 佈：臺灣。

Cyrtopeltis tennuis 煙草盲蝽 (Xie et al., 1999, 21(2):93)
捕 食：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾
分 佈：

Cyrtorhinus chinensis (Stål) 華嗜卵盲蝽 (Li et al., 1990:10)
捕 食：可能與黑肩綠灰盲蝽同。
分 佈：香港、廣西。

Cyrtorhinus lividipennis Reuter 黑肩綠盔盲蝽 (Chen, 1996, 18(1):20; Chen, 1996:33; Chen et Cheng, 1993, 19(1):117; Chen et al., 1985, 12(1):69-72; Chen et al., 1994:63-70; Chen et al., 1999, 26(2):162-166; Chiu et Cheng, 1975:451; Chiu et Cheng, 1976:254-260; Feng et al., 1999, 21(2):55-60; Gao et al., 1994, 10(4):157-161; He et al., 1991:81; Hun., 1992:293; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Ku et Wang, 1978:299; Lei et al., 1984:143-144; Li, 1989:91; Li et al., 1990:10; Liu et al., 1992:68-71; Lou et Cheng, 1996, 23(4):321-326; Lu et Zheng, 1997:273; Lu et al., 1995:141; Luo et Zhuo, 1986:73; Mao et Liang, 1995, 21(2):42-44; Sun et al., 1980(4):23; Wu et al., 1982:36-38; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1985:200; Zhang, 1987[ed.] 1:114; Zhong, 1983:158; Zhou et Chen, 1981(4):25)
Cyrtorhinus lividipennis Reuter, 1884:199.
別 名：*黑肩綠盲蝽，綠盲蝽*。
捕 食：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Nephotettix nigropictus (Stål) 二條黑尾葉蟬(卵)
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬(卵)
白大葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
Sogatella furcefera (Horvàth) 白背飛蝨(卵)
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨(卵)
Sesamia inferens (Walker) 大螟(卵)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、河北、天津；東洋區廣佈、日本、菲律賓、緬甸、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇、薩莫亞、馬里亞那、加羅林。

Cyrtorhinus mundulus Bredd 黑盲蝽 (Chui et Lung, 1975:452; Lo, 1997:59)

捕 食：飛蝨

Nephotettix cincticeps (Uhler) 僞黑尾葉蟬

Nephotettix nigropictus (Stål) 原黑尾葉蟬

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬

Perkinseilla saccharicida 甘蔗飛蝨

分 佈：臺灣。

Deraeocoris (s. str.) **annulipes** (Herrich-Schaeffer) 黑角齒爪盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:275; Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

Deraeocoris annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842:)

捕 食：蚜蟲、木蝨

小型昆蟲。

分 佈：湖北、寧夏、內蒙古(興安盟)；俄羅斯、歐洲。

Deraeocoris apicatus Kerzhner et Schuh (Lin, 1999:18)

Deraeocoris apicatus Kerzhner et Schuh, 1995:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Deraeocoris (s. str.) **ater** Jakovlev 斑楔齒爪盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:276; Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

Deraeocoris ater Jakovlev, 1889:

捕 食：蚜蟲、木蝨

小型昆蟲。

分 佈：四川、湖北、寧夏、甘肅、內蒙古(呼和浩特、呼倫貝爾盟、興安盟、赤峰市錫林郭勒盟、巴彥淖爾盟)；日本、俄羅斯。

Deraeocoris (s. str.) **kerzhneri** Josifov 克氏齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

Deraeocoris (s. str.) *kerzhneri* Josifov, 1983:

捕 食：蚜蟲、木蝨

小型昆蟲

分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟、興安盟、赤峰市、錫林郭勒盟)。

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling) 淡須齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:292)

Deraeocoris (*Knightocapsus*) *lutescens* (Schilling, 1837:)

捕 食：蚜蟲、木蝨

小型昆蟲

分 佈：內蒙古(阿拉善荒漠)。

Deraeocoris (s. str.) **morio** (Boheman, 1852) 黑孔齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

捕 食：蚜蟲、木蝨

小型昆蟲。

分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟、興安盟、赤峰市等地)。

Deraeocoris (s. str.) **olivaceus** (Fabricius) 大齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

Deraeocoris (s. str.) *olivaceus* (Fabricius, 1777:)
捕 食：蚜蟲、木蝨
小型昆蟲。
分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟、赤峰市等)。

Deraeocoris (s. str.) **pallidicornis** Josifov 黃齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:291)

Deraeocoris (s. str.) *pallidicornis* Josifov, 1983:
捕 食：蚜蟲、木蝨
小型昆蟲。
分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟、興安盟、赤峰市、哲里木)。

Deraeocoris parviceps Poppius (Lin, 1999:18)

Deraeocoris parviceps Poppius, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Deraeocoris pilipes (Reuter) 毛足齒爪盲蝽 (Zheng et Ren, 1996:45)

Deraeocoris pilipes (Reuter, 1879:)
捕 食 性。
分 佈：四川、新疆；蒙古、中亞、伊朗。

Deraeocoris plebejus Poppius (Lin, 1999:18)

Deraeocoris plebejus Poppius, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Deraeocoris (**Camptobrochis**) **punctulatus** (Fallén) 食蟲齒爪盲蝽 (ASZI, 1986, 1:399; ASZI et al., 1978:246; Qi et Nonnaizabu, 1993:292; Wang et al., 1991:79-81; Zhang, 1985: 201; Zhang, 1987[ed.] 1:114; Zhang, 1998, 14(2):47; Zheng et Ren, 1996:45)

Lygaeus punctulatus Fallén, 1807:87.
別 名：*黑食蚜盲蝽*，*黑食蟲盲蝽*。
捕 食：麥蚜、菜蚜、蚜蟲
葉蟎類
飛蝨等小蟲。
分 佈：江西、西藏、四川、北方各省，西伯利亞、中亞、歐洲，古北區廣佈種。

Deraeocoris sauteri Poppius (Lin, 1999:18)

Deraeocoris sauteri Poppius, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Deraeocoris scutellaris Fabricius (Lin, 1999:18)

Deraeocoris scutellaris Fabricius, 1794:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Douglas et Scott, 1868 小齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:292)
Deraeocoris (*Camptobrochis*) *serenus* Douglas et Scott, 1868:
捕 食：蚜蟲、木蝨
小型昆蟲。
分 佈：內蒙古(呼和浩特、赤峰市、錫林郭勒盟、伊克昭盟、阿拉善盟)。

Deraeocoris sordidus Poppius (Lin, 1999:18)
Deraeocoris sordidus Poppius, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Deraeocoris (s. str.) **ventralis** (Reuter, 1904) 艷盾齒爪盲蝽 (Qi et Nonnaizabu, 1993:291)
Deraeocoris (s. str.) *ventralis* (Reuter, 1904:)
捕 食：蚜蟲、木蝨
小型昆蟲。
分 佈：內蒙古(興安盟、赤峰市及錫林郭勒盟等地)

Papuacoris vittatus Reuter (Lin, 1999:18)
Papuacoris vittatus Reuter, 1908:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Stethoconus japonicus Schumacher 赤軍配盲蝽 (Chen et Wang, 1987:305; Qiet al., 1983:57; Zhang, 1985[ed.]:178; Zhao et al., 1999(3):19)
Stethoconus japonicus Schumacher
捕 食：*Stephanitis nashi* 梨網蝽(成蟲和若蟲)
Sphephanitis sp. 茶網蝽。
分 佈：四川、江蘇、安徽、陝西。

Termatophylum orientalis Poppius (Lin, 1999:18)
Termatophylum orientalis Poppius, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Termatophylum yunnanum Ren 雲南毛眼盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:276)
Termatophylum yunnanum Ren, 1983:
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖北。

Tytthus chinensis Stål 黑胸盲蝽 (He et al., 1991:81)

別 名：*華嗜卵盲*蝽。

捕 食：稻飛蝨(卵)、稻葉蟬(卵)。

分 佈：福建、廣東、廣西、四川。

Tytthus mundulus Breddin 黑盲蝽 (Chen, 1996:30; He et al., 1991:81)

捕 食：*Nephotettis* spp. 黑尾葉蟬

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨。

分 佈：臺灣。

Tytthus sp. 黑肩褐盲蝽 (He et al., 1991:81)

捕 食：稻飛蝨。

分 佈：福建。

Dipsocoridae 鞭蝽科

Ceraticombus alticallus Ren et Yang 朽木櫛鞭蝽 (Ren et Yang, 1991:333)

Ceraticombus alticallus Ren et Yang, 1991:333.

捕 食 性。

分 佈：河北。

Ceratocombus guishouensis Ren et Yang 貴州櫛鞭蝽 (Ren et Yang, 1993:239)

Ceratocombus guishouensis Ren et Yang, 1993:239-240.

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Ceraticombus sinicus Ren et Yang 體櫛鞭蝽 (Ren et Yang, 1991:334)

Ceraticombus sinicus Ren et Yang, 1991:334.

捕 食 性。

分 佈：北京(公主墳)。

Cryptostemma japonicum Miyamoto 日本鞭蝽 (Ren et Yang, 1991:335)

捕 食 性。

分 佈：廣西(雁山)；日本。

Saldidae 跳蝽科

(Chen, 1994:179-180)

Calacanthia angulosa (Kiritschenko) 寬角跳蝽 (Chen, 1988:125; 1992:185; 1996:54; Chen et Lindskog, 1994:407)

Calacanthia angulosa (Kiritschenko, 1911:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、青海、新疆。

Calacanthia grandis Cobben 大寬角跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Calacanthia grandis Cobben, 1985:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Calacanthia sichuanicus Chen et Zheng 四川突盾跳蝽 (Chen, 1992:185; Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:393)

Calacanthia sichuanicus Chen et Zheng, 1987:393-394.

捕 食 性。

分 佈：四川(巴塘海子山)。

Calacanthia tibetana Drake 西藏寬角跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Calacanthia tibetana Drake, 1954:

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Chiloxanthus corporaali Lindber 黑邊毛跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:406)

Chiloxanthus corporaali Lindber

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Chiloxanthus kozlovi (Kiritschenko) 褐毛邊跳蝽 (Chen, 1992:185; 1996:54; Chen et Lindskog, 1994:406)

Chiloxanthus kozlovi (Kiritschenko, 1911:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、新疆。

Chiloxanthus lama Kiritschenko 西藏毛邊跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:406)

Chiloxanthus lama Kiritschenko

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Chiloxanthus pilosus (Fallén) 多毛毛邊跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:394)

Chiloxanthus pilosus (Fallén, 1807:)

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(海拉爾、阿里河)；蒙古、蘇聯、歐洲。

Halosalda lateralis (Fallén) 側邊鹽跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:394)

Halosalda lateralis (Fallén, 1807)

捕 食 性。

分 佈：河北(黃驊歧口)、新疆；蘇聯、土耳其、歐洲。

Macrosaldula jakowleffi (Reuter) 毛肩大跳蝽 (Chen, 1996:55; Chen et Lindskog, 1994:407)

Macrosaldula jakowleffi (Reuter, 1891:)

捕 食 性。

分 佈：新疆、土耳其、中歐。

Macrosaldula miyamotoi Cobben 宮本大跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Macrosaldula miyamotoi Cobben, 1985:

捕 食 性。

分 佈：吉林。

Macrosaldula oblonga (Stål) 長圓大跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Macrosaldula oblonga (Stål, 1858:)

捕 食 性。

分 佈：山西、寧夏。

Macrosaldula roborowskii (Jakovlev) 羅氏大跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Macrosaldula roborowskii (Jakovlev, 1889:)

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Micracanthia bergrothi (Jakovlev) 北氏小跳蝽 (Chen et Zheng, 1987:395)

Micracanthia bergrothi (Jakovlev, 1893:)

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(海拉爾)；蒙古、蘇聯。

Micracanthia ornatula Rueter 雅小跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Micracanthia ornatula Rueter, 1891:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、海南、雲南。

Micracanthia sp. (Chen et Lindskog, 1994:407)

Micracanthia sp. Chen et Lindskog, 1994:407.

捕 食 性。

分 佈：四川、青海。

Pentacora malayensis (Dover) 馬來五室跳蝽 (Chen et Lindkog, 1994:407)

Pentacora malayensis (Dover, 1929:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Salda kiritshenkoi Cobben 基氏黑跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)

Salda kiritshenkoi Cobben, 1985:

捕 食 性。

分 佈：黑龍江。

Salda littoralis (Linnaeus) 澤黑跳蝽 (Chen eet Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:396)

Salda littoralis (Linnaeus, 1758:)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川；歐洲、北美。

Salda morio Zetterstedt 亮黑跳蝽 (Chen eet Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:396)
Salda morio Zetterstedt, 1840:
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；西伯利亞、歐洲。

Salda sahlbergi (Reuter) 暗條黑跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:396)
Salda sahlbergi (Reuter, 1875:)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；蒙古；蘇聯、歐洲。

Saldoida armata Horvàth 蟻狀突胸跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)
Saldoida armata Horvàth,1911:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、天津。

Saldula arenicola (Scholtz) 沙跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:396)
Saldula arenicola (Scholtz, 1847:)
捕 食 性。
分 佈：山西、新疆。

Saldula arsenjevi Vinokurov 分明跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen, 1987:164; Chen et Zheng, 1987:395)
Saldula arsenjevi Vinokurov, 1981:
別 名：*黃頰跳蝽*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、青海、湖南、湖北、河北、北京、黑龍江；蘇聯。

Saldula burmanica Lindskog 緬甸跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:395)
Saldula burmanica Lindskog, 1975:
捕 食 性。
分 佈：西藏、雲南、四川、陝西；緬甸。

Saldula fucicola (J. Sahlberg) 地衣跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:395)
Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870:)
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古、蘇聯、歐洲。

Saldula fukiena Drake et Maa 福建跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)
Saldula fukiena Drake et Maa, 1954:
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州、四川。

Saldula hasegawai Cobben 黃邊跳蝽 (Chen, 1987:163; Chen et Lindskog, 1994:407)

Saldula hasegawai Cobben, 1985:

捕 食 性。

分 佈：山東；日本。

Saldula melanoscela (Fieber) 灰暗跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407; Chen et Zheang, 1987:395)

Saldula melanoscela (Fieber, 1859:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、天津；西伯利亞、土耳其、土耳奇斯坦、歐洲。

Saldula niveolimbata (Reuter) 鮮明跳蝽 (Chen, 1987:163; Chen et Lindskog, 1994:408)

Saldula niveolimbata (Reuter, 1990:)

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南、非洲。

Saldula nobilis (Horvàth) 顯赫跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:395)

Saldula nobilis (Horvath, 1884:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、陝西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、歐洲。

Saldula opacula (Zetterstedt) 影斑跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:395)

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、新疆、黑龍江；蒙古、蘇聯、土耳其、歐洲、北美洲。

Saldula orthochila (Fieber) 直邊跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:395)

Saldula orthochila (Fieber, 1859:)

捕 食 性。

分 佈：四川；土耳奇斯坦、西伯利亞、歐洲。

Saldula pallipes (Fabricius) 廣跳蝽 (Chen, 1992:186; Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:396)

Saldula pallipes (Fabricius, 1794:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、雲南、四川、山東、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；西亞、歐洲、北美、南美。

Saldula palustris (Douglas) 泛跳蝽 (Chen, 1996:56; Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:395)

Saldula palustris (Douglas, 1874:)

=*Salda bicolor* Costa, 1874:

=*Salda saltatoria* Sahiberg, 1871:

=*Salda saltatoria apicalis* Salhiberg, 1878:

=*Acanthia melanoscella pallidipennis* Reuter, 1888:

=*Acanthia mutbilis* Reuter, 1891:

=*Acanthia mutabilis imitator* Reuter, 1891:

=*Salda pallipes palustris* saunders, 1892:

=*Sakda pallidipennis* Lethierry et Severin, 1896:
=*Acanthia bicolor obscura* Reuter, 1902:
=*Acanthia palustris apicaliis* Oshaniin, 1912:
=*Saldula palustris sordidipennis* Stucgekm 1934:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、河南、山東、山西、河北、天津、甘肅、寧夏、青海、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、埃及、伊朗、突尼斯、蘇聯、歐洲、北美、中美、南美。

Saldula pilosella (Thomson) 毛頂跳蝽 (Chen, 1996:59; Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:395)
Sala pilosella Thomson, 1871:
Salda pallipes pilosella Puton, 1879:
=*Acanhtia hirssuta* Reuter, 1888:
捕 食 性。
分 佈：西藏、雲南、四川、江蘇、河南、山東、河北、山西、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、歐洲。

Saldula saltatoria (Linnaeus) 黃頰跳蝽 (Chen, 1996:56; Chen et Lindskog, 1994:408)
Cimex saltatoria Linnaeus, 1758:
=*Cimex alpinus* Scopoli, 1763:
=*Acanthia littoralis* Fabricius, 1794:
=*Acanthia maculata* Latreille, 1804:
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Saldula taiwanensis Cobben 臺灣跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408)
Saldula taiwanensis Cobben, 1985:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Saldula xanthochila (Fieber) 黃跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408; Chen et Zheng, 1987:396)
Saldula xanthochila (Fieber, 1859:)
捕 食 性。
分 佈：天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江；伊拉克、土耳奇斯坦、歐洲、美國。

Teloleuca kusnezovi Lindberg 卵圓細角跳蝽 (Chen eet Lindskog, 1994:407; Chen et Zheng, 1987:396)
Teloleuca kusnezovi Lindberg, 1934:
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；歐洲。

Teloleuca pelluceua (Fabricius) 西北細角跳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:407)
Teloleuca pelluceua (Fabricius, 1779:)
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Leptopodidae 細腳蝽科

Leptopus riparius Hsiao 淡褐細腳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408)

Leptopus riparius Hsiao, 1964:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Patapius thaiensis Cobben 泰國細腳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408)

Patapius thaiensis Cobben, 1968:

捕 食 性。

分 佈：雲南；泰國。

Valleriola buenoi (Usinger) 布氏大細腳蝽 (Chen et Lindskog, 1994:408)

Valleriola buenoi (Usinger, 1942:)

捕 食 性。

分 佈：海南。

Isometopidae 樹蝽科

Isometopus beijingensis Ren et Yang 北京樹蝽 (Ren et Yang, 1988:77)

Isometopus beijingensis Ren et Yang, 1988:77.

捕 食 性。

分 佈：北京。

Isometopus citri Ren 陝西柚樹蝽 (Ren, 1987:398)

Isometopus citri Ren, 1987:398-400.

捕 食：採于被矢尖蚧 *Unaspis* sp. 嚴重為害的柚樹上。

分 佈：陝西。

Isometopus fasciatus Hsiao 褐斑樹蝽 (Hsiao, 1964:)

Isometopus fasciatus Hsiao, 1964:

捕 食 性。

分 佈：

Isometopus hainanus Hsiao 海南樹蝽 (Hsiao, 1964:)

Isometopus hainanus Hsiao, 1964:

捕 食 性。

分 佈：海南。

Isometopus marginatus Ren et Yang 淡綠樹蝽 (Ren et Yangt, 1988:76)

Isometopus marginatus Ren et Yang, 1988:76.

捕 食 性。

分 佈：雲南(墨江)。

Isometopus nigrosignatus Ren 黑痣樹蝽 (Ren, 1987:400)

Isometopus nigrosignatus Ren, 1987:400.

捕 食 性。

分 佈：雲南(昆明)。

Isometopus shaowuensis Ren 邵武樹蝽 (Ren, 1987:400)

Isometopus shaowuensis Ren, 1987:400-401.

捕 食：(柑橘樹)。

分 佈：福建(邵武)

Isometopus tianjinus Hsiao 天津樹蝽 (Hsiao, 1964: ; Zhang, 1985:208)

Isometopus tianjinus Hsiao, 1964:

捕 食：捕食性

分 佈：天津。

Isometopus sp. 樹蝽 (Huang et Gao, 1996:142)

捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎

分 佈：福建。

Letaba xizangana Ren 西藏堅樹蝽 (Ren, 1988:107)

Letaba xizangana Ren, 1988:107.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密 2300m)。

Myiomma altica Ren 高山米樹蝽 (Ren, 1987:398; 1992:172)

Myiomma altica Ren, 1987:398.

捕 食 性。

分 佈：四川(理縣)。

Paraletaba annulata Ren et Huang 花角桂樹蝽 (Ren et Huang, 1987:25)

捕 食：(柑橘樹)。

分 佈：福建(莆田)。

Paraletaba montana Ren et Yang 山桂樹蝽 (Ren et Yang, 1988:75)

Paraletaba montana Ren et Yang, 1988:75.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Sophianus lamellatus Ren et Yang 雁山奇樹蝽 (Ren et Yangt, 1988:78)

Sophianus lamellatus Ren et Yang, 1998:78.

捕 食 性。

分 佈：廣西(雁山)。

Enicocephalidae 奇蝽科

Hoplitocoris lewisi (Distant) 瘤脊奇蝽 (Zhang, 1985:209)

捕 食：跳蟲。

分 佈：臺灣、西藏、四川；日本。

Mesoveliidae 水蝽科

Mesovelia orientalis Kirkaldy 東方水蝽 (Hunan, Shi-men, 1980(3):64-66)

Mesovelia orientalis Kirkaldy

捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨。

分 佈：湖南。

Mesovelia vittigera Horvàth 水蝽 (He et al., 1991:87)

=*Mesovelia orientalis,* Wu, 1980: Misidentified.

捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬。

分 佈：湖南。

Hydrometridae 尺蝽科

Hydrometra albolineata Scott 白條尺蝽 (He et al., 1991:87; Sun et al., 1980(4):23; Wu, 1988:136-138; Zhang, 1985:210)

別 名：*尺蝽，白紋尺蝽，白條絲黽蝽*。

捕 食：蚜蟲

稻飛蝨(卵、若蟲)、稻葉蟬(卵、若蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；朝鮮、日本。

Hydrometra annamana Hungerford et Evans 褐色尺蝽 (He et al., 1991:87)

捕 食：*Sogatella furcifera* (Horvàth) 白背飛蝨

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨。

分 佈：臺灣、四川。

Hydrometra vitata Stål 水蛸 (Zhang, 1987[ed.] 1:115)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Vellidae 寬黽蝽科

Microvelia douglasi Scott 黑寬黽蝽 (Chen et Chiu, 1982:334-338; Chen et Zhou, 1993:189; He et al., 1991:88; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1989:91; Ye et Wang, 1987:11)

別 名：*小寬蝽，道氏廣肩水黽*。

捕 食：*Laodelphax striatellus* (Fallen) 斑飛蝨低齡若蟲

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(低齡若蟲)
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(低齡若蟲)
Nephotettix spp. 黑尾葉蟬(低齡若蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、上海、湖北。

Microvelia horvathi Lundblad 小寬蝽 (Chen et al., 1998, 20(2):69-74; Chen et al., 1999, 26(2):162-166; He et al., 1991:88; Jiangsu, YAAPP, 1978, 15(5):136-138; Li et al., 1990:48; Luo et Zhuo, 1986:74; Sun et al., 1980(4):23; Wang, 1989, (1):33-35; Wu et al., 1994, 14(4):381-386; Xiao et al., 1987, (2):49-56; Zhang, 1985:209; ; Zhang, 1987[ed.] 1:116; Zhong, 1983:158)
別 名：*尖鈎寬黽蝽*。
捕 食：稻飛蝨(卵、若蟲)、稻葉蟬(卵、若蟲)
萍蚜、稻蚜
稻管薊馬、稻薊馬
跳蟲等
二化螟
三化螟
稻縱捲葉螟
稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北。

Gerridae 黽蝽科

Aquarius elongatus Uhler 大黽蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:116)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Aquarium paludum Fabricius 水黽 (Zhang, 1985:211; Zhang, 1987[ed.] 1:116)
捕 食：落水面的飛蝨、葉蟬、蠅類等小蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江、江蘇、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Gerris sp. 黽蝽 (He et al., 1991:88)
捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬
稻薊馬。
分 佈：湖南、雲南。

Limnogonus fossarum Fabricius 背條水黽 (Zhang, 1985:211; Zhang, 1987[ed.] 1:116)
捕 食：落水面的飛蝨、葉蟬、蠅類等小蟲。
分 佈：江西、廣東；菲律賓、印度。

Metocoris lituratus Stål 花臉黽蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:116)
捕 食 性。

分 佈：江西。

Microvelia horvathi Lundblad 尖鉤寬黽蝽 (Qi et al., 1983:54)

捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨。

分 佈：江蘇、安徽。

Nepidae 蠍蝽科

Laccoterphes japonensis Scott 大卵圓蠍蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:76)

捕 食：孑孓、水生小動物、魚苗。

分 佈：江西。

Laccotrephes robustus Stål 長壯蝎蝽 (Liu et Ren, 1997:184; Liu et Zheng, 1992:164)

Laccotrephes robustus Stål, 1871:

捕 食 性。

分 佈：廣西、貴州、四川；菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度。

Nepa chinensis Hoffman 卵圓蠍蝽(紅娘華) (Chen, 1984:155; Zhang, 1985:212; Zhang, 1987[ed.] 1:76)

別 名：*中華蠍蝽*。

捕 食：孑孓，還能捕食椎實螺 (*Lymnaea*)、扁卷螺 (*Planoribs*)、蜻蜓稚蟲、豆娘稚蟲、負子蝽成蟲等。

分 佈：江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、河北、遼寧。

Ranatra chinensis Mayr 華螳蠍蝽 (Liu et Ren, 1997:185; Zhang, 1985:213; Zhang, 1987[ed.] 1:76)

Ranatra chinensis Mayr, 1862:

別 名：*大長蠍蝽*。

捕 食：孑孓、水生小動物、魚苗。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、緬甸。

Ranatra unicolor Scott 小螳蠍蝽 (Zhang, 1985:213; Zhang, 1987[ed.] 1:76)

捕 食：孑孓、水生半翅目若蟲、蜻蜓、豆娘、蜉蝣稚蟲、魚苗。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

Belostomatidae 負子蝽科

(Li, 1996, 18(1):45)

Diplonychus rusticus (Fabricius) 褐負子蝽 (Liu et Zheng, 1992:164)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、孟加拉、印度、斯里蘭卡、澳洲。

Kirkaldyia deyrollei Vuillefroy 大田鱉 (Zhang, 1985:215; Zhang, 1987[ed.] 1:76)

捕 食：較深水中水生昆蟲及小魚。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山西、河北、北京、遼寧；菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

Sphaerodema rustica Fabricius 負子蝽 (Chen, 1984:155; Su et Yang, 1990:358; 1992:49-61; Zhang, 1985:215; Zhang, 1987[ed.] 1:76)

捕 食：孑孓、水生半翅目若蟲、蜻蜓稚蟲、豆娘稚蟲、水中節肢動物如豐年蟲等，有時捕食椎實螺、扁卷螺等軟體動物。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山西、河北、遼寧；菲律賓、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、印尼、大洋洲。

Corixidae 划蝽科

(Li, 1996, 18(1):45)

Articorixa kolthoffi Linnaeus 安划蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:77)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Hesperocorixa distanti (Kirkaldy) 狄氏夕划蝽 (Liu et Ren, 1997:184; Ren, 1992:166)

Hesperocorixa distanti (Kirkaldy, 1899:)

捕 食 性。

分 佈：廣西、貴州、湖北、河北；朝鮮、日本。

Micronecta quadriseta Lundblad 小划蝽 (Huang et Chen, 1996, 18(1):16-18; Zhang, 1985:216; Zhang, 1987[ed.] 1:77)

別 名：*四毛划蝽*。

捕 食：*Aedes albopictus* 蚊(孑孓)

水螨、水中線蟲、多種水蚤等。

分 佈：江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、上海、山東、河北、遼寧。

Micronecta sahlbergi (Jakovlev) 沙氏棘小划蝽 (Ren, 1992:167)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、貴州；日本。

Micronecta sedula Horvàth 細划蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:77)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Sigara distanti Kirkaldy 大划蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:77)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Sigara esakii Lundblad 江崎爍划蝽 (Ren et Bu, 1995:138)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、陝西、山西。

Sigara (Vermicorixa) septem-lineata (Paiva) 暗紋跡爍划蝽 (Ren, 1992:167)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州；緬甸。

Sigara substriata Uhler 橫紋划蝽 (Zhang, 1985:217; Zhang, 1987[ed.] 1:77)
別 名：*暗紋划蝽*。
捕 食：搖蚊幼蟲、水底線蟲、水螨、多種水蚤。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、河北、遼寧。

Sigara (s. str.) **takahashii** Hungerford 泰氏爍划蝽 (Ren, 1992:166)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖北。

Sigara vittipennis Horvàth 條划蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:78)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Notonectidae 仰蝽科

Anisops exigera Horvàth 南小仰蝽 (Liu et Zheng, 1990:349)
Anisops exigera Horvàth
捕 食 性。
分 佈：海南、廣東、雲南。

Anisops fieberi Kirkaldy 小仰蝽 (Zhang, 1985:218; Zhang, 1987[ed.] 1:77)
捕 食：孑孓、水生小動物。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、上海、北京；馬來西亞、印度北部、阿富汗、斯里蘭卡。

Anisops protracta Liu et Zheng 突頂小仰蝽 (Liu et Zheng, 1990:349)
Anisops protracta Liu et Zheng, 1990:349-350.
捕 食 性。
分 佈：廣西(南寧)。

Enithares sinica Stål 華仰蝽 (Zhang, 1985:219; Zhang, 1987[ed.] 1:77)
捕 食：孑孓及蛹，豆娘稚蟲、蜉蝣稚蟲、水生蠅類、落水面的蟻、蛾蝶類幼蟲，初齡若蟲主要捕食水螨、多種水蚤。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、四川、浙江、江蘇。

Notonecta (s. str.) **chinensis** Fallou 黑紋仰蝽 (Liu et Zheng, 1992:164; Zhang, 1985:219; Zhang, 1987[ed.] 1:77)

捕 食：能捕食大量孑孓，蜉蝣稚蟲、豆娘稚蟲、搖蚊幼蟲、水生蠅類幼蟲水蚤等.

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山西、天津、北京、遼寧、黑龍江；日本。

Notonecta reuteri Hungerford 羅氏仰蝽 (Liu et Zheng, 1992:104)

Notonecta reuteri Hungerford, 1928:

捕 食 性。

分 佈：四川、青海、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、法國、中歐、北歐、

CORRODENTIA 嚙蟲目

Caeciliidae 毛嚙蟲科

Caecillus sp. 食蚧嚙蟲 (Su et al., 1986:37)

捕 食：*Pseudaulacaspis cockerelli* (Cooley) 考氏白盾蚧(白蘭)。

分 佈：廣東。

ANOPLULA 蝨目

Hoplopleuridae 甲脇蝨科

Hoplopleura acanthopus (Burmeister) 棘足甲脇蝨 (Deng et Cui, 1992:417)

Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1839:)

寄 主：田鼠、家鼠。

分 佈：西藏、雲南、青海、內蒙古、黑龍江；瑞典等歐洲一些國家、加拿大、美國。

Hoplopleura affinis (Burmeister) 相關甲脇蝨 (Deng et Cui, 1992:417)

Hoplopleura affinis (Burmeister, 1839:)

寄 主：姬鼠。

分 佈：雲南、西藏、吉林；西伯利亞、歐洲、美國、巴拉圭、秘魯、阿根廷。

Hoplopleura apomydis Ferris 家鼠甲脇蝨 (Deng et Cui, 1992:418)

Hoplopleura apomydis Ferris, 1921:

寄 主：鼠(*Rattus* sp.)。

分 佈：雲南；菲律賓。

Hoplopleura cricetuli Ferris 倉鼠甲脇蝨 (Deng et Cui, 1992:418)

Hoplopleura cricetuli Ferris, 1951:

寄 主：倉鼠。

分 佈：雲南、河南、陝西、河北。

Hoplopleura ochotonae Ferris 鼠兔甲脇蝨 (Deng et Cui, 1992:417)

Hoplopleura ochotonae Ferris, 1922:

寄 主：鼠兔。

分 佈：雲南、青海、甘肅；蒙古。

Polyplacidae 多板蝨科

Polyplax serrata (Burmeister) 鋸多板蝨 (Deng et Cui, 1992:419)

Polyplax serrata (Burmeister, 1839:)

寄 主：姬鼠。

分 佈：福建、貴州、雲南；瑞士、西班牙、英國等歐洲國家。

Sathrax dura Johnson 硬樹鼩蝨 (Deng et Cui, 1992:419)

Sathrax dura Johnson, 1964:

寄 主：樹鼩。

分 佈：雲南；馬來西亞。

THYSANOPTERA 纓翅目

Aeolothripidae 紋薊馬科

Aeolothrips conjunctus Kurosawa 橫連紋薊馬 (Zhang, 1980(1):1)

Aeolothrips conjunctus Kurosawa, 1968:

捕 食：蚜蟲、薊馬(牧草及禾本科雜草)。

分 佈：雲南、青海、寧夏；日本。

Aeolothrips fasciatus (Linnaeus) 橫紋薊馬 (ASZI, 1986, 1:129; Han, 1996:94; Han et Zhan, 1981:295; Yunn., 1987:498; Zhang, 1987[ed.] 1:119; Zhang, 1980(1):1)

Aeolothrips fasciatus (Linnaeus, 1761:)

別 名：*紋薊馬*。

棲 息：棉花、小麥、蔥蒜、苜蓿等物。

捕 食：薊馬

Anaphothrips obscurus (Müller) 玉米黃呆薊馬(北京)

蚜蟲

樟盾蚧

蛾類(卵)

葉蟎

紅花草、苕子、蠶豆等花器。

分 佈：臺灣、江西、廣東、雲南、西藏(日喀則)、湖北、河南、河北、北京、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、龍江江；日本、歐洲、北美等地。

Aeolothrips xizangensis Han 西藏紋薊馬 (Han, 1988:177)

Aeolothrips xizangensis Han, 1986:199-200.

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Aeolothrips sp. 紋薊馬 (Han et Cui, 1992:420)

Aeolothrips sp., Han et Cui, 1992:420.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Franklinothrips myrmicaeformis Zanon 蟻形長角薊馬 (Han, 1997:531)

Franklinothrips myrmicaeformis Zanon, 1924:

捕 食：其它薊馬。

分 佈：湖北；巴勒斯坦、利比亞。

Thripidae 薊馬科

Mycterothrips consociatus (Targioni-Tozzetti) 并喙薊馬 (Han et Cui, 1992:425)

Mycterothrips consociatus (Targioni-Tozzetti, 1887:)

棲 息：九里香、苦楝、毛柃、肖蒲桃、山毛櫸科、黃桐、海南楊桐、三白草。

捕 食：葉蟎。

分 佈：廣東、海南、四川；歐洲。

Scolothrips asura Ramakrishna et Margabandbu 異色六點薊馬 (Zhang, 1980(1):3)

Scolothrips asura Ramakrishna et Margabandbu, 1931:

棲 息：柑橘、梨、枇杷等果樹上。

捕 食：葉蟎。

分 佈：廣東、廣西、雲南；印度。

Scolothrips dilongicornis Han et Zhang 肖長角六點薊馬 (ASZI, 1986, 1:131)

捕 食：葉蟎。

分 佈：河北、北京。

Scolothrips quadrinotata Han et Zhang 四斑食蟎薊馬 (ASZI, 1986, 1:132; Han et Cui, 1992:422; Liu et al., 1994:554)

捕 食：葉蟎(茄子、扁豆、羊蹄夾、檳榔葉上)。

分 佈：臺灣、廣東、雲南、四川。

Scolothrips sexmaculatus Pergande 六點薊馬 (Lo et Wu, 1989:182; Lo et al., 1984:342; Wen et Lee, 1981:134; Zeng, 1995, 11(2):90)

捕 食：梨木蝨

Tetranychus cinnabarinus Boistuval 朱砂葉蟎

草莓葉蟎。

分 佈：臺灣、山東。

Scolothrips takahashii Priesner 塔六點薊馬 (ASZI, 1986, 1:132; Chen et Wang, 1987:306; Chen et al., 1993:133; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Han, 1992:246; Huang et Gao, 1996:141; Hun., 1992:333; Lin et Chen, 1984:126; Lin et al., 1991:90; Lo et Ho, 1970:193; Meng, 1961:520; Wu et Ji, 1989:151-155; Xu et al., 1995. 17(3):121-124; Yan et Duran, 1988, 15(1):23-27; Yunn., 1987:502; Zhang et al., 1993(3):46-47; Zhang, 1980(1)3; Zhao, 1993:23;Zhu, 1994, 16(1):28-35)

別 名：*寬翅六點薊馬*。

棲 息：棉花、柑橘、柚、梨、桃、蘋果、桑、胡枝子、羊蹄甲、楊、柏、枸杞、玉蘭上捕食葉蟎。

捕 食：棉葉蟎

Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉蟎
Tetranychus truncatus Ehara 截形葉蟎
Tetranychus (s. str.) *urtica* Koch 二點葉蟎
Tetranychus vinnensis 山楂葉蟎
桃葉蟎
藏柏葉蟎
Brevipalpus obovatus Donn. 擬紅蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj.
Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 綉球葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida
Tetranychus piercei McGreger
棗葉蟎
棗銹蟎。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、北京。

Scolothrips sp. 四點薊馬 (Liu et al., 1994:554)

棲 息：檳榔葉。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Phlaeothripidae 管薊馬科

Aleurodothrips fasciapennis (Franklin) 捕蝨管薊馬 (ASZI, 1986, 1:142; Chang et al., 1995:403-411; Hun., 1992:337; Li et al., 1995:55-58; Liu et al., 1994:554; Tang et al., 1995(4):168; Tian et Chen, 1991:64-66; 1991:76; Zhang, 1980(1):4)

Aleurodothrips fasciapennis (Franklin, 1909:)
=*Cephalothrips spinosus* Bagnall

別 名：*斑薊馬，帶粉虱薊馬*。

棲 息：柑橘上

捕 食：蚜蟲

Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨(若蟲、卵)

Aleurocanthus woglumi Ashby 黑刺粉虱
Dialeurodes citri (Ashmead) 柑橘粉蝨 (若蟲、卵)
Dialeurodes citrifolii (Morgan) 雲翅粉虱
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Abgrallaspis cyanophilli (Signoret) 茶長本圓蚧(茶鈹盾蚧)(若蟲、卵)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Aonidiella aurantii (Maskell) 紅圓蚧
Parlatoria pergandii Comstock 糠片蚧
Lepidosaphes gloverii Peck 長牡蠣蚧
Lepidosaphes beckii (Newman) 紫牡蠣蚧
Cornuaspis beckii (Newman) 紫突眼蠣蚧
Temnaspidiotus destructor (Signoret) 椰凹圓蚧
Panonychus citri (McG.) 橘全爪蟎。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川；印尼、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、夏威夷、斐濟。

Haplothrips aceris (Karny) 褐尾管薊馬 (Lu et Wu, 1991:104; Zhang, 1980(1):5)

Hoplothrips sp. Lu et Wu, 1991:104.
棲 息：柑橘、柿、梨等果樹上。
捕 食：*Parasaissetia nigra* (Nietner) 烏副盔蚧
葉蟎。
分 佈：福建、廣東；日本。

Haplothrips odanaspicola Kurosawa 異色皮薊馬 (Zhang, 1980(1):6)

Hoplothrips odanaspicola Kurosawa, 1937:
棲 息：梨、蘋果、桃樹上。
捕 食：蚜蟲
薊馬。
分 佈：河南；日本。

Karnyothrips flavipes Moulton 黃脛長鬃薊馬 (Hun., 1992:338; Pan et al., 1987:186)

捕 食：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧(廣東)
粉蝨、蟎類。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、四川；日本、印度、夏威夷。

Leptothrips sp. 黑薊馬 (Lo et Tao, 1964:45)

Leptothrips sp., Lo et Tao, 1964:45.
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎
分 佈：臺灣。

COLEOPTERA 鞘翅目

Cicindelidae 虎甲科

Cicindela albopunctata Chaudoir 白斑虎甲 (Tan, 1981:334; 1988:224; 1992:479)

Cicindela albopunctata Chaudoir, 1852:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(墨脫、察隅、梓木)、四川；印度、不丹、錫金、尼泊爾。

Cicindela aurulenta Fabricius 金斑虎甲 (ASZI, 1986, 1:416; He et al., 1991:92; Hun., 1992:341; Li et al., 1990:51; Sun et al., 1984:111; Tan, 1981:334; 1988:224; 1992:257; 1992:479; Tan et Ma, 1997:622; Tsai et al., 1994:561-561; 1995:203-213; Xu et Luo, 1995:215; Yunn., 1987:541; Zhang, 19987[ed.] 2:3)

Cicindela aurulenta Fabricius, 1801:

別 名：*八星虎甲*。

捕 食：水稻螟蟲
多種昆蟲
小動物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、察隅)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、錫金、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Cicindela aurulenta f. batesi Flent 貝氏金斑虎甲 (He et al., 1991:92)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：湖南。

Cicindela brevipilosa Horn 短毛虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:3)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Cicindela cancellata Dejean 錦紋虎甲 (Yunn., 1987:540)

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南、印尼、緬甸、印度、錫金。

Cicindela chinensis DeGeer 中華虎甲 (ASZI, 1986, 1:417; ASZI et al., 1978:168; Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:92; Hun., 1992:341; Li et al., 1990:52; Sun et al., 1984:111; Tan, 1992:257; 1992:480; Tan et Ma, 1997:621; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Xu et Luo, 1995:215; Yunn., 1987:540; Zhang, 1987[ed.] 2:3)

Cicindela chinensis DeGeer, 1774:

捕 食：成蟲、幼蟲均爲捕食性
蝗蟲
稻螟蟲
各種昆蟲和小動物。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅。

Cicindela davidi Fairmaire 匙斑虎甲 (Tan, 1992:480)

Cicindela davidi Fairmaire, 1887:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Cicindela delavayi Fairmaire 絨斑虎甲 (Tan, 1992:258; 1992:480)
Cicindela delavayi Fairmaire, 1886:
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、四川；越南、印度。

Cicindela desgodinsi Fairmaire 金緣虎甲 (Tan, 1981:332; 1992:480; Yunn., 1987:541; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
捕 食：*Neodiprion guangxiicus* 廣西新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：廣西、雲南、西藏(察雅)、四川、甘肅。

Cicindela elisae Motschulsky 雲紋虎甲 (ASZI, 1986, 1:417; He et al., 1991:92; Hun., 1992:342; Tan, 1992:480; Tan et Ma, 1997:623; Yunn., 1987:541; Zong et al., 1984:249)
Cicindela elisae Motschulsky, 1859:
別 名：*曲紋虎甲*。
捕 食：鱗翅目(幼蟲)
稻田地面多種小蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Cicindela gemmata Faldermann 芽斑虎甲 (He et al., 1991:92; Hun., 1992:342; Tan, 1992:258; Tan et Ma, 1997:623; Yunn., 1987:541)
Cicindela gemmata Faldermann, 1835:
別 名：*紫銅虎甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、湖北、河南、山東、河北、北京、青海、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯。

Cicindela gracilis Pallas 雙狹虎甲 (He et al., 1991:92)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：河南、東北。

Cicindela granulata Gebler 方胸虎甲 (Tan, 1996:108)
Cicindela granulata Gebler, 1843:36.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯。

Cicindela histrio Tsch (Zhang, 1987[ed.] 2:3)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Cicindela hybrida Linnaeus 多型虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:3)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Cicindela hybrida japonensis Chaudoir 多型虎甲(日本亞種) (He et al., 1991:92)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：河南。

Cicindela hybrida nitida Lichtenstein 多型虎甲(紅翅亞種) (ASZI, 1986, 1:417; ASZI et al., 1978:168; He et al., 1991:92)

捕 食：蝗蟲

Mythimna separata Walker 粘蟲(幼蟲)

蚜蟲

各種昆蟲和小動物。

分 佈：湖南、四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、東北；朝鮮、蘇聯。

Cicindela hybrida transbaicalica Motschulsky 多型虎甲(銅翅亞種) (ASZI, 1986, 1:418; ASZI et al., 1978:168; He et al., 1991:92)

捕 食：蝗蟲

葉蟬

Mythimns separata Walker 粘蟲

各種昆蟲和小動物。

分 佈：福建、湖南、四川、江蘇、安徽、陝西、山西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯。

Cicindela interrupto-fasciata Schmidt-Goebel T 紋虎甲 (Yunn., 1987:540)

捕 食 性。

分 佈：廣東沿海地區、雲南；柬埔寨、緬甸。

Cicindela japonensis Chaudoir 日本虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:3)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Cicindela kaleea Bates 星斑虎甲 (ASZI, 1986, 1:418; He et al., 1991:92; Hun., 1992:342; Li et al., 1990:51; Tan, 1992:258; 1992:480; Tan et Ma, 1997:622; Zhang, 1987[ed.] 2:3)

Cicindela kaleea Bates, 1866:

捕 食：(稻田)、多種昆蟲、小動物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅；印度。

Cicindela laetescripta Motschulsky 花斑虎甲 (He et al., 1991:93; Li et al., 1990:50; Zhang, 1987[ed.] 2:3)

別 名：*白底龜紋虎甲*。

捕 食：稻田地面多種小蟲、小動物。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、四川、湖北、河南、陝西、河北、甘肅、內蒙古。

Cicindela labipennis Bates 鉗端虎甲 (ASZI, 1986, 1:418)

捕 食 性。

分 佈：江西、浙江、江蘇、湖北、河南。

Cicindela litterfera Chaudoir 小虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Cicindela lunulata Fabricius 月斑虎甲 (ASZI, 1986, 1:419)

捕 食 性。

分 佈：貴州、河南、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧；蘇聯、埃及、伊朗、敘利亞、歐洲。

Cicindela mouhoti Chaudoir 紋虎甲 (Yunn., 1987:549)

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南、柬埔寨、泰國。

Cicindela pseuddodeserticola Horn 擬荒漠虎甲 (Tan, 1996:108)

Cicindela pseuddodeserticola Horn, W. *in* Horn, W. et Roeschke, 1891:112.

捕 食 性。

分 佈：寧夏、新疆、內蒙古。

Cicindela sachalinensis Morawitz 樺太虎甲 (He et al., 1991:93)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：四川、河南、河北、內蒙古、東北；庫頁島。

Cicindela sexpunctata Fabricius 六星虎甲 (Li et al., 1990:50; Yunn., 1987:540)

捕 食：多種昆蟲、小動物。

分 佈：臺灣、廣西、雲南；菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Cicindela specularis Chaudoir 鏡面虎甲 (ASZI, 1986, 1:419; He et al., 1991:93; Hun., 1992:342; Li et al., 1990:49; Sun et al., 1984:111; Tan, 1992:480; Zong et al., 1984:249; Zhang, 19887[ed.] 2:4)

別 名：*散紋虎甲，金斑虎甲，小斑虎甲*。

捕 食：鱗翅目昆蟲
稻田地面多種小蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；日本、柬埔寨、印尼。

Cicindela striolata Illiger 斷紋虎甲 (ASZI, 1986, 1:419; Li et al., 1990:51; Yunn., 1987:539)

捕 食：多種昆蟲、小動物。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、北京；菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、緬甸、印度、錫金。

Cicindela striolata dorsalineolata Chevrolat 斷紋虎甲(斜斑亞種) (He et al., 1991:93; Hun., 1992:343; Tan et Ma, 1997:623; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

Cicindela striolata dorsalineolata Chevrolat, 1845:

別 名：*條紋虎甲，連珠虎甲*。

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、北京。

Cicindela striolata striolata Liger 斷紋虎甲 (He et al., 1991:93; Sun et al., 1984:111)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東、河北、北京。

Cicindela sumatrensis Herbst 膨邊虎甲 (ASZI, 1986, 1:420; He et al., 1991:93; Li et al., 1990:52; Yunn., 1987:540; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食：(稻田)、多種昆蟲、小動物。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、河北、甘肅；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Cicindela tricolor Adams 三色虎甲 (He et al., 1991:93)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：河南。

Cicindela sp. 虎甲(Shi et al., 1989-90:86)

捕 食：(橘園)。

分 佈：上海。

Cicindela sp. 無斑虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Cicindela sp. 虎甲 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

捕 食：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(蝠蛾)

分 佈：廣東。

Collyris (Neocollyris) attenuata Redtenbacher 細胸樹棲虎甲 (Tan, 1981:331)

捕 食 性。

分 佈：西藏(樟木)；印度、錫金、尼泊爾。

Collyris (Neocollyris) auripennis Horn 麗鞘樹棲虎甲 (Tan, 1992:257)

捕 食 性。

分 佈：湖南；越南、印度。

Collyris bipartite Fleutiaux 紅黑樹棲虎甲 (Tan, 1992:479)

Collyris bipartite Fleutiaux, 1897:

捕 食 性。

分 佈：雲南；緬甸、印度。

Collyris bocolor Horn 二色樹棲虎甲 (Yunn., 1987:536)

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南。

Collyris (Neocollyris) bonelli Guerin 瓶胸樹棲虎甲 (Hun., 1992:340; Li et al., 1990:53; Yunn., 1987:536)

別 名：*光背樹棲虎甲*。

捕 食：多種昆蟲、小動物。

分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏；越南、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

Collyris crassicornis Dejean 棒角樹棲虎甲 (Yunn., 1987:536; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。

分 佈：江西、雲南；馬來西亞、印尼、緬甸、泰國、印度。

Collyris (Neocollyris) cylindripennis Chaudoir 柱鞘樹棲虎甲 (Hun., 1992:340; Tan, 1992:257)

捕 食：小昆蟲。

分 佈：湖南、貴州；泰國、緬甸。

Collyris (Neocollyris) formosana rugosior Horn 臺灣樹棲虎甲(皺胸亞種) (Hun., 1992:341; Tan, 1992:257; Tan et Ma, 1997:621; Xu et Luo, 1995:215)

Collyris formosana rugosior Horn, 1896:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、湖北。

Collyris fruhstorfei Horn 紫金樹棲虎甲 (Tan, 1992:479)

Collyris fruhstorfei Horn, 1902:

捕 食 性。

分 佈：雲南；泰國、緬甸。

Collyris fuscitarsis Schmidt-Goebel 黑跗樹棲虎甲 (Yunn., 1987:536)

捕 食 性。
分 佈：雲南；越南、印尼、緬甸、印度。

Collyris linearis Schmidt-Goebel 狹樹棲虎甲 (Tan, 1992:479; Zhang, 1987[ed.] 2:4)
Collyris linearis Schmidt-Goebel, 1946:
別 名：*線形樹棲虎甲*。
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南；泰國、緬甸。

Collyris (Neocollyris) saphyrina Chaudoir 黑脛樹棲虎甲 (Tan, 1981:331)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(吉隆、樟木)；泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、印尼。

Collyris sp. 黃足小青虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Collyris sp. 青虎甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Heptodonta eugenia Chaudoir 麗七齒虎甲 (Yunn., 1987:536)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Heptodonta nodicollis Bates 球胸七齒虎甲 (Tan, 1981:333)
捕 食 性。
分 佈：西藏(察隅)；越南、印度。

Heptodenta pulchella Hope 麗七齒虎甲 (Tan, 1992:479)
Heptodenta pulchella Hope, 1831:
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南、西藏；緬甸、錫金、尼泊爾。

Prothyma limbata Wiedemann 雙斑光腹虎甲 (Yunn., 1987:539)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

Therates biserratus Tan, Mo et Liang 雙鋸球胸虎甲 (Hun., 1992:341; Tan, 1992:257)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、湖北。

Therates fruhstorferi Horn 藍亮球胸虎甲 (Tan, 1992:257; Yunn., 1987:539)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南；越南。

Therates motoensis Tan 墨脫球胸虎甲 (Tan, 1981:332; Wu, 1988:573)

Therates motoensis Tan, 1981:332.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Tricondyla gestroi Fleutiaux 駝缺翅虎甲 (Tan, 1981:332)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏；越南、柬埔寨、緬甸、孟加拉。

Tricondyla macrodera Chaudoir 光端缺翅虎甲 (Hun., 1992:340; Tan, 1981:332; 1992:257; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、西藏(黑脫)、貴州、雲南、西藏、安徽；越南、馬來西亞、印度、錫金、不丹。

Tricondyla mellyi Chaudoir 駝缺翅虎甲 (Yunn., 1987:537)

捕 食 性。

分 佈：雲南；越南、印度。

Tricondyla pulchripes White 長胸缺翅虎甲 (Yunn., 1987:537)

捕 食 性。

分 佈：廣東及沿海島嶼、雲南；越南、寮國。

Carabidae 步甲科

(Chen et Chen, 1991:27-28; Chen et al.., 1993:47; Yu, 1997:625-635)

Acupalpus biplagiatus Boheman 俗尖須步甲 (He et al., 1991:93; Sun et al., 1980(4):23)

Acupalpus sp. Sun et al., 1980(4):23.

=*Acupalpus inornatus* Bates, Misidentified.

別 名：*尖須步甲*。

捕 食：稻薊馬
稻飛蝨、葉蟬
蚜蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北、河北。

Acupalpus inornatus Bates 尖須步甲 (Yu, 1997:625; Yu et al., 1983:164; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

Acupalpus inornatus Bates, 1873:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、雲南、四川、湖北；日本。

Agastus ustulatus (Gestro) 慕步甲 (Chen et al., 1993:47)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Agonotrechus sinicola Deuve 中國行步甲 (Deuve, 1989:231)

Agonotrechus sinicola Deuve, 1989:231.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Agonum atricomes (Bates) 暗細脛步甲 (Xie et Yu, 1992:250; Yu, 1997:625)

Agonum atricomes (Bates, 1873:)

別 名：*短跗細脛步甲*。

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、湖北；日本。

Agonum (Metacolpodes) buchanani (Hope) 布氏細頸步甲 (Hun., 1992:344; Xie et Yu, 1992:250; Xu et Luo, 1995:214; Yu, 1992:470; 1997:625)

Agonum buchanani (Hope, 1831:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、北美。

Agonum chalcomus (Bates) 銅細脛步甲 (Xie et Yu, 1992:250)

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江。

Agonum daimio Bates 條細脛步甲 (ASZI, 1986, 1:425; Dai, 1995, 11(4):184; He et al., 1991:93; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

別 名：*背條合地步甲*。

捕 食：稻蠟蟬(卵、若蟲)

捲葉蛾(幼蟲)

稻負泥蟲(幼蟲)

茶園食蚜蠅幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、江蘇、上海、湖北、河南；朝鮮、日本。

Agonum (Diacanthostylus) elainus elainus (Bates) 欖細脛步甲 (Hun., 1992:343；Xie et Yu, 1992:250)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、湖北；日本。

Agonum gracilipes (Duftschmid) 纖細脛步甲 (Xue et Yu, 1996:102)

Carabus gracilipes Duftschmid, 1812:144.

捕 食 性。

分 佈：西藏、青海、新疆；西伯利亞、歐洲。

Agonum impressum Panzer 凹細脛步甲 (Yu, 1992:470)

Agonum impressum Panzer, 1797:

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、青海；日本、西伯利亞、歐洲、阿拉斯加。

Agonum (Eucolpodes) japonicum (Motschulsky) 日本細脛步甲 (ASZI, 1986, 1:426; Chen, 1996, 18(1):20; Chen et al., 1999, 15(3):122; He et al., 1991:94; Hun., 1992:343; Li et al., 1990:53; Ren et al., 1993(4):39; Sun et al., 1984:111; Xie et Yu, 1992:250; Yu et al., 1983:164; Yunn., 1987:535; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

Colpodes japonica Motschulsky, 1860:

別 名：*赤腹扁步甲，日本殘步，日本賽步甲*。

捕 食：捲葉蛾、燈蛾、螟蛾(幼蟲)

稻葉蟬、稻蠟蟬

稻蚜

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcefera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Mythimns separata (Walker) 粘蟲

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

Oulema oryzae (Kuwayama) 水稻負泥蟲(幼蟲)

柑橘園害蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、上海、湖北、山東；朝鮮、日本。

Agonum magnum Bates 大細脛步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Agonum obscuritarsis (Chaudoir) 暗跗細脛步甲 (Xie et Yu, 1992:250)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、四川、湖北；日本、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印尼。

Agonum olivius Bates 欖色細脛步甲 (Xie et Yu, 1992:250; Yu, 1997:626)

Agpnum olivius Bates, 1879:

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、雲南、浙江、湖北；越南、寮國、緬甸、印度、錫金。

Agonum quadripunctatum DeGeer 四點細脛步甲 (Yu, 1992:470)

Agonum quadripunctatum DeGeer, 1774:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川；菲律賓、印度、西伯利亞、歐洲、加拿大、美國。

Agonum rubriolum Bates 紅胸細脛步甲 (Yu et al., 1983:164)

Agonum rubriolum Bates

捕 食 性。

分 佈：福建。

Agonum saphyripennis Chaudoir 青翅細脛步甲 (Yu, 1992:470)

Agonum saphyripennis Chaudoir, 1878:

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Agonum sikkimensis Andrewea 錫金細脛步甲 (Yu, 1992:471)

Agonum sikkimensis Andrewea, 1923:

捕 食 性。

分 佈：雲南；錫金。

Agonum xestus (Bates) 光細脛步甲 (Yu, 1997:626)

Agonum xestus (Bates, 1883:)

捕 食 性。

分 佈：廣西、湖北；日本。

Agonum sp. (Yu et al., 1983:164)

Agonum sp. Yu et al., 1983:164.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Allocota cyanipennis Heller 藍翅點條步甲 (Yu, 1997:626)

Allocota cyanipennis Heller, 1923:

捕 食 性。

分 佈：湖北；菲律賓。

Amara chalcites Dejean 銅暗步甲 (Chen et al., 1999, 15(3):122; He et al., 1991:94; Zhang, 1998, 14(2):47)

別 名：*暗銅步甲，暗閃銅步甲*。

捕 食：*Toxoptera aurantii* (Boyer) 小橘蚜(*茶二岔蚜*)

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

茶捲葉蛾

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：西藏、江西、湖南、浙江、湖北、吉林。

Amara congrus Morawitz 暗步甲 (Shi et al., 1989-90:86)

捕 食：(橘園)。

分 佈：上海。

Amara sp. 暗步甲 (Yu et al., 1983:164)

Amara sp. Yu et al., 1983:164.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Amblystoma quadriguttatus Motschulsky 四斑偏唇步甲 (Chen et al., 1993:47; Yu, 1997:626)

Amblystoma quadriguttatus Motschulsky, 1858:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖北；日本、越南、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Amblystoma sp. (Yu et al., 1983:164)

Amblystoma sp. Yu et al., 1983:164.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Anchista binotata Dejean 雙斑親步甲 (Sun et al., 1984:111; Zhang, 1987[ed.] 2:4)

別 名：*淡斑肩穴步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：江西、廣東。

Anisodactylus (s. str.) **punctatipennis** Morawitz 點翅斑步甲 (Hun., 1992:344; Ren et al., 1993(4):39)

捕 食：柑橘園害蟲。
分 佈：湖南、四川、浙江；朝鮮、日本。

Anisodactylus signatus (Panzer) 斑步甲 (ASZI, 1986, 1:426; Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287)

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Euxoa oberthuri Leech 白邊切根蟲(幼蟲)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois 非洲螻蛄(卵,若蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
Mythimns separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜
麥葉蜂(幼蟲)
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(幼蟲、蛹)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
向日葵螟(幼蟲)
Carposina niponensis Walsingham 桃蛀果蛾(幼蟲)。
分 佈：江蘇、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯(西伯利亞至高加索)、歐洲。

Anisodactylus (s. str.) **tricuspidatus** Morawitz 三尖斑步甲 (Hun., 1992:344)

Anisodactylus tricuspidatus Morawitz, 1863:
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、湖北、陝西；朝鮮、日本。

Anoplogenius cyanescens (Hope) 寡行步甲 (ASZI, 1986, 1:428; He et al., 1991:94; Xie et Yu, 1992:250; Yu, 1997:626; Yu et al., 1983:164; Zhang, 1987[ed.] 2:4; Zhu et Zheng, 1987:195)
Anoplogenius cyanescens (Hope, 1845:)
別 名：*黃邊寡步甲，青寡步甲*。
捕 食：螻蛄(卵、若蟲)
Mythimns separata Walker 粘蟲(幼蟲)
棉鈴蟲(幼蟲)
地老虎(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、內蒙古、吉林；朝鮮、日本。

Aristochroa gratiosa Tschitscherine 嬌山麗步甲 (Yu, 1992:471)
Aristochroa gratiosa Tschitscherine, 1898:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Aristochroa rotundata Yu 圓角山麗步甲 (Yu, 1992:471)
Aristochroa rotundata Yu, 1992:471-472.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Aristochroa venusta Tschitscherine 山麗步甲 (Yu, 1992:471)
Aristochroa venusta Tschitscherine, 1898:
捕 食 性。
分 佈：四川、青海。

Badister marginellus Bates 小邊速步甲 (Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1997:626)
Badister marginellus Bates, 1873:
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、湖北；日本。

Badister pictus Bates 色速步甲 (He et al., 1991:94; Zhang, 1987[ed.] 2:4)
別 名：*四斑速步甲，色裂唇步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、湖北、河北、新疆。

Bembidion articulatum (Li, 1992:140)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Bembidion fuscicrus Motschulsky 褐腿錐須步甲 (Yu, 1981:327)

捕食性。

分佈：西藏、河北；西伯利亞、中亞、蒙古、印度、加拿大、阿拉斯加。

Bembidion hingstoni Andrewes 高山錐須步甲 (Yu, 1981:326)

捕食性。

分佈：西藏(絨布寺、崗巴、定結、協嘎爾)。

Bembidion leucolenum (Li, 1992:140)

捕食性。

分佈：遼寧。

Bembidion lissonotum Bates 光背錐須步甲 (Yu, 1997:626)

Bembidion lissonotum Bates, 1873:

捕食性。

分佈：江蘇、湖北；朝鮮、日本。

Bembidion niloticum Dejean 尼羅錐須步甲 (ASZI, 1986, 1:424; He et al., 1991:94; Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1997:626; Yu et al., 1983:164; Zhang, 1987[ed.] 2:4; Zong et al., 1984:249)

Bembidion niloticum Dejean, 1875:

別名：*斜溝錐須步甲，小錐須步甲*。

捕食：蘇馬

葉蟬

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

Parnara guttata guttata Bremer et Grey 稻苞蟲。

分佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、新疆、東北；日本、菲律賓、越南、柬埔寨。

Bembidion nivicola Andrewes 雪錐須步甲 (Yu, 1981:326)

捕食性。

分佈：西藏(聶拉木色龍、絨布寺、絨轄河口)；印度西北部。

Bembidion obenbergeri Latrail 黑光錐須步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕食性。

分佈：江西。

Bembidion pogonides (Li, 1992:140)

捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Bembidion proteron Netolitzky 藍錐鬚步甲 (Xie et Yu, 1992:251)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、四川、江蘇。

Bembidion radian Andrewes 亮錐須步甲 (Yu, 1981:327)
捕 食 性。
分 佈：西藏；印度、錫金。

Bembidion semilunitum Bates 半淡錐須步甲 (He et al., 1991:94; Li, 1992:140; Zhang, 1987[ed.] 2:4)
別 名：*月牙錐須步甲*。
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
棉鈴蟲(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、江蘇、遼寧。

Bembidion sp. 錐須步甲 (Yu et al., 1983:164)
Bembidion sp. Yu et al., 1983:164.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Bembidion sp. 錐次步甲 (Zhang, 1998, 14(2):47)
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Brachynus aeneicostis Bates 青銅氣步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Brachynus incomptus Bates 黃頸小氣步甲 (Yu, 1997:627; Zhang, 1987[ed.] 2:4)
Brachynus incomptus Bates, 1873:
別 名：*小氣步甲*。
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本。

Brachinus levisii Bates 雙斑氣步甲 (Zhe et Zheng, 1987:195)
捕 食 性。
分 佈：河南。

Brachynus longicornis Motschulsky 長氣步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:4)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Brachinus nigridorsis Nakane 黑背短鞘步甲 (Chen et al., 1993:47; Wei et Kai, 1988:224; Yu, 1997:627; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
Brachinus nigridorsis Nakane, 1962:
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽；日本(本州)。

Brachinus scotomedes Redtenbacher 大氣步甲 (Hun., 1992 :344; Shi et al., 1989-90:86; Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1992:472; 1997:627; Zhang, 19987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:195)
Brachinus scotomedes Redtenbacher, 1867:
捕 食：(橘園)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西；日本。

Brachinus stenoderus Bates 狹頸氣步甲 (Yu et al., 1983:164; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:195)
別 名：*黃頸青氣步甲*。
捕 食 性。
分 佈：福建、河南。

Bradycellus laetticolor Bates 悅怠步甲 (Yu, 1997:627)
Bradycellus laetticolor Bates, 1873:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、四川、浙江、湖北；日本。

Bradycellus subditus (Lewis) 紅怠步甲 (Yu, 1997:627)
Bradycellus subditus (Lewis, 1879:)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北；日本。

Broscosoma gracile Andrewes 細球胸步甲 (Yu, 1981:325)
捕 食 性。
分 佈：西藏(米林)；錫金。

Broscosoma ribbei Putzeys 綠球胸步甲 (Yu, 1981:325)
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)；越南、印度、錫金。

Broscus punctatus Dejean 點鞘柄胸步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:5)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Broscus punctatus davidianus Pirmaire 刻點肉步甲 (Yu, 1992:472; Yu et al., 1983:165)

Broscus punctatus davidianus Pirmaire, 1888:
別 名：*大衛點肉步甲*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江。

Caelostomis picipes Macleay 紅足雕口步甲 (Yu, 1997:627)
Caelostomis picipes Macleay, 1825:
捕 食 性。
分 佈：江西、四川、浙江、湖北；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Calathus (Dolichus) halensis Schaller 赤胸步甲 (ASZI et al., 1978:170; Chen et Li, 1992:186; Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Li et al., 1990:54; Lu et al., 1986:63; Wang et al., 1989:91; Yan et al., 1993, 9(2):50; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:218; Zong et al., 1984:249)
別 名：*蠋步甲，紅斑梳步甲，二步甲*。
捕 食：螻蛄
Mametra brassicae 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
大豆蚜
Holotrichia diomphalia Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
甘薯麥蛾
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
Carposina niponensis Walsingham 桃蛀果蛾(幼蟲)
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
切根蟲
Memestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Mythimns separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)。
分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山西、河北、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

Calathus halensis var. **eohalensis** Jeannel 赤胸步甲(有斑變種) (Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食：甘薯麥蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：河南。

Calathus halensis var. **flavicornis** Fabricius 赤胸步甲(黃角變種) (Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食：甘薯麥蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：河南。

Calathus halensis var. **ruficollis** Jeannel 赤胸步甲(無斑變種) (Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食：甘薯麥蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：河南。

Calathus melanocephalus (Linnaus) 黑頭梳步甲 (Xue et Yu, 1996:104)
Carabus melanocephalus Linnaus, 1758:415.
捕 食 性。
分 佈：新疆；西伯利亞、高加索、歐洲。

Calathus spoliatus Rossi 黃綠青步甲 (Xue et Yu, 1996:104)
Calathus spoliatus Rossi, 1790:33.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、江蘇、湖北、陝西、河北、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、黑龍江；蒙古、西伯利亞、伊朗、中歐。

Callida lepida Redtenbacher 雅麗步甲 (Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1988:219; 1997:6227; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:531; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
Callida lepida Redtenbacher
別 名：*寬須步甲*。
捕 食：捲葉蛾、夜蛾的幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、湖北；朝鮮、日本。

Callida onoha Bates 小麗步甲 (Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1997:627)
Callida onoha Bates, 1873:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、貴州、浙江、湖北；朝鮮、日本。

Callida (Callidiola) splendidula (Fabricius) 燦麗步甲 (ASZI, 1986, 1:431; Hun., 1992:344; Yu, 1997:627; Xie et Yu, 1992:251; Yu et al., 1983:165; Yunn.,1987:531; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
Callida splendidula (Fabricius), 1801:
別 名：*綠邊寬須步甲*。
捕 食：鱗翅目幼蟲
捲葉蛾(幼蟲)
茶捲葉螟
夜蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、甘肅、吉林；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來

西亞、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞。

Calleida sp. 綠邊步甲 (Liu, 1958:308)
捕 食：*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick　柑橘擬小黃捲葉蛾。
分 佈：廣東。

Callistoides pericallus Redtenbacher 黃胸麗步甲 (He et al., 1991:94; Ren et al., 1993(4):39; Wang et al., 1989:91; Zhu et Zheng, 1987:218)
別 名：*黃胸麗地甲*。
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
柑橘園害蟲。
分 佈：江西、湖南、浙江、上海、安徽、湖北、河南、河北。

Callistomimus allistoides pericallius Redtenbacher 黃胸麗步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:5)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Callistomimus coartatus Laferte 聚類麗步甲 (Hun., 1992:345)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、安徽；印度。

Callistomimus (s. str.) **modestus** (Schaum) 謙類麗步甲 (He et al., 1991:94; Hun., 1992:345)
別 名：*樸素步甲*。
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南、江蘇、安徽、河北；日本、越南、緬甸、印度。

Callistomimus okutanii Habu 類麗步甲 (Yu et al., 1983:165; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
Callistomimus okutanii Habu
別 名：*婁麗步甲*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西。

Calosoma (Caminaria) arrowianum Breuning 藏星步甲 (Yu, 1982:319)
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Calosoma (Campalita) auropunctatum dsungaricum Gebler 星步甲 (ASZI, 1986, 1:421; Yu, 1982: 318)
捕 食：草原毛蟲。
分 佈：甘肅、新疆；蒙古、蘇聯(高加索)、中亞、阿富汗、歐洲(中、東部)。

Calosoma (Campalita) chinense Kirby 中華星步甲 (ASZI, 1986, 1:422; ASZI et al., 1978:160; He et al., 1991:94;

Liang, 1980(4):52-56; Wang et al., 1989:92; Xiang et al., 1994:340; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yu, 1982:318; 1992:472; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:525; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:217; Zong et al., 1984:249)
Calosoma chinense Kirby, 1818:
別 名：*中華步甲，金步甲，中華金星甲，中華曲步甲，中華廣肩步甲。*
捕 食：鱗翅目、鞘翅目、直翅目等幼蟲
蝗蟲
蚜蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Evergestis extimalis Scopoli 茴香薄翅野螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)
煙青蟲
地老虎
柞蠶
螬蟦等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(東部沿海地區)。

Calosoma davidi Gehin 煉星步甲 (Yu, 1982:319; 1988:217; 1992:472)
Calosoma davidi Gehin, 1885:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、湖北。

Calosoma (Caminaria) denticolle Gebler 齒星步甲 (ASZI, 1986, 1:422; Yu, 1982:318)
捕 食：草原毛蟲
枯葉蛾
螟蛾科(幼蟲)。
分 佈：河南、山東、山西、河北、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯(西伯利利亞及歐洲部分)、羅馬尼亞。

Calosoma (s. str.) **himalayanum** Gestro 喜廣肩步甲 (Yu, 1981:324; 1982:318)
捕 食：毒蛾幼蟲。
分 佈：西藏；印度。

Calosoma (s. str.) **inquisitor cyanescens** Motschulsky 青雅星步甲 (ASZI, 1986, 1:422; Yu, 1982: 318)
捕 食：毒蛾科、捲蛾科
柞蠶
象甲(幼蟲)。
分 佈：河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯(遠東地區)。

Calosoma (Charmosta) investigator Illiber 亮星步甲 (Yu, 1982:319)

Calosoma (*Charmosta*) *investigator* Illiber, 1798:

捕 食：尺蠖

松毛蟲

分 佈：新疆、東北；西伯利亞、蒙古、蘇聯(歐洲部分)。

Calosoma (Charmosta) lugens Chaudoir 暗星步甲 (Yu, 1982:319; Zhu et Zheng, 1987:217)

Calosoma (*Charmosta*) *lugens* Chaudoir, 1869:

捕 食 性。

分 佈：河南、山東、山西、河北、內蒙古、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯(東部沿海地區)。

Calosoma maderae chinense Kirby 中華廣肩步甲 (Chen et al., 1993:136; Yan et al., 1993, 9(2):50)

捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾

棗害蟲。

分 佈：遼寧。

Calosoma (s. str.) maximoviczi Morawitz 大星步甲 (Chen et al., 1993:135; He et al., 1991:95; Yu, 1982:318; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:524; Zhu et Zheng, 1987:217)

別 名：*黑腹脛步甲，黑廣肩步甲*。

捕 食：毒蛾、舟蛾等鱗翅目幼蟲，亦為害柞蠶

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

棗樹害蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、四川、浙江、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(烏蘇里地區)。

Calosoma (Stenosta) orientale Hope 東方星步甲 (Yu, 1982:319)

Calosoma (*Stenosta*) *oreintale* Hope, 1835:

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度、非洲東部。

Calosoma (s. str.) sycophanta Linnaeus 疆星步甲 (ASZI, 1986, 1:423; Yu, 1982:318)

捕 食：毒蛾科(幼蟲、蛹)

舟蛾科(幼蟲、蛹)

柞蠶

多種鱗翅目幼蟲及蛹。

分 佈：新疆；克什米爾、西伯利亞、中亞、西南亞、非洲(北部)、歐洲。

Campalita chinense Kirby 中國曲脛步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Lu et al., 1986:63; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zong et al., 1986:118)

別 名：*中華廣肩步甲*。

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)

Euxoa oberthuri Leech 白邊切根蟲(幼蟲)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois 非洲螻蛄(若蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
地老虎(幼蟲)
Bravicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
麥長管蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)
Bomolocha tristalis Lederer 豆卜饃夜蛾(幼蟲)
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲,蛹)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Spilarctia jankowskii Oberthür 污白燈蛾(幼蟲)。

分 佈：江蘇、湖北、黑龍江。

Carabus brandti Falb. 麻步甲 (Zhu et Zheng, 1`987:217)

捕 食 性。
分 佈：河南。

Carabus canaliculatus Adams 溝步甲 (ASZI, 1986, 1:421)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；東西伯利亞。

Carabus (Acoptolabrus) changi Haus. (O. Kryzhanovskji, 1956:536)

捕 食 性。
分 佈：福建。

Carabus choui Deuve 周氏步甲 (Deuve, 1989:228)

Carabus choui Deuve, 1989:228.
捕 食 性。
分 佈：陝西(太白山)。

Carabus conciliator Fischer von Waldcheim 瓦紋鏈步甲 (Zhu et Zheng, 1987:217)

捕 食 性。
分 佈：河南。

Carabus crassesculptus diraptus Morawitz 碎紋粗皺步甲 (Yu, 1992:473)

Carabus crassesculptus diraptus Morawitz, 1886:
捕 食 性。

分 佈：四川、青海、甘肅。

Carabus davidis Deyrolle et Fairmaire 疣翅大步甲 (Chen et al., 1993:47; Xu et Luo, 1995:214; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
別 名：*達步甲*。
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、浙江。

Carabus (Coptolabrus) elysii Thomson 伊步甲 (Yu, 1997:628; Zhu et Zheng, 1987:217)
Carabus elysii Thomson, 1856:
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、江蘇、安徽、湖北、河南。

Carabus everesti Andrewes 峰步甲 (Yu, 1981:323)
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木、絨轄)。

Carabus (Isiocarabus) fiduciarius Thomson 准同步甲 (He et al., 1991:95; Zong et al., 1984:249)
捕 食：蝗蟲
稻縱捲葉螟(幼蟲、蛹)
鱗翅目(幼蟲、蛹)。
分 佈：湖北。

Carabus (Acoptolabrus) formosanus Uchida et Tamanuki (O. Kryzhanovskji, 1956:536)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Carabus (Coptolabrus) ignimetalla Bates 火步甲 (Yu et al., 1983:165)
Carabus (*Coptolabrus*) *ignimetalla* Bates
捕 食 性。
分 佈：福建。

Carabus indigestus indigestus Semenov 紊步甲 (Yu, 1992:472)
Carabus indigestus indigestus Semenov, 1898:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Carabus indigestus moupinensis Breuning 穆坪紊步甲 (Yu, 1992:472)
Carabus indigestus moupinensis Breuning, 1967:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Carabus (Coptolabrus) lafossei Feisthomel 拉步甲 (Chen et al., 1993:47; O. Kryzhanovskji, 1956:536; Xu et Luo,

1995:214; Yang, 1993:181; Yu et al., 1983:165)
別 名：*艷步甲，艷大步甲*。
捕 食：蝸牛(棉田)
野蛞蝓(棉田)。
分 佈：福建、江西、雲南、浙江、江蘇、安徽。

Carabus (Coptolabrus) lafossei coelestis Stew. 艷大步甲 (ASZI et al., 1978:171; Ren et al., 1993(4):39; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zong et al., 1984:249)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)
柑橘園害蟲。
分 佈：江西、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Carabus (Coptolabrus) lafossei saturatus Haus. 艷大步甲(福建亞種) (O. Kryzhanovskji, 1956:536)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Carabus lama lama Semenov 沿步甲 (Yu, 1992:473)
Carabus lama lama Semenov, 1898:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Carabus (Coptolabrus) pustulifer Lucas 粒翅步甲 (Xie et Yu, 1992:251; Zhang, 1987[ed.] 2:5)
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、貴州、雲南、西藏、四川。

Carabus roborowskii roborowskii Semenov 三距步甲 (Yu, 1992:473)
Carabus roborowskii roborowskii Semenov, 1887:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Carabus (Apotomopterus) sauteri Roeschke (O. Kryzhanovskji, 1956:536)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Carabus (Coptolabrus) smaragdinus honanesis Haus 綠步甲 (Zhu et Zheng, 1987:217)
捕 食：舟蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
柞蠶。
分 佈：河南。

Carabus (Coptolabrus) taiwanicus O. Kryzhanovskji (O. Kryzhanovskji, 1956:535-537)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(基保山)。

Carabus taliensis Fairmaire 大理步甲 (Yu, 1992:473)

Carabus taliensis Fairmaire, 1886:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Carabus wagae wagae Fairmaire 魏格步甲 (Yu, 1992:473)

Carabus wagae wagae Fairmaire, 1882:

捕 食 性。

分 佈：雲南、青海。

Carabus yunnanus Fairmaire 雲南步甲 (Yu, 1992:472)

Carabus yunnanus Fairmaire, 1886:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Carabus sp. (Yu et al., 1983:165)

Carabus sp. Yu et al., 1983:165.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Carabus sp. 素光顎大步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:5)

捕 食：葉蟬(若蟲)

飛蝨(若蟲)

螟卵。

分 佈：江西。

Carabus sp. 蝠蛾步甲 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

捕 食：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(蝠蛾)。

分 佈：廣東。

Casnoidea indica (Thunberg) 印度細頸步甲 (ASZI, 1986, 1:432; He, et al., 1991:95; Shen et Pang, 1989:156-163; Sun et al., 1980(4):23; Xie et Yu, 1992:251; Yu, 1981:56; 1992:473; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:529; Zhang, 1987[ed.] 2:5)

Ophionea indica Thunberg, 1784:

別 名：*印度長頸步甲、黑尾長頸步甲*。

捕 食：稻薊馬

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬

白翅葉蟬

條沙葉蟬

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵、初孵幼蟲)

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(卵、初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)
Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北；日本、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Casnoidea ishii Habu 二點細頸步甲 (Li et al., 1990:55)
捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬
三化螟(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲)
分 佈：廣西。

Casnoidea nigrofasciata (Schmidt-Göbel) 黑帶細頸步甲 (He et a., 1991:95; Yu, 1981:56; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:529)
捕 食：稻葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(初孵幼蟲)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis Guenée 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江；日本、中南半島、印尼、印度、斯里蘭卡。

Catascopus elegans Weber 雅凹唇步甲 (Chen et al., 1993:47)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Catascopus violaceus Schmidt.-Gob. 紫凹唇步甲 (Yu, 1988:219)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(墨脫)；緬甸、印度、錫金。

Chlaenimus absternus Bates 青步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:5)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Chlaenius bengalensis Chaudoir 孟加青步甲 (Chen et Chen, 1991:44; Chen et Chen, 1993:55)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Chlaenius biguttatus Motschulsky 雙斑青步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:5)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Chlaenius bioculatus Chaudoir 雙斑青步甲 (ASZI, 1986, 1:428; Chen et Chen, 1987:47-48; Chen et Chen, 1991:77-78; Chen et Chen, 1993:55; He et a., 1991:95; Hun., 1992:349; Li et al., 1990:55; Xie et Yu, 1992:251; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yu, 1988:218; 1997:628; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:533)

Chlaenius bioculatus Chaudoir, 1856:

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
甘薯麥蛾
甘薯捲葉蛾
螟蛾
燈蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山西、河北、遼寧；日本、越南、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Chlaenius circumdatus Brullè 黃邊青步甲 (ASZI, 1986, 1:429; Chen et Chen, 1987:48-50; 1991:44; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:95; Hun., 1992:349; Li et al., 1990:55; Sun et al., 1980(4):23; Yu, 1988:218; 1992:473; 1997:628; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:534; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:218; Zong et al., 1984:249)

Chlaenius circumdatus Brulle, 1835:

別 名：*小黃青步甲*。

捕 食：螻蛄及其卵
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
葉甲(幼蟲)
捲葉蛾等幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、中南半島、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Chlaenius circumdumductus Morawitz 寬邊青步甲 (Yu et al., 1983:165)

Chlaenius circumdumductus Morawitz

捕 食 性。

分 佈：福建。

Chlaenius costiger Chaudoir 脊青步甲 (ASZI, 1986, 1:429; Chen et Chen, 1987:50; 1991:44; Chen et Chen, 1993:55; Hun., 1992:350; Li et al., 1990:56; Xie et Yu, 1992:252; 1992:474; ;1997:628; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:533; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:216)

Chlaenius costiger Chaudoir, 1856:

捕 食：螟蛾、夜蛾等科幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；朝鮮、日本、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印度。

Chlaenius guttula Chaudoir 斑青步甲 (Yu, 1992:474; 1997:629)

Chlaenius guttula Chaudoir, 1856:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、海南、四川、河北；日本、菲律賓、印尼。

Chlaenius inops Chaudoir 狹邊青步甲 (ASZI, 1986, 1:429; Chen et Chen, 1991:44; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:95; Hun., 1992:350; Li et al., 1990:56; Sun et al., 1980(4):23; Wang et al., 1989:92; Xie et Yu, 1992:252; Yu et al., 1983:165; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:218; Zong et al., 1984:249)

別 名：*胸黃緣青地甲*。

捕 食：蠐螬
螻蛄
稻葉蟬
稻飛蝨
Mythimns separata (Walker) 粘蟲(蛹)
鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、甘肅、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、泰國。

Chlaenius junceus Andrewes 麻胸青步甲 (Chen et Chen, 1987:50-52; 1991:43; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:95; Hun., 1992:350; Yu, 1997:629; Yu et al., 1983:165; Zhu et Zheng, 1987:218)

Chlaenius junceus Andrewes, 1923:

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河南陝西；印尼。

Chlaenius lacunosus (Andrewea) 模青步甲 (Xie et Yu, 1992:252)

捕 食 性。

分 佈：貴州、雲南。

Chlaenius leucops Wiedemann 亮頸青步甲 (Chen et al., 1993:47)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Chlaenius micans micans (Fabricius) 黃斑青步甲 (ASZI, 1986, 1:439; Chen et Chen, 1991:43; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:95; Shi et al., 1989-90:87; Wang et al., 1989:93; Xie et Yu, 1992:252; Yu, 1997:629; Yu et al., 1983:165; Zhang, 1987[ed.] 2:5; Zhu et Zheng, 1987:218; Zong et al., 1984:249)

Chlaenius micans (Fabricius, 1792:)

別 名：*大逗斑青步，絨毛曲斑青地甲*。

捕 食：甘薯麥蛾
甜菜夜蛾
斜紋夜蛾
螟蛾科(幼蟲)
夜蛾科(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、寧夏、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡。

Chlaenius naeviger Morawitz 毛胸青步甲 (ASZI, 1986, 1:530; Chen et Chen, 1991:43; Chen et Chen, 1993:55; Chen et al., 1999, 15(3):122; He et al., 1991:96; Sun et al., 1980(4):23; Yu et al., 1983:165; Zhang, 1987[ed.] 2:5)

別 名：*黃斑青步甲*。

捕 食：葉蟬、茶蚜
麥蛾科、螟蛾科
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
茶捲葉蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、山東、河北、北京；日本。

Chlaenius nepalensis Hope 尼泊爾青步甲 (Hun., 1992:350)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東；尼泊爾。

Chlaenius nigricans Wiedemann 大黃緣青步甲 (Chen et Chen, 1991:44; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:96; Hun., 1992:351; Xie et Yu, 1992:252; Yu et al., 1983:165; Yunn., 1987:533; Zhu et Zheng, 1987:218)

別 名：*寬黃緣青步甲*。

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、遼寧；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡、印尼。

Chlaenius noguchii Bates 狹胸青步甲 (Li et al., 1990:56; Xie et Yu, 1992:252; Zhang, 1987[ed.] 2:5)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、四川。

Chlaenius ocreatus Bates 脛青步甲 (Chen et Chen, 1991:44; Chen et Chen, 1993:55; He et al., 1991:96; Yu, 1992:474; Yu et al., 1983:165; Zhu et Zheng, 1987:218)

Chlaenius ocreatus Bates, 1873:

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉。
分 佈：福建、雲南、河南；朝鮮、日本。

Chlaenius pallipes Gebler 毛青步甲 (ASZI et al., 1978:170; Chen et Chen, 1991:44; Deng, 1983:356; Deng, et al., 1985:281-287; Feng et al., 1991:18; Feng et al., 1994, 10(3):142; He et al., 1991:96; Shu et Yu, 1985:93; Xie et Yu, 1992:252; Yu, 1997:629; Yu et al., 1983:165; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:218)
Chlaenius pallipes Gebler, 1823:
別 名：*淡足青步甲*。
捕 食：非洲螻蛄(卵,若蟲)
Oxya chinensis 中華稻蝗
大豆蚜
麥長管蚜
桃蚜
牧草盲蝽(成蟲)
白邊切根蟲(幼蟲)
細胸叩頭蟲(幼蟲)
大黑鰓金龜(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)
大豆食心蟲(幼蟲)
豆卜饃夜蛾(幼蟲)
向日葵螟(幼蟲)
桃蛀果蛾(幼蟲)
甘藍夜蛾(幼蟲,蛹)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
污白燈蛾(幼蟲)
菜粉蝶(幼蟲,蛹)
據國外記載：粘蟲
切根蟲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(蛹)
半翅目成蟲
蝗蟲(卵莢)
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、河北、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本。

Chlaenius pericallus Redtenbacher 麗緣步甲 (Shi et al., 1989-90:87)
捕 食：(橘園)。
分 佈：上海。

Chlaenius pictus Chaudoir 銹青步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)
捕 食 性。

分 佈：江西。

Chlaenius posticolis Motschulsky 後黃斑青步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Chlaenius praefectus Bates 黃足黑青步甲 (Yu, 1992:474; Zhang, 1987[ed.] 2:6)

Chlaenius praefectus Bates, 1873:

別 名：*點溝青步甲*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、湖北；日本、緬甸、印度。

Chlaenius prostenus Bates 附邊青步甲 (Chen et Chen, 1991:44; 1993:55; Zhang, 1987[ed.] 2:6)

別 名：*窄黃緣青步甲*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西。

Chlaenius posticalis Motschulsky 後斑步甲 (ASZI, 1986, 1:430; He et al., 1991:96; Xu, 1985:24; Zhu et Zheng, 1987:218)

別 名：*黃尾緣青步甲，黃星青步甲*。

捕 食：杉天牛

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

Naraga aenescens Moore 稻螟蛉

夜蛾科(幼蟲)

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

多種小型昆蟲

分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、山西、河北、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯(東部)。

Chlaenius praefectus Bates 點溝青步甲 (He et al., 1991:96; Li et al., 1990:57; Zhu et Zheng, 1987:218)

別 名：*橫皺青步甲*。

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、四川、湖北、河南、北京。

Chlaenius prostenus Bates 附邊青步甲 (He et al., 1991:96; Yu et al., 1983:166; Zhu et Zheng, 1987:218)

捕 食：稻葉蟬

稻飛蝨

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、四川、湖北。

Chlaenius rufofemoratus (MacLeat) 紅腿青步甲 (Shi et al., 1989-90:867)

捕 食：(橘園)。

分 佈：上海。

Chlaenius sericimicans Chaudoir 絲青步甲 (He et al., 1991:96; Yu et al., 1983:166; Yunn., 1987:534; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:218)

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、山東、河北。

Chlaenius spoliatus Rossi 黃緣青步甲 (ASZI, 1986, 1:430; He et al., 1991:96; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:218)

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟

分 佈：福建、江西、湖南、四川、江蘇、湖北、河南、河北、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；西伯利亞、中歐。

Chlaenius touzalini Andrewes 彩角青步甲 (Hun., 1992:351; Yunn., 1987:534; Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、雲南、河北；朝鮮。

Chlaenius trachys Andrewes 粗青步甲 (Xie et Yu, 1992:252; Yunn., 1987:533)

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江；越南、柬埔寨、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Chlaenius variicornis Bates 異角青步甲 (Xie et Yu, 1992:252; Yu, 1997:62; Zhang, 1987[ed.] 2:6)

Chlaenius variicornis Bates, 1863:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、山東、河北、甘肅、遼寧；日本。

Chlaenius virgulifer Chaudoir 逗斑青步甲 (ASZI, 1986, 1:431; Chen et Chen, 1991:43; Chen et Chen, 1993:55; He et al 1991:97; Hun., 1992:351; Li et al., 1990:57; Sun et al., 1984:111; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1988:218; 1997:629; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:218)

Chlaenius virgulifer Chaudoir, 1873:

捕 食：甘薯麥蛾
甜菜夜蛾
斜紋夜蛾

稻田鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北；朝鮮、日本、中南半島。

Chlaenius sp. 青步甲 (Shi et al., 1989-90:87)
捕 食：(橘園)。
分 佈：上海。

Clivina castanea Westwood 栗小鍬步甲 (He et al., 1991:97; Sun et al., 1980(4):23; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1997:629; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:195)
Clivina castanea Westwood, 1926:
別 名：*小螻步甲，梯胸姬扁脛步甲*。
捕 食：螻蛄
稻葉蟬
稻飛蝨
蚜蟲
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、新疆；朝鮮、日本、菲律賓、東南亞、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲。

Clivina lewisi Andrewes 劉氏姬扁脛步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Clivina vulgiraga Boheman 徘徊小鍬步甲 (He et al., 1991:97)
捕 食：薊馬
稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：雲南、湖北。

Clivina westwoodi Putzeys 韋氏小鍬步甲 (He et al., 1991:97)
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
蚜蟲
分 佈：湖北、山東、河北。

Clivina sp. 小螻甲 (Yu et al., 1983:166)
Clivina sp. Yu et al., 1983:166.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Clivina sp. 姬扁脛步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Colliuris aegrota (Bates) 黃鞘長頸步甲 (Yu, 1981:56; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、浙江、湖北；日本。

Colliuris bimaculata (Redtenbacher) 雙斑長頸步甲 (He et al., 1991:97; Li et al.,1990:57; Yu, 1981: 56; Yu et al., 1983:166)
Archicolliuris bimaculata Redtenbacher
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)
Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川；日本、菲律賓、柬埔寨、緬甸、印度、印尼。

Colliuris chaudoiri (Boheman) 黑尾長頸步甲 (ASZI, 1986, 1:432; He et al., 1991:97; Li et al., 1990:57; Sun et al., 1984:111; Yu et al., 1983:166)
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、湖北；越南、緬甸。

Colliuris fuscipennis (Chaudoir) 黃尾長頸步甲 (He et al., 1991:97; Li et al., 1990:58; Yu, 1981:56; Yu et al., 1983:166 Yunn., 1987:527; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(初孵幼蟲)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(卵、初孵幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸。

Colliuris litura Schmidt-Gobel 麻頭長頸步甲 (Chen et al., 1993:47)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Colliuris metallica (Fairmaire) 藍長頸步甲 (He et al., 1991:97; Li et al., 1990:58; Yu, 1981:56; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
別 名：*黑鞘長頸步甲*。

捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼。

Coptodera eluta Andrewer 淡寬胸步甲 (Yu, 1988:218)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、西藏(墨脫)；日本、中南半島、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Coptodera marginata Dupuis. 邊寬胸步甲 (Yu et al., 1983:166)
Coptodera marginata Dupuis.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Coptodera piligera Chaudoir 光寬步甲 (Yu, 1981:329)
捕 食 性。
分 佈：福建、西藏(察隅)、四川；越南、寮國、馬來西亞、緬甸、印度。

Craspedonotus tibialis Schaum 黃脛邊步甲 (He et al., 1991:97; Li et al., 1990:58; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:218)
別 名：*黃頸步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、安徽、湖北、河南、甘肅。

Craspedophorus mandarinus Schaum 圓胸寬帶步甲 (He et al., 1991:97; Li et al., 1990:58)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州。

Curtonatus gigantus (Motschulsky) 巨短胸步甲 (Yan et al., 1993, 9(2):50
捕 食：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。
分 佈：遼寧。

Cychrus bispinosus Deuve 雙刺蝸步甲 (Deuve, 1989:230)
Cychrus bispinosus Deuve, 1989:230.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Cychrus sinicus Deuve 中華蝸步甲 (Deuve, 1989:229)
Cychrus sinicus Deuve, 1989:229.

捕 食 性。
分 佈：陝西。

Cyclosomus sp. (Yu et al., 1983:166)
Cyclosomus sp. Yu et al., 1983:166.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Cymindis binotata Flscher-Waldheim 雙斑猛步甲 (Xue et Yu, 1996:104)
Cymindis binotata Flscher-Waldheim, 1820:121.
捕 食 性。
分 佈：西藏、山西、甘肅、青海、新疆；蒙古、西伯利亞、烏蘇里、貝加爾湖地區。

Cymindis daimio Bates 半猛步甲 (Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食 性。
分 佈：河南。

Cymindis hingstoni Andrewes 異猛步甲 (Yu, 1981:329)
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Cymindis semenowi B. Jakowlew 西門猛步甲 (Xue et Yu, 1996:105)
Cymindis semenowi B. Jakowlew, 1889:254.
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯。

Desera geniculata (Klug) 膝敵步甲 (He et al., 1991:97; Hun., 1992:351; Li et al., 1990:59; Sun et al., 1984:111; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1988:220; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
別 名：*長頸藍步甲，黑膝敵步甲*。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、印尼。

Desera nepalenses Hope 藍櫛爪步甲 (Yu, 1981:329; 1988:220)
別 名：*尼敵步甲*。
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、樟木)；越南、緬甸、印度。

Dicranoncus femoralis Chaudoir 股二叉步甲 (Hun., 1992:352; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1988:217; 1997:629; Yu et al.,

1983:166)
Dicranoncus femoralis Chaudoir, 1850:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、東西伯利亞、越南、中南半島、緬甸、印度、尼泊爾。

Diplocheila elongata Bates 長重唇步甲 (He et al., 1991:98; Hun., 1992:352; Li et al., 1990:59; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
Diplocheila elongata Bates
捕 食：蝗蟲
螻蛄
鱗翅目(幼蟲及蛹)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、安徽、湖北。

Diplocheila latifrons Dejean 偏額重唇步甲 (Hun., 1992:352; Ren et al., 1993(4):39; Yu et al., 1983:166; Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食：柑橘園害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、安徽、湖北、河南、山東、河北。

Diplocheila macromandibularis Habu et Tanake 長重唇步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Diplocheila zeelandica Redtenbacher 寬重唇步甲 (Hun., 1992:352; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1997"630; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
Diplocheila zeelandica Redtenbacher, 1867:
捕 食：蝗蟲
螻蛄
鱗翅目(幼蟲及蛹)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、河北；朝鮮、日本、越南。

Diplous nortoni Andrewes 藏平步甲 (Yu, 1981:327)
捕 食 性。
分 佈：西藏(珠穆朗瑪峰、扎西宗)。

Dischissus japonicus Andrewes 日本裂跗步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:219)
別 名：*四點膨胸步甲*。
捕 食 性。
分 佈：江西、河南。

Dischissus mirandus Bates 奇裂跗步甲 (He et al., 1991:98; Hun., 1992:352; Li et al., 1990:59; Yu, 1997:630; Yu et al.,

1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6; Zhu et Zheng, 1987:219)
Dischissus mirandus Bates, 1873:
別 名：*奇異澎胸步甲，大四星步甲，奇膨胸步甲仙。*
捕 食：鱗翅目(幼蟲)
蝸牛。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；日本。

Dischissus notulatus Fabricius 背裂跗步甲 (He et al., 1991:98; Hun., 1992:353; Yu, 1988:217; Yu et al., 1983:166)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、西藏、貴州、四川、浙江、安徽；菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印度。

Dolichoctis striatus striatus Schmidt-Gobel 小長唇步甲 (Chen et al., 1993:47)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Dolichoctis (Mochtherus) tetraspilotus (MacLeay) 四斑長唇步甲 (Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1988:218)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、貴州、西藏(墨脫)；日本、菲律賓、越南、寮國、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Dolichus halensis halensis (Schaller) 蠋步甲 (ASZI, 1986, 1:424; He et al., 1991:98; Hun., 1992:353; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1992:474; 1997:630; Yu et al., 1983:166; Zhang, 1987[ed.] 2:6)
Dolichus halensis halensis (Schaller, 1783:)
別 名：*赤胸步甲。*
捕 食：螻蛄
螟蛾、夜蛾
隱翅蟲
蠐螬
寄蠅(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

Dolichus viduus Maindron 寡長步甲 (Yu, 1992:474)
Dolichus viduus Maindron, 1910:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Dromius breviceps Bates 短頭速步甲 (Yu, 1997:630)
Dromius breviceps Bates, 1883:
捕 食 性。

分 佈：四川、湖北；日本。

Drypta aeneipennis Bates 青逮步甲 (Chen et al., 1993:47)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Drypta japonica Bates 日本逮步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Drypta lineola Yirgata 鈎顎藍逮步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Drypta lineola virgata Chandoir 條逮步甲 (He et al., 1991:98; Li et al., 1990:60; Sun et al., 1984:111; Yu, 1997:630; Yu et al., 1983:166)

Drypta lineola virgata Chandoir, 1850:

=*Drypta japonica* Bates, Misidentifired.

別 名：*鈎顎藍步甲*。

捕 食：螻蛄

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

螟蟲(幼蟲)

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；日本、越南、緬甸、印度、巴基斯坦、阿富汗。

Dyschirius sp. 蛛螻甲 (Yu et al., 1983:166)

Dyschirius sp. Yu et al., 1983:166.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Elaphrus sp. 眼步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:6)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Epomis nigricans Wiedemann 黃緣黑步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:7)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Eucollinris fuscipennis 黃尾長頸步甲 (Sun et al., 1980(4):23)

捕 食 性。
分 佈：廣東。

Euplynes balesi Harold 背窗步甲 (Yu et al., 1983:167)
Euplynes balesi Harold
捕 食 性。
分 佈：福建。

Euschizomerus liebkei Tedl. 真裂步甲 (Yu et al., 1983:167)
Euschizomerus liebkei Tedl.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Galeritula japonica Bates 日本平顎步甲 (Yu et al., 1983:167)
Galeritula japonica Bates
捕 食 性。
分 佈：福建。

Haplochlaenius costiger Chaudoir 脊青步甲 (Shi et al., 1989-90:87)
捕 食：(橘園)。
分 佈：上海。

Harpalus (Pseudoophonus) adenticulatus Huang 無齒婪步甲 (Huang, 1992:59)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *adenticulatus* Huang, 1992:59.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Harpalus amplicollis Menetr 紅角婪步甲 (Xie et Yu, 1992:254)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、河北；蒙古、西伯利亞。

Harpalus (Pardileus) calceatus Duftschmid 谷婪步甲 (ASZI, 1986, 1:427; Yu, 1992:474; Zhu et Zheng, 1987:195)
Harpalus calceatus Duftschmid, 1812:
捕 食：叩頭蟲(幼蟲)
象甲(幼蟲)
尚取食田間穀粒。
分 佈：福建、四川、河南、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；西伯利亞、歐洲。

Harpalus (Cephalomorphus) capito Morawitz 大頭婪步甲 (ASZI,1986, 1:426; He et al., 1991:98; Hun., 1992:353; Yan et al., 1993, 9(2):50; Zhu et Zheng, 1987:195)
捕 食：蝗蝻
Mythimna separata (Walker) 粘蟲

爲害麥穗，亦捕食鱗翅目幼蟲、蠅蛆、釘螺、蚯蚓等。
分 佈：臺灣、湖南、浙江、江蘇、河南、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

Harpalus calceatus Duftschmid 谷婪步甲 (Yu et al., 1983:167)
Harpalus calceatus Duftschmid
捕 食 性。
分 佈：福建。

Harpalus (s. str.) **chalcentus** Bates 銅綠婪步甲 (ASZI, 1986, 1:427; He et al., 1991:98; Hun., 1992:354; Ren et al., 1993(40:39; Wang et al., 1989:93; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zong et al., 1984:249)
捕 食：爲害穀類種子，亦捕食
稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
象蟲(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲、蛹)
柑橘園害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、寧夏、吉林；朝鮮、日本。

Harpalus chengjiangensis Huang 澄江婪步甲 (Huang, 1993:451)
Harpalus chengjiangensis Huang, 1993:451-452.
捕 食 性。
分 佈：四川(北碚)。

Harpalus (Pseudoophonus) cilihumerus Huang et al. 毛肩婪步甲 (Huang et al., 1994:263)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *cilihumerus* Huang et al., 1994:263.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Harpalus corporosus Motschulsky 直角婪步甲 (He et al., 1991:98)
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲。
分 佈：湖北、河北、寧夏、內蒙古、遼寧、黑龍江。

Harpalus (Pseudophonus) eous Tschitscherine 多背緣毛婪步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Xie et Yu, 1992:253)
捕 食：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
大豆蚜
Holotrichia diomphalia Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)

Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
Carposina niponensis Walsingham 桃蛀果蛾(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
Mamestra brassicae Linnnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)。
分 佈：湖南、江蘇、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

Harpalus fuliginosus Duftschmid 煙斑婪步甲 (He et al., 1991:98)
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
分 佈：上海、湖北。

Harpalus (Pseudophonus) grisecus (Panzer) 毛婪步甲 (ASZI, 1986, 1:426; He et al., 1991:98; Hun., 1992:354; Shi et al., 1989-90:87; Xie et Yu, 1992:253; 1992:475; 1997:630; Yu et al., 1983:167; Yunn., 1987:534; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:219)
Harpalus grisecus (Panzer, 1797:)
別 名：*黍步甲，黃毛婪地步甲*。
捕 食：白蟻
蝗蝻
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲)
亦爲害玉米、穀子。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；越南、朝鮮、日本、蒙古、西伯利亞、阿富汗北非、歐洲經亞洲西部至東亞一帶。

Harpalus hypogeomysis Huang 棲草婪步甲 (Huang, 1993:451)
Harpalus hypogeomysis Huang, 1993:451.
捕 食 性。
分 佈：四川(北碚)。

Harpalus (Pseudoophonus) jureceki (Jedlicka) 肖毛婪步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Hun., 1992:354; Xie et Yu, 1992:253; Yu, 1992:475; 1997:630; Yu et al., 1983:167)
Harpalus jureceki (Jedlicka, 1928:)
別 名：*多唇基毛(毛)婪步甲*。
捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
Leguminivora glycinivorella Matsumua 大豆食心蟲(幼蟲)
大豆蚜
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Carposina niponensis Walsingham 桃蛀果蛾(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、河北、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞。

Harpalus (Pseudophonus) kailiensis Huang 凱里婪步甲 (Huang, 1992:61)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *kailiensis* Huang, 1992:61.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Harpalus (Pseudoophonus) muciulus Huang 粘毛婪步甲 (Huang, 1992:60)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *muciulus* Huang, 1992:60.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Harpalus (s. str.) **pallidipennis** Morawitz 淡鞘婪步甲 (ASZI, 1986, 1:428; Deng, 1983:356; Zhu et Zheng, 1987:219)
捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
分 佈：西藏、四川、河南、華北；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

Harpalus (Pseudoophonus) penglainus Huang et al. 蓬萊婪步甲 (Huang et al., 1994:264)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *penglainus* Huang, et al., 1994:264.
捕 食 性。
分 佈：山東(蓬萊)。

Harpalus (Pseudoophonus) periglabellus Huang 裸緣婪步甲 (Huang, 1992:59)
Harpalus (*Pseudoophoonus*) *periglabellus* Huang, 1992:59.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Harpalus pallidipennis Morawitz 淡鞘婪步甲 (Yu, 1992:475)
Harpalus pallidipennis Morawitz, 1862:
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣西、西藏、四川、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

Harpalus (Pseudoophonus) pseudophonoides Schauberger 僞毛婪步甲 (Xie et Yu, 1992: 254; Yu, 1997:631)
Harpalus pseudophonoides Schauberger, 1930:
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、湖北；日本。

Harpalus (Pseudoophonus) roninus Bates 黑足婪步甲 (Hun., 1992:354; Yu, 1997:631)
Harpalus roninus Bates, 1873:

捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

Harpalus rubefactus Bates 紅婪步甲 (Yu, 1997:631)
Harpalus rubefactus Bates, 1873:
捕 食 性。
分 佈：湖北；日本。

Harpalus (Pseudoophonus) scabripectus Huang et al. 糙盾婪步甲 (Huang et al., 1994:264)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *scabripectus* Huang, et al., 1994:264.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Harpalus (Pseudoophonus) simplicidens Schauberger 單齒婪步甲 (Hun., 1992:355; Yu., 1997:631)
Harpalus simplicidens Schauberger, 1929:
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、西藏、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山西、河北、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、東西伯利亞。

Harpalus (Pseudophonus) sinicus sinicus Hope 中華婪步甲 (ASZI, 1986, 1:427; He et al., 1991:99; Hun., 1992:355; Ren et al., 1993(4):39; Wang et al., 1989:94; Xie et Yu, 1992:254; Yu, 1992:475; 1997:631; Yu et al., 1983:167; Yunn., 1987:534; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:219)
Harpalus sinicus Hope, 1845:
別 名：*黃足地步甲，中華地步甲*。
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
蝗蝻
蚜蟲
鱗翅目(幼蟲)
葉蟎
柑橘園害蟲
尚爲害小麥、大麥、燕麥、黍類的種子。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、甘肅、遼寧；朝鮮、日本、西伯利亞東部、越南。

Harpalus tibeticus Andrewes 藏婪步甲 (Yu, 1992:475)
Harpalus tibeticus Andrewes, 1930:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Harpalus (s. str.) tinctulus Bates 潛色婪步甲 (Hun., 1992:354; Yu, 1997:631)

Harpalus tinctulus Bates, 1873:
別 名：*染婪步甲*。
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、四川、江蘇、湖北、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Harpalus (Pseudophonus) tridens Morawitz 三齒婪步甲 (He et al., 1991:98; Hun., 1992:355; Shi et al., 1989-90:87; Xie et Yu, 1992:254; Xu et Luo, 1995:214; Yu, 1992:476; 1997:631; Yu et al., 1983:167)
Harpalus tridens Morawitz, 1862:
捕 食：蝗蝻
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；朝鮮、日本、越南、印度。

Harpalus vicarius Harold 黃角毛婪步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Yu, 1992:476; 1997:631; Zhu et Zheng, 1987:195)
Harpalus vicarius Harold, 1878:
別 名：*大毛婪步甲*。
捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Euxoa oberthuri Leech 白邊切根蟲(幼蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
大豆蚜
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Myzes persicae (Sulzer) 桃蚜
分 佈：西藏、四川、湖北、河南、陝西、河北、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

Harpalus (Pseudoophonus) xinjiangensis Huang et al. 新疆婪步甲 (Huang et al., 1994:263)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *xinjiangensis* Huang, et al., 1994:263.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Harpalus yinchuanensis Huang 銀川婪步甲 (Huang, 1993:452)
Harpalus yinchuanensis Huang, 1993:452-453.
捕 食 性。
分 佈：寧夏(銀川)。

Harpalus sp. 褐足步甲 (Gao, 1996, 12(3):139; Gu, 1988:174)
捕 食：寄居于烏蛇，捕食多種害蟲，在煙倉活動
Ephestia elutella (Hübner) 煙粉斑螟。

分 佈：廣東、貴州。

Harpalus sp. (Yu et al., 1983:167)

Harpalus sp. Yu et al., 1983;167.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Heteroglossa formosana Jedlicka 臺灣異舌甲 (Yu et al., 1983:167; Zhang, 1987[ed.] 2:7)

Heteroglossa formosana Jedlicka

捕 食 性。

分 佈：福建、江西。

Hexagonia insignis (Bates) 顯六角步甲 (Sun et al., 1984:111; Yu, 1988:220; Yu et al., 1983:167; Zhang, 1987[ed.] 2:7)

Hexagonia insignis (Bates)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、江蘇；日本。

Lachnocrepis japonica Bates 日本毛跗步甲 (He et al., 1991:99)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣西、雲南、四川、湖北、河北。

Lachnoderma asperum Bates 粗毛膚步甲 (Hun., 1992:355; Yu, 1997:632)

Lachnoderma asperum Bates, 1883:

別 名：*粗毛步甲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、香港、廣西、四川、山東；日本。

Lachnolebia cribricollis Morawitz 毛盆步甲 (Hun., 1992:356; Yu, 1997:632; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:219)

Lachnolebia cribricollis Morawitz, 1862:

別 名：*篩毛盆步甲*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、東西伯利亞、日本。

Lachnothrax biguttatus Motschulsky 雙斑毛胸步甲 (Yu, 1988:220)

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)；印尼。

Lebia andrewesi (Jedlicka) 安氏盆步甲 (Xie et Yu, 1992:254)

捕 食 性。

分 佈：雲南、湖北。

Lebia calycophora Schmidt-Goebel 對斑盆步甲 (Xie et Yu, 1992:254)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州；日本、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼。

Lebia coelestis Bates 大盆步甲 (Hun., 1992:356; Xie et Yu, 1992:254; Yu, 1997:632; Zhang, 1987[ed.] 2:7)
Lebia coelestis Bates, 1888:
捕 食：本屬常在樹上捕食害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、湖北。

Lebia cuonaensis Yu 錯那盆步甲 (Yu, 1981:328)
Lebia cuonaensis Yu, 1981:328.
捕 食 性。
分 佈：西藏(錯那)。

Lebia (s. str.) **cuxminor** (Linnaeus) 十字盆步甲 (Hun., 1992:356)
捕 食 性。
分 佈：湖南、河北、新疆、內蒙古、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲、北非。

Lebia (Poecilothais) fusca Morawitz 褐盆步甲 (Hun., 1992:356)
捕 食 性。
分 佈：湖南；日本。

Lebia (Poecilothais) idae Bates 肩盆步甲 (Hun., 1992:356)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南；日本。

Lebia iolanthe Bates 腰壺步甲 (Yu, 1997:632; Yu et al., 1983:167)
Lebia iolanthe Bates, 1883:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南、四川、湖北；日本。

Lebia octoguttata Morawitz 八點垂胸步甲 (Xie et Yu, 1992:254; Zhang, 1987[ed.] 2:7)
別 名：*八斑光鞘步甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、湖南、海南、浙江；朝鮮、日本、西伯利亞。

Lebia retrofasciata Motschulsky 雲南盆步甲 (Yu, 1997:632)
Lebia retrofasciata Motschulsky, 1864:
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖北。

Lebia singaporensis Jedlicka 新加坡盆步甲 (Xie et Yu, 1992:254)

捕 食 性。
分 佈：湖北；新加坡。

Lebia szetschuana Jedlicka 四川盆步甲 (Yu, 1988:218)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)、四川。

Lebidia bioculata Morawitz 雙圈光鞘步甲 (Yu, 1992:476; 1997:632)
Lebidia bioculata Morawitz, 1863:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、西藏、四川、湖北、陝西、遼寧；日本、西伯利亞、緬甸、錫金、印尼

Lebidia octoguttata Morawitz 八斑光鞘步甲 (Yu, 1997:632)
Lebidia octoguttata Morawitz, 1862:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、海南、浙江、湖北；朝鮮、日本、西伯利亞。

Lebidromius hauseri Jedlecka 雲盆速步甲 (Yu, 1981:329; 1988:219)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(墨脫)。

Lebidromius jureceki Jedlicka 黑縫盆步甲 (Xie et Yu, 1992:254; Yu, 1997:632)
Lebidromius jureceki Jedlick, 1935:
別 名：*肖盆速步甲*。
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Lebidromius prolixus Bates 長盆速步甲 (Hun., 1992:357)
捕 食 性。
分 佈：湖南；日本。

Lesticus magnus Motschulsky 大劫步甲 (ASZI, 1986, 1:425; He et al., 1991:99; Li et al.,1990:60; Shi et al., 1989-90:8 Yu, 1997:632; Zhang, 1987[ed.] 2:7)
Lesticus magnus Motschulsky, 1860:
別 名：*大盜步甲*。
捕 食：(稻田)
鱗翅目。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、西、山東、河北、甘肅、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本。

Lesticus mouhoti Chaudoir 模大劫步甲 (Hun., 1992:357)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南；柬埔寨、緬甸。

Lesticus sp. 劫步甲 (Yu et al., 1983:167)

Lesticus sp. Yu et al., 1983:167.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Macrochilus chaudoiri Andrewes 擬大唇步甲 (Hun., 1992:357)

捕 食 性。
分 佈：湖南；菲律賓、越南、印尼、印度。

Macrochilus trimaculatus Olivier 三斑大唇步甲 (He et al., 1991:99; Yu, 1988:229; Yu et al., 1983:167)

Macrochilus trimaculatus Olivier
別 名：*圓斑大唇步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、貴州；越南、印尼、緬甸、斯里蘭卡。

Mastax latefasciata Liebke 側帶彩步甲 (Yu et al., 1983:167)

Mastax latefasciata Liebke
捕 食 性。
分 佈：福建。

Microcosmodes flavospilosus (Leferte) 黃斑小麗步甲 (He et al., 1991:99; Li et al., 1990:60; Yu, 1997:633; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:219)

Microcosmodes flavospilosus (Leferte)
別 名：*寬胸步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、安徽、湖北、河南、陝西；日本、越南、印度。

Miscelus javanus Klug 爪哇狹唇步甲 (Yu, 1988:219)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、西藏(墨脫)；菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、錫金、巴布亞新幾內亞。

Nebria chinensis Bates 中華心步甲 (Hun., 1992:357; Yu, 1997:633)

Nebria chinensis Bates, 1872:
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；朝鮮、日本。

Nebria lateralis Fabricius 邊心步甲 (Yu, 1992:476)

Nebria lateralis Fabricius, 1792:
捕 食 性。

分 佈：四川；日本、西伯利亞、歐洲。

Nebria livida Linnaeus 黃緣步甲 (ASZI, 1986, 1:423; ASZI et al., 1978; He et al., 1991:99; Shu et Yu, 1985:93; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:217)

別 名：*黃緣心步甲*。

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)

甘薯麥蛾

Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(蛹)。

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；日本、西伯利亞、歐洲。

Nebria pulcherrima Bates 至美心步甲 (Hun., 1992:358)

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川。

Nebria superna Andrewes 高山心步甲 (Yu, 1981:324)

捕 食 性。

分 佈：西藏(珠穆朗瑪峰絨布寺、希夏邦馬峰)。

Nebria yunnana Banninger 雲南心步甲 (Yu, 1997:633)

Nebria yunnana Banninger, 1928:

捕 食 性。

分 佈：福建、雲南、湖北。

Nirmala odelli Andrewes 妮步甲 (Yu, 1992:476)

Nirmala odelli Andrewes, 1930:

捕 食 性。

分 佈：雲南；錫金。

Omophron aequaqlis Morawitz 均圓步甲 (He et al., 1991:99; Xie et Yu, 1992:254)

=*Omophron limbatum* (Fabricius) Misidentifired.

別 名：*河圓步甲*。

捕 食：稻田多種昆蟲。

分 佈：臺灣、江西、廣西、四川、浙江、湖北、河南、陝西、河北、內蒙古。

Omophron limbatum Fabricius 邊圓步甲 (Yu et al., 1983:167; Zhang, 1987[ed.] 2:7)

Omophron limbatum Fabricius

別 名：*阿圓步甲*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西。

Onycholabis sinensis (Bates) 中華爪步甲 (Hun., 1992:358; Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1997:633)

Onycholabis sinensis (Bates, 1873:)

捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北、陝西、山東。

Oodes virens Wiedemann 大卵步甲 (Chen et al., 1993:47)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Ophionea sp. 步甲 (Zhang, 1989, 8(1):24-28)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：廣東。

Ophonus griseus 毛婪地步甲 (Zhang, 1998, 14(2):47; Zong et al., 1984:249)
捕 食：麥田。
分 佈：西藏、湖北。

Ophonus sinicus 中華婪地步甲 (Zong et al., 1984:249)
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Orthogonius alternans Wied. (Yu et al., 1983:167)
Orthogonius alternans Wied.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Orthogonius davidi Chaudoir 大衛直角步甲 (Yu, 1992:476)
Orthogonius davidi Chaudoir, 1878:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南；寮國、緬甸、印度、印尼。

Oxycentrus argutoroides (Bates) 明狹婪步甲 (Xie et Yu, 1992:255)
捕 食 性。
分 佈：湖北；日本。

Paragaeus davidi Fairmaire 四斑偏須步甲 (Zhu et Zheng, 1987:219)
捕 食 性。
分 佈：河南。

Paragaeus japonicus Chaudoir 日本扁須步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:7)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Parapisthius indicus Chaudoir 印步甲 (Yu, 1992:476)
Parapisthius indicus Chaudoir, 1863:

捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；印度、尼泊爾、錫金。

Parena cavipennis (Bates) 凹翅寬顎步甲 (ASZI, 1986, 1:431; Hun., 1992:358; Wang et al., 1999, 15(4):183-184; Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1997:633)
Parena cavipennis (Bates, 1873:)
捕 食：刺蛾(幼蟲)
茶毒蛾(幼蟲)
Hyphantria cunea Drury 美國白蛾
Clostera anachoreta Fabricius 楊扇舟蛾
Phalera takasagoensis Matsumura 榆掌舟蛾
Phalera grotei Moore 刺槐掌舟蛾
Stilpnotia candida Staudinger 楊雪毒蛾
Spodeptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Ivela ochropoda Eversmann 榆黃足刺蛾
Latoia sinica Moore 中國刺蛾
Latoia consocia Walker 黃緣綠刺蛾
Cnidocampa flavescens Walker 黃刺蛾
Thosea sinensis Walker 扁刺蛾
Semiothisa cinerearia Bremer et Grey 槐尺蛾
Pleuropta chlorophanta Butler 三條蛀野螟
Thalera chlorosaria Graeser 波翅青尺蛾
Glyphodes pyloalis Walker 桑絹野螟
Illiberis ulmivora Graeser 榆斑蛾
Eumeta veriegata (Snellen) 大袋蛾
Ascotis selenaria Schiffermuler et Denis 大造橋蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、湖北、山東、河北；日本、印尼。

Parena latecincta Bates 側條寬顎步甲 (Yu et al., 1983:167)
Parena latecincta Bates
捕 食 性。
分 佈：福建。

Parena malaisei (Andrewes) 馬來寬顎步甲 (Xie et Yu, 1992:255)
捕 食 性。
分 佈：四川；緬甸。

Parena perforata (Bates) 光背寬顎步甲 (Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1997:633)
Parena perforata (Bates, 1873:)
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川、湖北；日本。

Parena rufotestacea Jedl 黃寬顎步甲 (Dai, 1992:42; Long et Liu, 1986:162-164; Zhou, 1988:56-60)

捕 食：茶園內 5 科 12 種害蟲，對毒蛾、尺蛾、蛾等科害蟲具有顯著控制能力
Euproctis conspersa Butler 茶毒蛾。
分 佈：貴州、湖南。

Parena tesari (Jedlicka) 特氏寬顎步甲 (Xie et Yu, 1992:255)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、浙江。

Paropisthius indicus Chaudoir 印步甲 (Yu, 1981:324)

捕 食 性。
分 佈：西藏(察隅、錯那坡山口西、亞東、樟木、崗、巴則里拉山口、春丕山谷)、四川；印度、錫金、尼泊爾。

Patrobus flavipes Motschulsky 黃足隘步甲 (He et al., 1991:99; Hun., 1992:358; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:218)

別 名：*隘步甲*。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
蚜蟲
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南；日本。

Pentagonica daimiella Bates 小五角步甲 (Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1992:476; 1997:633; Yu et al., 1983:167)

Pentagonica daimiella Bates, 1892:
別 名：*黛五角步甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、湖北；日本、西伯利亞。

Pericalus formosanus Dupuis 臺灣五角步甲 (Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1988:218)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、西藏(墨脫)。

Peripristus ater Cast. 鋸緣步甲 (Yu, 1988:218)

捕 食 性。
分 佈：廣東、海南、雲南、西藏(墨脫)；中南半島、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度。

Peronomerus auripilis Bates 黃毛角胸步甲 (Wang et al., 1989:94; Yu, 1997:633; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:219)

Peronomerus auripilis Bates, 1883:
捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

Peronomerus fumatus Schaum 角胸步甲 (Yu et al., 1983:167)

Peronomerus fumatus Schaum
捕 食 性。
分 佈：福建。

Peronomerus nigrinus Bates 黑角胸步甲 (He et al., 1991:99; Zong et al., 1984:249)

捕 食：稻葉蟬
蚜蟲
分 佈：廣西、雲南、四川、湖北。

Pheropsophus infantulus Bates 嬰屁步甲 (Yu, 1988:220)

捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)；緬甸。

Pheropsophus javanus (Dejean) 爪哇屁步甲 (ASZI, 1986, 1:433; He et al., 1991:99; Hun., 1992:359; Li et al., 1990:61; Sun et al., 1980(4):23; Yu et al., 1983:167; Yunn., 1987:525; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:195; Zong et al., 1984:249)

別 名：*爪哇氣步甲，黃斑屁步甲*。
捕 食：螻蛄
稻葉蟬
稻飛蝨
螟蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、北京；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞。

Pheropsophus javanus picicollis Chaudoir 黑頸爪哇屁步甲 (Yu, 1992:477)

Pheropsophus javanus picicollis Chaudoir, 1825:
捕 食 性。
分 佈：雲南；泰國、緬甸。

Pheropsophus jessoensis Morawitz 短鞘步甲 (ASZI et al., 1978:171; He et al., 1991:100; Li, 1988:222-224; Lu et al., 1986:63; Yu, 1992:477; Yu et al., 1983:167; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhong, 1983:158; Zhu et Zheng, 1987:195)

別 名：*短鞘氣步甲，耶屁步甲，屁步甲*。
捕 食：螻蛄及其卵
稻葉蟬、稻飛蝨
Bravicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)

Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧；日本。

Pheropsophus occipitalis (MacLeay) 廣屁步甲 (ASZI, 1986, 1:433; He et al., 1991:100; Hun., 1992:359; Li et al., 1990:60; Ren et al., 1993(4):39; Sun et al., 1980(4):23; Wang et al., 1989:94; Xie et Yu, 1992:255; Xu et Luo, 1995:214; Yu, 1997:634; Yu et al., 1983:168; Yunn., 1987:525; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:118)
Pheropsophus occipitalis (MacLeay, 1825:)
別 名：*放屁甲，三叉氣步甲，氣步甲*。
捕 食：螻蛄
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàthe) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
螟蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
柑橘園害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陜西、山東、河北、甘肅、內蒙古、遼寧；菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、印尼。

Planetes puncticeps Andrewes 雙斑平步甲 (Xu et Luo, 1995:214; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:7)
Planetes puncticeps Andrewes
別 名：*麻頭平步甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、西藏；日本。

Platymetopus flavilabris (Fabricius) 黃唇寬額步甲 (He et al., 1991:100;Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:7; Zhu et Zheng, 1987:218)
別 名：*平額步甲*。
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、海南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、河南。

Platynus magnus (Bates) 大寬步甲 (Ren et al., 1993(4):39; Shi et al., 1989-90:87; Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1997:634; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食：柑橘園害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、緬甸。

Platynus prostenus (Morawitz) 鞘凹寬步甲 (Xie et Yu, 1992:255; Yu, 1997:634; Yu et al., 1983:168)

Platynus prostenus (Morawitz, 1863:)
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本。

Planetes puncticeps Andrewes 麻頭平步甲 (Li et al.,1990:61; Sun et al., 1980(4):23; Yu, 1988:219)
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、湖北、山東；朝鮮、日本。

Platynus (Pseudoplatynus) magnus (Bates) 大寬步甲 (ASZI, 1986, 1:425; Hun., 1992:359)
捕 食：非洲螻蛄(卵、幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河北；朝鮮、日本。

Platynus protensus (Morawitz) 鞘凹寬步甲 (He et al., 1991:100)
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨。
分 佈：福建、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、湖北。

Pterostichus batesianus Lutshnik 等邊通緣步甲 (Yu, 1992:477)
Pterostichus batesianus Lutshnik, 1916:
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Pterostichus chinensis Jedlicka 中華通緣步甲 (Deng, 1983:356; 1985(3):42; Deng et al., 1985:281-287)
捕 食：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois 非洲螻蛄
Holotrichia diomphalia Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
Monolepta nigrobilineata Motschulsky 二條葉甲(成蟲)
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Bomolocha tristalis Lederer 豆卜饃夜蛾(幼蟲)
Mamestra brassicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾(幼蟲,蛹)
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Spilarctia jankowskii Oberthür 污白燈蛾(幼蟲)
Dolerus tritici Chu. 麥葉蜂(幼蟲)。
分 佈：黑龍江。

Pterostichus gebleri Dejean 通緣步甲 (ASZI, 1986, 1:424; Zhu et Zheng, 1987:218)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、河南、青海、甘肅、河北、內蒙古、東北；西伯利亞。

Pterostichus laemostemomimus Luts. 紫鞘黑通緣步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287)

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
細胸叩頭蟲(幼蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
麥葉蜂(幼蟲)
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Carposina niponensis Walsingham 桃蛀果蛾(幼蟲)。

分 佈：黑龍江。

Pterostichus microcephalus Motschulsky 鼓胸黑通緣步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287; Shi et al., 1989-90:87; Yu et al., 1983:168)

別 名：*小頭通緣步甲*。

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois 非洲螻蛄(卵,若蟲)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
麥葉蜂(幼蟲)
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(蛹)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Spilarctia jankowskii Oberthür 污白燈蛾(幼蟲)
(橘園)。

分 佈：福建、上海、黑龍江。

Pterostichus nitidicollis Motschulsky 綠光通緣步甲 (Deng, 1983:356; 1987:163-167; Deng et al., 1985:281-287)

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates 大黑鰓金龜(幼蟲)
Euxoa oberthuri Leech 白邊切根蟲(幼蟲)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois 非洲螻蛄(若蟲)
Mythimns separata (Walker) 粘蟲(幼蟲,蛹)
Lygus spp. 牧草盲蝽(成蟲)
Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲(幼蟲)
Epilachna niponica Lewis 28 星瓢蟲
Monolepta nigrobilineata Motschulsky 二條葉甲(成蟲)
Bomolocha tristalis Lederer 豆卜饃夜蛾(幼蟲)

Mamestra brassicae Linnaeus　甘藍夜蛾(幼蟲,蛹)
Pieris rapae Linnaeus　菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Aphis glycines Matsumura　大豆蚜
Macrosiphum avenae (Fabricius)　麥長管蚜
Myzus persicae (Sulzer)　桃蚜
Spilarctia jankowskii Oberthür　污白燈蛾(幼蟲)
Athalia rosae Linnaeus　菜葉蜂(幼蟲)
Carposina niponensis Walsingham　桃蛀果蛾(幼蟲)
Pieris rapae Linnaeus　菜粉蝶。

分 佈：黑龍江。

Pterostichus polychromus Tschitscherine 異距通緣步甲 (Yu, 1992:477)

Pterostichus polychromus Tschitscherine, 1888:

捕 食 性。

分 佈：四川、甘肅。

Pterostichus pratii Bates 悉通緣步甲 (Xie et Yu, 1992:255)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、雲南、四川、湖北。

Pterostichus validior Tschitscherine 強通緣步甲 (Yu, 1992:477)

Pterostichus validior Tschitscherine, 1888:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Pterostichus yunnanus Fairmaire 雲南通緣步甲 (Yu, 1992:477)

Pterostichus yunnanus Fairmaire, 1887:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Pterostichus sp. 小黑通緣步甲 (Deng, 1983:356; Deng et al., 1985:281-287)

捕 食：*Holotrichia diomphalia* Bates　大黑鰓金龜(幼蟲)
Euxoa oberthuri Leech　白邊切根蟲(幼蟲)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois　非洲螻蛄(卵,若蟲)
寬背叩頭蟲(幼蟲)
Mythimna separata (Walker)　粘蟲(幼蟲,蛹)
Sitobion avenae (Fabricius)　麥長管蚜
Leguminivora glycinivorella Matsumura　大豆食心蟲(幼蟲)
二條葉甲(成蟲)
Aphis glycines Matsumura　大豆蚜
Bomolocha tristalis Lederer　豆卜饃夜蛾(幼蟲)
Mamestra brassicae Linnaeus　甘藍夜蛾(幼蟲,蛹)

Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲,蛹)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
分 佈：黑龍江。

Risophilus suturalis Schmidt.-Gob. 縫喜步甲 (Yu, 1988:219)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(墨脫)；緬甸、印度。

Scalidion xanthophanus Bates 黃掘步甲 (Hun., 1992:359; Yu et al., 1983:168)
Scalidion xanthophanus Bates
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、四川、浙江。

Scarites acutidens Chaudoir 雙齒螻步甲 (He et al., 1991:100; Hun., 1992:359; Shi et al., 1989-90:87; Sun et al., 1984:111; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:8; Zhu et Zheng, 1987:195; Zong et al., 1984:249)
別 名：*單齒螻步甲*。
捕 食：(橘園)
蚜蟲
螻蛄
稻田鱗翅目(幼蟲)
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南。

Scarites ceylonicus Chaudoir 錫蘭螻步甲 (Hun., 1992:360)
捕 食 性。
分 佈：湖南；越南、寮國、印度、斯里蘭卡。

Scarites rectifrons Bates 直額螻步甲 (Xie et Yu, 1992:256; Yu, 1997:634)
Scarites rectifrons Bates, 1892:
別 名：*角額螻步甲*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、湖北；越南、寮國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Scarites sulcatus Olivier 巨螻步甲 (Xie et Yu, 1992:256; Yu, 1981:325; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Scarites sulcatus Olivier
別 名：*黑螻步甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、貴州、西藏(察隅)、河南、東北地區；朝鮮、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、印尼。

Scarites terricola Bonelli 雙齒螻步甲 (ASZI, 1986, 1:423; He et al., 1991:100; Ren et al., 1993(4):39; Xie et Yu, 1992:256; Yu, 1997:634; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:8; Zong et al., 1984:249)
Scarites terricola Bonelli, 1813:

別 名：*鍬步甲，寬胸螻步甲，單齒螻步甲*。
捕 食：地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
螻蛄(卵、若蟲)
柑橘園害蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；印度、東亞、小亞細亞、歐洲(南部)、北非。

Scarites terricola pacificus Bates 單齒螻步甲 (Shi et al., 1989-90:87)
捕 食：(橘園)。
分 佈：上海。

Setophionea ishiii (Habu) 毛細頸步甲 (ASZI, 1986, 1:433; He et al., 1991:100; Yu, 1981:56; Yu et al., 1983:168; Yunn., 1987:529; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Ophionea ishii Habu
別 名：*東方長頸甲，細頸步甲，長毛葉步甲*。
捕 食：稻飛蝨(成蟲、若蟲)
稻葉蟬(成蟲、若蟲)
蚜蟲
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵、初孵幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川；日本、東南半島、泰國、印度、印尼。

Stenolophus agonoides Bates 黃緣狹胸步甲 (Chen et al., 1993:47; Yu et al., 1983:168)
Stenolophus agonoides Bates
捕 食 性。
分 佈：福建。

Stenolophus connotatus Bates 背中黑溝步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Stenolophus (Egaddroma) difficilis (Hope) 綠溝步甲 (Xie et Yu, 1992:256; Yu, 11997:634; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Stenolophus difficilis (Hope, 1845:)
別 名：*煩狹胸步甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、貴州、雲南、江蘇、安徽、湖北、山東、河北；朝鮮、日本。

Stenolophus fulvicornis Bates 黃角狹胸步甲 (Yu, 1997:634)

Stenolophus fulvicornis Bates, 1863:
捕 食 性。
分 佈：四川、江蘇、湖北；日本。

Stenolophus iridicolor Redtenbacher 虹狹胸步甲 (Shi et al., 1989-90:87; Sun et al., 1984:111; Yu, 1997:634; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Stenolophus iridicolor Redtenbacher, 1868:
別 名：*虹彩溝步甲*。
捕 食：(橘園)、(稻田)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、上海、湖北、吉林；朝鮮、日本。

Stenolophus (Egadroma) quinquepustulatus (Wiedemann) 五斑狹胸步甲 (Xie et Yu, 1992:256; Yu, 1997:635; Yu et al., 1983:168; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Stenolophus quinquepustulatus Wiedemann, 1823:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、新疆；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Stenolophus smaragdulus (Fabricius) 溝步甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Stenolophus sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Stenolophus agonoides Bates 黃緣狹胸步甲 (He et al., 1991:100)
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
分 佈：福建、湖北。

Stenolophus connotatus Bates 背黑狹胸步甲 (He et al., 1991:100; Hun., 1992:360)
捕 食：螻蛄(若蟲)
稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
鱗翅目(低齡幼蟲)
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、河北；日本。

Stenolophus (Egadroma) difficilis (Hope) 煩狹胸步甲 (He et al., 1991:101; Hun., 1992:360; Zong et al., 1984:249)

=*Stenolophus chalceus* Bates

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、雲南、江蘇、安徽、湖北、山東；朝鮮、日本。

Stenolopha iridicolor Redtenbacher 虹狹胸步甲 (He et al., 1991:101)

捕 食：螻蛄(若蟲)
稻葉蟬、稻飛蝨
蚜蟲
鱗翅目(低齡幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川；浙江、江蘇、上海、湖北。

Stenolophus (Egadroma) quinquepustulatus (Wiedemann) 五斑狹胸步甲 (He et al., 1991:101; Hun., 1992:360; Li et al., 1990:62; Yunn., 1987:534)

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(蟻螟)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、上海、湖北、新疆；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Stenolophus smaragdulus (Fabricius) 緣狹胸步甲 (He et al., 1991:101)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：福建、江西、廣東。

Stenolophus sp. 溝步甲 (Sun et al., 1984:111)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣東。

Synuchus sp. (Yu et al., 1983:168)

Synuchus sp. Yu et al., 1983:168.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Tachys gradatus Bates 四斑小步甲 (He et al., 1991:101; Yu, 1997:635)

Tachys gradatus Bates, 1873:

捕 食：薊馬
稻葉蟬(若蟲)
稻飛蝨(若蟲)

分 佈：福建、江西、湖南、四川、江蘇、湖北、山東、河北、北京；日本。

Tachyura laetifica (Li, 1992:140)

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Tetragonoderus quadrisignatus Quens. 四斑四角步甲 (Yu et al., 1983:168)

Tetragonoderus quadrisignatus Quens.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Trechus zhangi Deuve 張氏行步甲 (Deuve, 1989:232)

Trechus zhangi Deuve, 1989:232.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Trichisia violacea Jedl. 紫毛步甲 (Yu, 1988:217)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(墨脫)；菲律賓、緬甸、印度。

Trigonognatha princeps (Bates) 王大通緣步甲 (Hun., 1992:361)

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東。

Trigonognatha robusta Fairmaire 壯大通緣步甲 (Yu, 1992:478)

Trigonognatha robusta Fairmaire, 1894:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Trigonotoma bhamoensis Bates 綠胸短角步甲 (Li et al., 1990:61; Xie et Yu, 1992:256; Yu, 1992:478; 1997:635)

Trigonotoma bhamoensis Bates, 1892:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、越南、寮國、緬甸、印度。

Trigonotoma dohrni Chaudoir 基點短角步甲 (Xie et Yu, 1992:256)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、香港、海南、廣西；越南。

Trigonotoma lewisi (Bates) 銅胸短角步甲 (Hun., 1992:361; Li et al., 1990:62; Yu et al., 1983:168)

Trigonotoma lewisi (Bates)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；日本、越南。

Trigonotoma sp. (Yu et al., 1983:168)

Trigonotoma sp., Yu et al., 1983:168.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Zabrus molloryi Andrewes 模距步甲 (Yu, 1981:327)

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Dytiscidae 龍蝨科

(Jia, 1997:636-643)

Agabus amoenus sinuaticollis Regimbart 淺叉端毛龍蝨 (Jia, 1997:642)

Agabus amoenus sinuaticollis Regimbart, 1899:

捕 食 性。

分 佈：江西、貴州、雲南、西藏、四川、北京、天津、甘肅、新疆、黑龍江；印度、土耳其。

Agabus japonicus Sharp 黑頭小龍蝨 (Jia, 1997:642; Zhang, 1987[ed.] 2:8)

Agabus japonicus Sharp, 1873:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、江蘇、北京；日本、印度北部。

Agabus (Anagabus) kunlunus Yang 昆侖安極龍蝨 (Yang, 1996:111)

Agabus (*Anagabus*) *kunlunus* Yang, 1996:111-112.

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Bidessus japonicus Sharp 矮龍蝨 (He et al., 1991:101)

捕 食：稻基部害蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南。

Canthydrus politus (Sharp) 長斑距龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Clypeodytes frontalis Sharp 額龍蝨 (He et al., 1991:101)

捕 食：稻基部害蟲。

分 佈：湖南。

Cybister bengalensis Aube 黃緣真龍蝨 (Jia, 1997:639)

Cybister bengalensis Aube, 1838:

捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、浙江、北京；日本、菲律賓、越南、印度。

Cybister guerini Aude 黑緣真龍蝨 (Chen, 1996, 18(1):20)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Cybister japonicus Sharp 大龍蝨 (He et al., 1991:101; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
別 名：*黃邊大龍虱*。
捕 食：稻田水中小昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、陝西、東北。

Cybister lewisianus Sharp 黃唇真龍蝨 (Jia, 1997:640)
Cybister lewisianus Sharp, 1873:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、北京；日本、越南。

Cybister tripunctatus orientalis Gschwendter 黃邊龍蝨 (He et al., 1991:101; Pu et al., 1992:483; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Cybister tripunctatus orientalis Gschwendter
別 名：*三點龍虱，東方真龍蝨*。
捕 食：食根金花蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、東北；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、菲律賓、寮國。

Eretes sticticus (Linnaeus) 灰龍蝨 (He et al., 1991:101; Jia, 1997:641; Liu et Fan, 1995:216; Pu et al., 1992:484; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
Eretes sticticus (Linnaeus, 1767:)
別 名：*齒緣龍蝨*。
捕 食：稻田水中小昆蟲
食根金花蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、北京；亞洲大部分國家、南歐、非洲、澳洲、美洲，世界廣布。

Graphoderes adamsi Clark 龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Guignotus japonicus Sharp 微龍蝨 (He et al., 1991:101)
捕 食：水稻害蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Guignotus regimbarti (Gschwendtner) 長斑短褶龍蝨 (Jia, 1997:637)
Guignotus regimbarti (Gschwendtner, 1936:)
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、雲南、四川、湖北、陝西；印度。

Guignotus trassearti (Feng) 短斑短褶龍蝨 (Jia, 1997:637)
Guignotus trassearti (Feng, 1936-37:)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、黑龍江；日本。

Hydaticus bowringi Clark 黃條龍 (He et al., 1991:101; Liu et Fan, 1995:216; Zhang, 1987[ed.] 2:8)
捕 食：稻田水中小昆蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南、浙江、江蘇、陝西、山東；朝鮮、日本。

Hydaticus fabricii (MacLeay) 法氏斑龍蝨(Jia, 1997:641)
Hydaticus fabricii (MacLeay, 1883:)
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南、四川、湖北；寮國、泰國、緬甸、印度、印尼。

Hydaticus grammicus Germar 點條龍蝨 (He et al., 1991:102; Pu et al., 1992:484)
Hydaticus grammicus Germar, 1830:
別 名：*寬縫斑龍蝨*。
捕 食：稻田水中小昆蟲
食根金花蟲。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、北京、新疆、吉林、黑龍江；亞洲、歐洲。

Hydaticus incertus Régimbart 長毛斑龍蝨 (Pu et al., 1992:484)
Hydaticus incertus Régimbart, 1888:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；泰國、緬甸、印度、尼泊爾。

Hydaticus rhantoides Sharp 毛莖斑龍蝨 (Jia, 1997:640)
Hydaticus rhantoides Sharp, 1882:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、遼寧、吉林、黑龍江；日本、越南。

Hydaticus vittatus (Fabricius) 單斑龍蝨 (Jia, 1997:640)
Hydaticus vittatus (Fabricius, 1775:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東；日本、

菲律賓、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Hydronebrius striatus Zeng et Pu 帶窄胸龍蝨 (Pu et al., 1992:483)

Hydronebrius striatus Zeng et Pu, *In* Pu et al., 1992:482-483.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Hydrovatus ferrugatus Regimbart 唇脊寬突龍蝨 (Jia, 1997:637)

Hydrovatus ferrugatus Regimbart, 1877:

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣西、雲南、湖北；緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、新幾內亞。

Hyphydrus japonicus Sharp 日本龍蝨 (He et al., 1991:102; Pu et al., 1992:482)

Hyphydrus japonicus Sharp, 1873:

別 名：*日本異爪龍蝨*。

捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬

螟蟲

Mythimns separata (Walker) 粘蟲

分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、四川、上海、陝西、天津、東北；朝鮮、日本。

Hyphydrus orientalis Clark 東方沼龍蝨 (He et al., 1991:102; Jia, 1997:636)

Hyphydrus orientalis Clark, 1836:

捕 食：稻田水中小昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北。

Ilybius apicalis Sharp 泥龍蝨 (He et al., 1991:102; Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食：稻田多種害蟲。

分 佈：臺灣、江西、陝西、東北。

Laccophilus difficilis Sharp 粒龍蝨 (He et al., 1991:102; Jia, 1997:638; Pu et al., 1992:482)

Laccophilus difficilis Sharp, 1873:

捕 食：稻蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、河北、天津、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、中亞。

Laccophilus interuptus Panzer 粒龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Laccophilus lewisius Sharp 條粒龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Laccophilus sharpi Régimbart 綾波粒龍蝨 (He et al., 1991:102; Jia, 1997:639; Pu et al., 1992:482)

Laccophilus sharpi Regimbart, 1889:

捕 食：稻蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、河北、東北；朝鮮、日本、菲律賓、越南、印度、尼泊爾、巴基斯坦、伊朗、沙特阿拉伯、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Platambus excoffieri Régimbart 黃邊寬緣龍蝨 (Pu et al., 1992:482)

Platambus excoffieri Régimbart, 1899:

捕 食 性。

分 佈：福建、雲南、四川、甘肅。

Platambus fimbriatus Sharp 涿龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Potamonectes ulanulana Yang 烏蘭烏拉爪龍蝨 (Yang, 1996:110)

Potamonectes ulanulana Yang, 1996:

捕 食 性。

分 佈：青海。

Rhantus hokxilanus Yang 可可西里淋龍蝨 (Yang, 1996:111)

Rhantus hokxilanus Yang, 1996:

捕 食 性。

分 佈：青海。

Rhantus pulverosus Stephens 淋龍蝨 (Pu et al., 1992:483; Zhang, 1987[ed.] 2:9)

Rhantus pulverosus Stephens, 1828:

別 名：*小雀斑龍蝨*。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、北京、甘肅、新疆；亞洲、北非、歐洲、澳洲。

Sandracottus hunteri Sharp 黑波紋龍蝨 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Haliplidae 沼梭科

Haliplus japonicus Sharp 日本沼梭 (He et al., 1991:102)

捕 食：稻蟲。

分 佈：湖南。

Haliplus ovalis Sharp 卵形沼梭 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Haliplus sauteri Zimm 邵氏沼梭 (Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Peltodytes intermedius Sharp 盾沼梭 (He et al., 1991:102; Zhang, 1987[ed.] 2:8)

捕 食：稻飛蝨、稻葉蟬

其他稻蟲

分 佈：江西、湖南。

Gyrinidae 豉甲科

Dineutus marginatus Sharp 淡邊黑豉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Dineutus méllyi Régimbari 大黑豉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Dineutus orientalis Modeer 東方刺豉甲 (Liu et Fan, 1995:216; Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇；朝鮮、日本、俄羅斯、亞洲東南部。

Gyrinus curtus Motschulsky 小豉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Orectochilus reginatus Sharp 小黑豉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Paussidae 棒角甲科

Platyrhopalus passoides Wasmann 五斑棒角甲 (He et al., 1991:10; Zhang, 1987[ed.] 2:9)

別 名：*五星扁棒甲*。

捕 食：蟻(成蟲、幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、湖南。

Hydrophilidae 牙甲科(水龜蟲科)

(Jia, 1997:644-650)

Amphiops annamita Reg. 越南隔牙甲 (Jia, 1994:100)

Amphiops annamita Reg.
捕 食 性。
分 佈：廣西：越南。

Amphiops caristripus Jia 條脊隔牙甲 (Jia, 1994:100)

Amphiops caristripus Jia, 1994:100-102.
捕 食 性。
分 佈：福建(福州)。

Amphiops mater Sharp 斜隔牙甲 (Jia, 1994:100)

Amphiops mater Sharp
捕 食 性。
分 佈：

Amphiops pedestris Sharp 溝隔牙甲 (Jia, 1994:100)

Amphiops pedestris Sharp
捕 食 性。
分 佈：

Amphiops yunnanensis Pu 雲南隔牙甲 (Jia, 1994:100)

Amphiops yunnanensis Pu, 1963:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anacaena bulbifera Pu (Pu, 1964:397)

Anacaena bulbifera Pu, 1964:397.
捕 食 性。
分 佈：廣東、貴州。

Anacaena bushikae Pu (Pu, 1964:396)

Anacaena bushikae Pu
捕 食 性。
分 佈：中國。

Anacaena gerula Orchymont (Pu, 1964:396)

Anacaena gerula Orchymont, 1942:
捕 食 性。
分 佈：雲南?

Anacaena hunanensis Pu (Pu, 1964:397)
Anacaena hunanensis Pu, 1964:397.
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、貴州。

Anacaena lancifera Pu (Pu, 1964:396)
Anacaena lancifera Pu
捕 食 性。
分 佈：中國。

Anacaena lushanensis Hsiao 盧山水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Anacaena yunnanensis Orchymont (Chao, 1964:383)
Anacaena yunnanensis Orchymont, 1942:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Berosus dentatum Wu et Pu 齒腹刺鞘牙甲 (Jia, 1997:646)
Berosus dentatum Wu et Pu
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、黑龍江。

Berosus enoplurus indicus Motschulsky 印度水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Berosus firmairei Zaitzev 費氏貝牙甲 (Pu ct al., 1992:484)
Berosus firmairei Zaitzev, 1908:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、四川、浙江、湖北、新疆、哈爾濱；東南亞、蘇門答臘。

Berosus indicus Motschulsky 印度突鞘牙甲 (Chen, 1996, 18(1):20; Jia, 1997:647; Pu, 1988:225)
Berosus indicus Motschulsky, 1861:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、湖北、北京；菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Berosus lewisius Sharp 棘翅牙甲 (He et al., 1991:102; Jia, 1997:646)
Berosus lewisius Sharp, 1873:
別 名：路氏刺鞘牙甲。

捕 食：稻蟲

食根金花蟲。

分 佈：湖南、江蘇，全國除西藏外均有分布；蒙古、俄羅斯、朝鮮、日本、越南。

Berosus signaticollis punctipennis Harold 胡麻斑牙甲 (He et al., 1991:103)

捕 食：稻蟲。

分 佈：湖南。

Cercyontropisternus sp. 龍骨棱腹牙甲 (Pu et al., 1992:484)

Cercyontropisternus sp., Pu et al., 1992:484.

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、四川、湖北、陝西。

Coelostoma sulcata Pu 具溝陷口牙甲 (Pu, 1988:225)

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納、景東)、西藏(墨脫)。

Coelostoma wui Orchymont 胡氏陷口牙甲 (Jia, 1997:644)

Coelostoma wui Orchymont, 1940:

捕 食 性。

分 佈：湖北、山東。

Enochrus flavicans Regimbart 黃緣蒼白牙甲 (Jia, 1997-648)

Enochrus flavicans Regimbart, 1903:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、江蘇、湖北；菲律賓、越南、印度。

Enochrus japonicus Sharp 日本水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Enochrus ussuriensis Knisch 烏蘇里蒼白牙甲 (Jia, 1997:647)

Enochrus ussuriensis Knisch, 1911:

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北、河南、陝西、山西、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；西伯利亞、日本。

Enochrus sp. 蒼白牙甲 (Pu, 1988:225)

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Helophorus aquaticus Linnaeus 水溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏(日土)；克什米爾、亞洲北部、歐洲。

Helophorus crinitus Ganglbauer 突角溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏(安多)、青海；蘇聯。

Helophorus hingstoni d'Orchymont 直緣溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏(聶拉木)。

Helophorus lamicola Zaitzev 隱紋溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏、青海；克什米爾。

Helochares lentus Sharp 富盈麗陽牙甲 (Pu, 1988:225)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、西藏(墨脫)；越南、柬埔寨、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Helophorus mongoliensis Angus 蒙古溝背牙甲 (Pu et Huang, 1996:114)

Helophorus mongoliensis Angus, 1879:

捕 食 性。

分 佈：青海；蒙古、西伯利亞南部。

Helophorus montanus d'Orchymont 波緣溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏；印度、克什米爾、蘇聯。

Helochares ovalis Orchy 卵形水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Helochares (s. str.) **pallens** Macleay 淺色水龜甲 (Jia, 1997:648; Zhang, 1987[ed.] 2:9)

Helochares pallens Macleay, 1825:

捕 食 性。

分 佈：江西、湖北；菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、亞洲西部、歐洲、非洲、大洋洲北部。

Helophorus ser Zaitzev 顯紋溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏、青海；克什米爾。

Helophorus splendidus immaensis d'Orchymont 麗溝背牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。
分 佈：西藏；克什米爾。

Helochares striatus Sharp 條紋水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Hydaticus themonectoides Sharp 水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Hydraena (s. str.) **bispinosa** Pu (Pu, 1956:300)
Hydraena (s. str.) *bispinosa* Pu, 1956:300.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Hydraena (s. str.) **confusa** Pu (Pu, 1956:302)
Hydraena (s. str.) *confusa* Pu, 1956:302.
捕 食 性。
分 佈：廣東(廣州)。

Hydraena (s. str.) **dissimilis** Pu (Pu, 1956:303)
Hydraena (s. str.) *dissimilis* Pu, 1956:303.
捕 食 性。
分 佈：貴州(獨山)。

Hydraena (s. str.) **hunanensis** Pu (Pu, 1956:304)
Hydraena (s. str.) *hunanensis* Pu, 1956:304
捕 食 性。
分 佈：湖南(宜章)。

Hydraena (s. str.) **kwangsiensis** Pu (Pu, 1956:305)
Hydraena (s. str.) *kwangsiensis* Pu, 1956:305.
捕 食 性。
分 佈：廣西(河池)。

Hydraena (s. str.) **magna** Pu (Pu, 1956:306)
Hydraena (s. str.) *magna* Pu, 1056:306.
捕 食 性。
分 佈：貴州(貴陽)。

Hydraena (s. str.) **sauteri** Orehymont (Pu, 1956:294, 307)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hydraena (s. str.) **szechuanensis** Pu (Pu, 1956:294, 307)
Hydraena (s. str.) *szechuanensis* Pu, 1956:307.
捕 食 性。
分 佈：四川(重慶)。

Hydraena (s. str.) **yunnanensis** Pu (Pu, 1956:294, 308)
Hydraena (s. str.) *yunnanensis* Pu, 1942:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Hydraena (s. str.) sp. (Pu, 1956:294, 308)
Hydraena (s. str.) sp. Pu, 1956:308.
捕 食 性。
分 佈：四川(重慶)。

Hydrochara affinis Sharp 大牙甲 (He et al., 1991:103)
捕 食：食根金花蟲。
分 佈：江蘇。

Hydrophilus acuminatus Motschulsky 長須水龜蟲 (Chen, 1996, 18(1):29; He et al., 1991:103; Jia, 1997:645; Zhang, 1987[ed.] 2:9)
Hydrophilus acuminatus Motschulsky, 1853:
別 名：*大黑水龜甲，尖刺巨牙甲*。
捕 食：食根金花蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、四川、江蘇，全國(除西藏外)；朝鮮、日本、西伯利亞、中亞、緬甸。

Hydrophilus cashmirensis Redtenbacher 小牙甲 (He et al., 1991:103)
捕 食：食根金花蟲。
分 佈：江蘇。

Hydrophilus hastatus Herbst 中黑水龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Hydrous acuminatus Motschulsky 尖突巨牙甲 (Liu et Fan, 1995:216; Pu, 1981:338)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、西藏、四川、浙江、江蘇、黑龍江；朝鮮、日本、緬甸、印度、克什米爾、印尼。

Hydrous hastatus Herbest 戟牙甲 (Liu et Fan, 1995:216)
捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、四川、浙江、江蘇。

Hydrophilus sternitalis (Reitter) 細突巨牙甲 (Pu et al., 1992:484)

Hydrophilus sternitalis (Reitter, 1906:)

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、寧夏、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；亞洲中部。

Laccobius hingstoni d'Orchymont 網紋長節牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏；印度、克什米爾。

Laccobius (Macrolaccobius) ziguiensis Jia 秭歸長節牙甲 (Jia, 1997:649)

Laccobius (*Macrolaccobius*) *ziguiensis* Jia, 1997:649.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Laccobius zugmayeri Knisch 黑斑長節牙甲 (Pu, 1981:337)

捕 食 性。

分 佈：西藏(日土)。

Ochthebius (Hymenodes) exilis Pu (Pu, 1958:256)

Ochthebius (*Hymenodes*) *exilis* Pu, 1958:256.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ochthebius (Bothochius) flexus Pu (Pu, 1958:255)

Ochthebius (*Bothochius*) *flexus* Pu, 1958:255.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ochthebius (Aulacochthebius) hunanensis Pu (Pu, 1958:249)

Ochthebius (*Aulacochthebius*) *hunanensis* Pu, 1958:249.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Ochthebius (Bothochius) lobatus Pu (Pu, 1958:256)

Ochthebius (*Bothochius*) *lobatus* Pu, 1958:256.

捕 食 性。

分 佈：四川(重慶)。

Ochthebius (Asiobates) nitidus Pu (Pu, 1958:251)

Ochthebius (*Asiobates*) *nitidus* Pu, 1958:251.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ochthebius (Hymenodes) octofoveatus Pu (Pu, 1958:257)

Ochthebius (*Hymenodes*) *octofoveatus* Pu, 1958:257.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ochthebius (Henicocerus) salebrosus Pu (Pu, 1958:248)

Ochthebius (*Henicocerus*) *salebrosus* Pu, 1958:248.

捕 食 性。

分 佈：雲南(澂江)。

Ochthebius (Homalochthebius) unimaculatus Pu (Pu, 1958:252)

Ochthebius (*Homalochthebius*) *unimaculatus* Pu, 1958:252.

捕 食 性。

分 佈：廣東、貴州、四川。

Ochthebius (Homalochthebius) yunnanensis Pu (Pu, 1958:253)

Ochthebius (*Homalochthebius*) *yunnanensis* Pu, 1958:253.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ochthebius (Homalochthebius) yunnanensis ssp. **furcatus** Pu (Pu, 1958:253)

Ochthebius (*Homalochthebius*) *yunnanensis* ssp. *furcatus* Pu, 1958:253.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Pseudopelthydrus longipalpus Jia 長鬚僞東方牙甲 (Jia, 1998:225-230)

Pseudopelthydrus longipalpus Jia, 1998:229.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Regimbartia profunda Sharp 豆牙甲 (He et al., 1991:103)

捕 食：稻蟲。

分 佈：湖南。

Sternolophus rufipes (Fabricius) 緝牙甲 (Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:103; Huang et Pu, 1984:97-100; Jia, 1997:645; Liu et Fan, 1995:216; Pu, 1981:338; 1988:225; Pu et al., 1992:484; Zhang, 1987[ed.] 2:9)

Sternolophus rufipes (Fabricius, 1775:)

別 名：*紅脊胸牙甲，赤脊水龜甲*。

捕 食：食根金花蟲

蚊(孑孓)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、山東，全國；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、巴基

斯坦、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Silphidae 葬甲科

(Zhang, 1997:651-653)

Caesilpha bicolor Fairmaire 二色葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10; Zhang, 1997:651)

Caesilpha bicolor Fairmaire, 1899:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西、廣西、西藏、四川、浙江、河北。

Calosilpha brunnicollis Kraatz 橙胸葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Eusilpha bicolor (Fairmaire) 二色真葬甲 (Zhang, 1992:276)

捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州、廣西、西藏、浙江、湖北；朝鮮、日本。

Eusilpha japonica Motschulsky 日本真葬甲 (Zhang, 1992:276)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖北；日本。

Eusilpha subcaudata Fairmaire 尾真葬甲 (Zhang, 1992:486; 1997:651)

Eusilpha subcaudata Fairmaire, 1888:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Necrodes asiaticus Portevin 亞洲葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10; Zhang, 1992:276; 1992:486; 1997:651)

Necrodes asiaticus Portewin, 1922:

別 名：*亞洲尸葬甲*。

捕 食 性。

分 佈：江西、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、河北、新疆、內蒙古、吉林；蒙古、東西伯利亞、朝鮮、日本、印度、伊朗、亞洲中部。

Necrodes sp. 葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Necrophorus concolor Kraatz 大黑葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11; Zhang, 1992:276; 1992:486; 1995:237; 1997:652)

Necrophorus concolor Kraatz, 1877:

別 名：*黑負葬甲，黑食尸葬甲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、

江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本。

Necrophorus davidis Fairmaire 花葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Necrophorus japonicus Harold 大花葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Necrophorus maculifrons Kraatz 點花葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Necrophorus nepalensis Hope 尼負葬甲 (Zhang, 1992:276; 1992:486; 1995:238; 1997:652)
Necrophorus nepalensis Hope, 1831:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、河北；朝鮮、日本、越南、印度、孟加拉、錫金、尼泊爾、印尼。

Protonecrodes nigricornis (Harold) 黑角原尸葬甲 (Zhang, 1997:652)
Protonecrodes nigricornis (Harold, 1875:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、中國北部；日本。

Silpha japonica Motschulsky 大扁葬甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Silpha perforata Gebler 孔葬甲 (Zhang, 1996:115)
Silpha perforata Gebler, 1932:
捕 食 性。
分 佈：江西、新疆；朝鮮、日本、蒙古、東西伯利亞。

Thanatophilus auripilosus Portevin 金毛亡葬甲 (Zhang, 1992:486)
Thanatophilus auripilosus Portevin, 1905:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川；日本、東西伯利亞。

Thanatophilus dubius Zhang 疑尸葬甲 (Zhang, 1996:115)
Thanatophilus dubius Zhang, 1996:115-116.

捕 食 性。
分 佈：西藏、青海。

Xylodrepa sexcarinata 六脊樹葬 (Wang et al., 1993, 15(2)::94)
捕 食：*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲(幼蟲)。
分 佈：吉林。

Staphylinidae 隱翅蟲科

(Zhou, 1997:654-656)

Acgeniusm italicum 意大利隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:9)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Aleochara puberula Klug 淡紅大角隱翅蟲 (He et al., 1991:103)
捕 食：蚜蟲
稻飛蝨。
分 佈：江蘇。

Aleochara sp. 家蠅隱翅蟲 (Guo et al., 1997, 13(3):106-109)
捕 食：*Musca domestica* 家蠅(蛹)。
分 佈：上海、北京。

Anotylus latiusculus (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Astenus bicolor Sharp 黑尾隱翅蟲 (He et al., 1991:103)
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcefera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
分 佈：臺灣、福建。

Atheta sordida (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Atheta sp. (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Bledius obtusus (Li, 1991:73)

捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Bledius yezoensis Nakane 赤尾獨角隱翅蟲 (He et al., 1991:103)
捕 食：蚜蟲
稻飛蝨
薊馬。
分 佈：江蘇。

Bledius sp. 黑色隱翅蟲 (Song, 1984:83)
捕 食：水稻害蟲。
分 佈：湖南。

Conosoma germanum Sharp 尖腹隱翅蟲 (He et al., 1991:103)
捕 食：稻田各種小蟲。
分 佈：湖南。

Coprophilus (s. str.) **chinensis** Zheng 中華波緣隱翅蟲 (Li, 1991:73; Zheng, 1984:462)
Coprophilus (s. str.) *chinensis* Zheng, 1984:462.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨眉)、遼寧。

Creophilus maxillosus (Linnaeus) 大隱翅蟲 (Li, 1996, 18(1):46; Wu et al., 1990, 6(4):19; Zhang, 1987[ed.] 2:10; Zhou, 1997:655)
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758:)
別 名：*寬體大隱翅蟲*。
捕 食：*Lucilia sercata* 絲光綠蠅。
分 佈：江西、湖南、西藏、四川、江蘇、湖北、河北、北京、內蒙古、黑龍江；世界性分布。

Cyrtothorax cyanipennis Zheng 藍鞘弧胸隱翅蟲 (Zheng, 1988:306)
Cyrtothorax cyanipennis Zheng, 1988:306.
捕 食 性。
分 佈：四川(臥龍)。

Cyrtothorax rufomaculatus Shibata 赤斑弧胸隱翅蟲 (Zheng, 1988:307)
Cyrtothorax rufomaculatus Shibata, 1979:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dianous acutus Zheng 鈍尖束毛隱翅蟲 (Zheng, 1994:479)
Dianous acutus Zheng, 1994:479.
捕 食 性。

分 佈：四川(大巴山)。

Dianous aequalis Zheng 等束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:199)

Dianous aequalis Zheng, 1993:199.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous alternans Zheng 互束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:201; 1994:479)

Dianous alternans Zheng, 1993:201.

捕 食 性。

分 佈：四川(大巴山)。

Dianous banghaasi Bernhauer 斑氏束毛翅蟲 (Zheng, 1993:198)

捕 食 性。

分 佈：四川。

Dianous bashanensis Zheng 巴山束毛隱翅蟲 (Zheng, 1994:480)

Dianous bashanensis Zheng, 1994:480.

捕 食 性。

分 佈：四川(大巴山)。

Dianous chinensis Bernhauer 中華束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:198)

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous elegantulus Zheng 麗束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:203)

Dianous elegantulus Zheng, 1993:203.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous emarginatus Zheng 凹毛束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:201)

Dianous emarginatus Zheng, 1993:201.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous freyi L. Benick 弗氏束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:199)

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous hummeli emeiensis Zheng 休氏束毛隱翅蟲(峨眉亞種) (Zheng, 1993:201)

Dianous hummeli emeiensis Zheng, 1993:210.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous hummeli hummeli Bernhauer 休氏束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:198)

捕 食 性。

分 佈：四川(東北部)。

Dianous latitarsis L. Benick 大束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:199)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Dianous ruginosus Zheng 皺束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:204)

Dianous ruginosus Zheng, 1993:204.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous socius Zheng 伴束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:200)

Dianous socius Zheng, 1993:200.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous uniformis Zheng 均束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:203)

Dianous uniformis Zheng, 1993:203.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous verticosus Eppelsheim 旋束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:198)

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Dianous vietnamensis Puthz 越南束毛隱翅蟲 (Zheng, 1993:199; 1994:479)

捕 食 性。

分 佈：四川(大巴山)；越南。

Erichsonius chinensis (Bernhauer) 中國伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:490)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Erichsonius horni (Bernhauer) 霍氏伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:490)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Erichsonius japonicus (Cameron) 日本伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:490)

捕 食 性。

分 佈：中國；日本。

Erichsonius kobensis (Cameron) 神戶伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:490)
捕 食 性。
分 佈：中國；日本。

Erichsonius pullus Zheng 暗伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:491)
Erichsonius pullus Zheng, 1993:491.
捕 食 性。
分 佈：四川(喜德)。

Erichsonius puncticulosus Zheng 細點伊里隱翅蟲 (Zheng, 1993:490)
Erichsonius puncticulosus Zheng, 1993:490.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Falagria sulcata (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Indoscitalinus anachoreta Erichson 斯里印度隱翅蟲 (Zheng, 1995:95)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Indoscitalinus dispilus Erichson 黃緣印度隱翅蟲 (Zheng, 1995:95)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Indoscitalinus menglaensis Zheng 孟臘印度隱翅蟲 (Zheng, 1995:95)
Indoscitalinus menglaensis Zheng, 1995:95.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Lathrobium dignum Sharp 赤翅長隱翅蟲 (He et al., 1991:103; Lu et Zhu, 1984:22; Zhang, 1987[ed.] 2:10)
別 名：*盾黑矩胸隱翅蟲*，*粗角隱翅蟲*。
捕 食：稻薊馬
稻飛蝨(若蟲)。
分 佈：江西、湖南、江蘇。

Lathrobium kobense Sharp 神戶長隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Lu et Zhu, 1984:22)
別 名：*狹胸細黑隱翅蟲*。
捕 食：薊馬

稻飛蝨
蚜蟲
小型昆蟲。
分 佈：江蘇。

Lepidophallus cinnamomeus Zheng 桂色異莖隱翅蟲 (Zheng, 1994:351)
Lepidophallus cinnamomeus Zheng, 1994:351.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lepidophallus coracinus Zheng 亮黑異莖隱翅蟲 (Zheng, 1994:350)
Lepidophallus coracinus Zheng, 1994:350.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lepidophallus zhenyuanensis Zheng 鎮源異莖隱翅蟲 (Zheng, 1994:349)
Lepidophallus zhenyuanensis Zheng, 1994:349.
捕 食 性。
分 佈：甘肅(鎮源)。

Lepitacinus japonicus (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Lithocharis nigriceps (Kraatz) 黑尖頭隱翅蟲 (He, et al., 1991:104; Li, 1991:73)
Medon nigriceps Kraatz
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨
螟蟲(卵)。
分 佈：華南、湖北、遼寧。

Lobrathium emeiense Zheng 峨眉隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:191)
Lobrathium emeiense Zheng, 1988:191.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Lobrathium gladiatum Zheng 劍隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:190)
Lobrathium gladiatum Zheng, 1988:190.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lobrathium hebeatum Zheng 鈍隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:189)
Lobrathium hebeatum Zheng, 1988:189.
捕 食 性。